

Catálogo del herbario de los botánicos cordobeses Rafael de León y Gálvez, Fr. José de Jesús Muñoz Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Cabrera

por

DIEGO JORDANO y MANUEL OCAÑA (*)

INTRODUCCIÓN

Este herbario se conserva en la Cátedra de Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Los familiares del P. Muñoz Capilla debieron donarlo a mediados del siglo XIX, años después de la creación de este centro de Enseñanza. En 1947 el Prof. A. Caballero, Director del Jardín Botánico de Madrid, encomendó a D. Jordano la revisión del herbario y la publicación de un Catálogo, porque suponía que, dadas las relaciones que hubo entre Muñoz Capilla y Mariano Lagasca, sería probable encontrar datos y ejemplares de valor, y acaso tipos, del más ilustre de los botánicos españoles.

G. Bellido rompió la ordenación linneana y reagrupó los pliegos según la clasificación de De Candolle, hace unos veinticinco o treinta años. Por eso, y por el mal estado de conservación en que se encontraba, debimos acometer la tarea de restaurarlo y darle el orden primitivo.

En las primeras páginas de este Catálogo se encontrarán datos biográficos de los botánicos cordobeses, que intervinieron con aportaciones de muy diversa importancia, y se hace declaración

(*) Laboratorio de Biología. Facultad de Veterinaria. Córdoba (España).

expresa del auxilio recibido de don Mariano Lagasca, de puño y letra de Muñoz Capilla.

Los números marginales corresponden a la numeración de los pliegos. Marcamos la terminación de cada renglón con /. Se han transcrito exactamente las notas del herbario, con su ortografía original. Todo cuanto no figura en el herbario y se debe a nuestra pluma va incluido entre corchetes, p. ej.: [tachado]. A continuación de cada número hemos consignado la denominación correcta de la especie a que se refiere cada párrafo, adaptándonos a la ortografía y prioridad sinonímica actualmente aceptada.

Expresamos aquí nuestro agradecimiento a los que nos prestaron su ayuda, en la tarea de restaurar, reordenar y fichar. Muy especialmente a la señorita A. Pérez de Tudela y a los alumnos del Laboratorio de Biología: A. Casado (†), J. Carranza, J. Pérez Aragón, G. Díaz Acedo, D. Dueñas, F. Crespo Hidalgo, L. Ramírez Martínez y A. de Cáceres, entre otros.

ESPECIES CRÍTICAS O NUEVAS

Veintitrés ejemplares están clasificados como especies nuevas, o posiblemente nuevas, con más o menos dudas. Corresponden a los números 248, 287, 434, 581, 589, 623, 637, 642, 692, 884, 886, 1000, 1005, 1082, 1094, 1168, 1286, 1355, 1356, 1382, 1531, 1536 y 1589.

NOTAS AUTÓGRAFAS

Como Muñoz Capilla utilizaba, para hacer las papeletas, fragmentos de cartas y documentos hay muchas notas y trozos de correspondencia no botánica de cierto interés para la historiografía cordobesa. No se incluyen en este Catálogo, pero esperamos publicarlas algún día.

La escritura de Muñoz Capilla (figura 1.^a) es armónica, elevada, delicada, clara y ordenada. Los autógrafos de Cabrera (figura 2.^a) son rápidos, de grandes rasgos desproporcionados y enérgicos. Sus mayúsculas son grandes y adornadas. La escritura de Entrena (figura 3.^a) es sencilla y ensiforme. De cuando en cuando se ven notas de Lagasca. Generalmente corresponden a

C. 553. *Decidua Dicotylida Ordo*
Mentha
Silva officinalis. Lim. Junio
 20. p. 7. *Carta para a 187*
Cabrera general
 Esta util y saludable planta
 se cultiva en Francia, algunas
 curiosos bajad nombre de Cabrera
 fina. Se le que se principia a
 cultivar por de mucha parte de
 la finura y pronto aroma que se
 ve en las sierra de Granada
 de donde probablemente la traen
 a esta ciudad que en esta
 sierra se cria. El tiempo

Fig. 2.—Autógrafo de A. Cabrera. Papeleta del Herbario.

Lycium (pachyblauum) folia ovata ?
pinaculi: subulis extrinis angustibus.
Lim. sp. Plant. p. 14. t. 1. p. 1. A.
 Taminam Hispanicum, hinc majores
 extant subsonit. T. Instr. A. J. 187. Class.
Crocota. P. 1. 1. 262.
 vulgo Tamin Real.
 No se dice que se cultiva en esta isla, pero
 en España se la cultiva en toda ella, par-
 ticularmente en Cataluña, porque es comu-
 do en la Europa toda con el nombre de Sa-
 mín. *Boissier. Quer. B. Arabico que*
 caete muy sereno a la altura de una fca-
 lora e más, mas debili por lo que es menuda y
 ramis entrelazados; parece de se fca de la
 primavera honra el invierno.
 En Andalucía se cultiva en todo los son-
 chos, y en pocas las cosas se da no sus ca-
 min: donde se hacen Ramas muy ocupadas
 de sus flores.

Fig. 1.—Autógrafo de Fr. José de Jesús Muñoz Capilla. Papeleta del Herbario.




Fig. 4.—Portada policromada del Herbario de los botánicos cordobeses R. de León y Gálvez, Fr. José de Jesús Muñoz Capilla, R. Entrenas y A. Cabrera.




Fig. 3.—Autógrafo de R. Entrenas. Papeleta del Herbario.




Fig. 5. --Portada de una de las Clases del Herbario.
Polieromada.

rectificaciones hechas en la clasificación realizada por el sabio agustino.

PORTADA (fig. 4.ª)

HERBARIUM / amplissimum, ac his- / toricum : / in quo non tantum / plurimae indiginae, / sed etiam multae exo- / ticae plan- / tae continen- / tur, et praecipue, quae / prope Cordubam sponte / crescunt : / colectum exsiccatum, atque justa / Linnæi doctrinam dispositum á / Raphaele de Leon et Galvez philo- / botanico / cordubensi.

Clasis / prima / Monandria. / Ordo / primus / Monogynia. / MDCCXCIII.

Guarda.

Dⁿ. Rafael Leon y Galvez natural de Cordoba / nació en 26 de Junio de 1772 dedicado al estudio / de la Farmacia en la Botica de mi Padre D. Roque / Muñoz Capilla se aplico con teson a la Botanica / bajo la direccion de D. Bruno Fernandez : cultivo / un Jardin Botanico en la botica de D. Roque : pa- / so á Cataluña de practicante de Farmacia en el / Exercito el año de 1790, y de buelta á Madrid, se es- / tablecio en la Corte de Man- cebo, y allí se entrego / con su aplicación incesante al estudio de los tres / Reinos de la Naturaleza, de la Chimica, y de las / demás Ciencias Naturales : obtuvo una Catedra en el / Colegio de Farma- cia : fue secretario del mismo y / habiendose separado de estos des- tinos á la entrada / de los Franceses puso botica propia y murio en el año 1811 Escribio ura Memoria sobre el uso de / la pita para el cordaje que merecio el premio de / la Sociedad economica de Sevilla : y dexo M. S. va- / rios tratados elementares de las ciencias que / enseñaba en el Colegio. Vivio sin proteccion y / murio de 39 años quando iban madurando / los frutos de sus ta- reas y de su talento. // A las plantas que dexó colectadas Leon de las quales / se han perdido las mas he añadido las cogidas por mí / en Cordoba, Sierra de Segura y cercanias de Regla / Fr. Jo- se de Jesus Muñoz rubricado / Cordoba Año de 1830- //

Herbarium colectum á F. Josefo á Jesu Muñoz / tum (propiis)

[tachado propiis] suis rusticationibus ac itineribus / tum suorum amicorum auxiliis. Raphaelis Leon / Rafaelis Entrenas, Antonii Cabrera et Mariani / Lagasca Primi apud Hispanos Botanici ab anno / 1793 ad annum /.

Clasis 1.^a / L. *Canna Indica* se cultiva en Cordoba / L. *Salicornia Herbacea* Costas de Andalucia / Clasis 2. / L. *Nictantes Sambac* C.C. / L. *Iasminum officinale morisco* / L. *grandiflorum* - real / SS [tachadas] *Ligustrum vulgare* S.S. / *Phyllirea latifolia* S.S. / *angustifolia*. S.S. / *media* S.S. / *rismarinifolia* V. S.S. L. *Syringa persica* C.C. / *Veronica baccabimiga*. S.S. / *arvensis*. C. / *anagalis*. S.S. / *agrestis*. C. / *acinifolia* C. / *longifolia* V. b Guadazuheros / *Spicata* S.S. / *Pinguicula vulgaris*. Navalasna / E *Verbena Supina* C / E *officinalis* C. / L *Caroliniana* C.C. / L. *Noviflora* c. Sevilla / L *Citridora* C.C. / Viedma *Salvia officinalis* C.C. / *etiopis*. S.S. / *coccinea*. C.C. / L *amplexicaulis*. / *officinalis* Elchechico / *Iclarea*. C.C. / L. *Verbenaca*. / L. *tiliafolio* / L. *verticilata* / L. *indeterminada* / L. *ceratophiloides*. / L. *glutinosa* Web / *Iustitia Coccinea*. st. R. Ul. /

1. *Canna indica*, L. *Canna indica* W / se cultiva en Cordoba.

Monandria. Monogynia. / *G. Salicornia.*

2. *Salicornia herbacea*, L. *Salicornia* (*Herbacea*) herbacea / *patula*, articulis apice compressis / emarginato-bifidis. Pract. Botan. / de Lin. p^r. Palau tom. 1.^o pag. 22. / *Salicornia geniculata* annua. / Tourn. Cor. 51. Flora C.^a t.^o 6.^o 234. / *Salicornia*. Dod. pempt. 82. / *Kali*. C. B. ccm. Mat. 364. / Esta planta se cria en las / riveras del Mar y en terrenos / salitrosos. Me dio este esqueleto / en Sevilla D^a. Anastasio Guzm. / año de 1793.

Clasis. II. / *Diandria.* / *Ordo.* / *Monogy-* / *nia.*

3. *Jasminum Sambac* Soland. *Nyctanthes* (*Sambac*) foli- / is inferioribus cordatis, obtusis: / superioribus ovatis acutis. Pract. / Bot. de Lin. p^r. Palau. t.^o 2.^o p.^a 37 / *Syringa Arabica*,

foliis Ma- / liaurantii. C B.P.398.Flora / Española tomo 5º.pª.
261. / Esta preciosa planta se culti- / ba con mucho esmero en los
Jardi- / nes y muchas casas particulares / de Cordoba, por [tacha-
do su] el esquisito y / suvido olor de sus flores. La dan / el nom-
bre de *Diamela*. Es Ar- / busto: florece en todo el Verano: /
Habita en la India. Lin.

4. *Jasminum officinalis*, L. *Jasminum* (Officinale) foliis op-
positis, pinnatis: / foliolis distinctis Pract.Bot. de Lin. pª.Pal.
tº.1º.40. / *Jasminum vulgare*, flore albo T.Ins.R. / H.597. Quer
Flora Española tº.5º.pag.259: / Se cultiba en Cordoba en muchi-
simas pª. / con la denominación de *Jasmin morisco*. es pª. / crece
de 7 á 8.pª. mui ramosa y debil, fª.en Mayo. Reverso: Gelsimi-
num.C-B.com.Math.in Diosc.86.

5. *Jasminum grandiflorum*, L. *Jasminum* (grandiflorum) fo-
liis oppositis, / pinnatis: foliolis extimis confluentibus. / Lin.Sp.
Plant.pª.pª.tº.1º.pª.41. / *Jasminum Hispanicum*, flore majore, /
externe rubente.T.Inst.R.H.597 Flora / Española tº.5º.fº.260. /
vulgo Jasmin Real. / No se dice que se crie espontaneamente / en
España; pero sí se cultiva en toda ella, par- / ticularmente en Ca-
taluña, por lo que es conoci- / do en la Europa toda con el nombre
de Jas- / min Barcelonés. Quer. Es Arbusto que / crece mui ra-
moso á la altura de doze ó ca- / torce pies, mui debil por lo que
es menester te- / nerlo enjardinado: florece desde fines de la /
Primavera hasta el Invierno. / En Cordoba se cultiva en todos
los Jar- / dines: y son pocas las casas donde no hai Jas- / min:
donde se hacen Ramos mui artificiosos / de sus flores. Reverso:
Jasminum / *Jasminum Hispanicum*, gran- / deflorum.C-B.com.
Mat.87.

6. *Ligustrum vulgare*, L. *Ligustrum vulgare* W. / stilo
bifido.

7. *Phillyrea media*, L. *Phillyrea* / media.

8. *Phillyrea angustifolia*, L. *Phillyrea* / angustifolia W.

9. *Phillyrea latifolia*, L. *Phillyrea latifolia* / W. / Siles.

10. *Phillyrea angustifolia*, L. *Phillyrea rorismarini* / folio
W. / Es variedad / de la angustifolia.

11. *Syringa Persica*, L. *Syringa* (Persica) Vª. a.laciniata. P.
/ Bot.de Lin.pª.Palau tº.1º.pª.50 / *Syringa foliis lanceolatis*, in-
tegris, / dissectisque.Lin.Hort.Cliffort.6. / Lilac laciniato folio.
Tourn.Inst. / R.Her.602.Flora Española tº.5º.343. / Don Josef

Quer en su Flora Espa- / ñola dice haverla visto en los cerros del / termino del lugar de Miraflores de la / Sierra ; y tambien en los de Bustarvi- / ejo. Se cultiba en Cordoba en el Jar- / din del Obispo, y en los del Marques / de Viaseca, y en otros de curiosos. / Es un Arbustico endeble que crece / de quatro á cinco pies, florece en Mayo / y Junio. / En sentir de algunos Botanicos esta / que Linneo pone por variedad de la Sy- / ringa Persica ; se debe tener p^r. especie distinta.

12. *Veronica spicata*, L. *Veronica* [tachado *spicata*] W. longifolia W / varietas β .

13. *Veronica spicata*, L. *Veronica spicata* W / Siles.

14. *Veronica Beccabunga*, L. *Veronica* / *Baccabunga* / W.

15. *Veronica Anagallis*, L. *Veronica* / *anagallis* / W.

16. *Veronica agrestis*, L. *Veronica agrestis* / Cordoba W.

17. *Veronica arvensis*, L. *Muy rara y escasea.* / *Veronica Arvensis* W. ¿an *agrestis* W.?

18. *Veronica arvensis*, L. *Veronica arvensis* / Cordoba. / W

19. *Veronica arvensis*, L. *Veronica (arvensis) floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus.* Pract. Bot. de Lin. / por Palau t^o.1^o. pag.73. / *Veronica flosculis cauliculis adherentibus.* T.Inst. / R.H.145. Flora Española t^o.6^o. pag.455. / Esta especie nace con frecuencia en los Jar- / dines y tierras cultivadas de Cordoba : crece dere- / cha, florece en el principio de la Primavera, es annua.

20. *Veronica acinifolia*, L. *Veronica acinifolia* / W.

21. *Pinguicula vulgaris*, L. *Pinguicula vulgar* / Navalasna en el / arroyo q^o. baja á / espaldas de la Casa / en Junio de 1829.

22. *Lippia nodiflora* Rich. *ap.*, Michx. *Verbena (Nodiflora) tetrandra*, / *spicis capitato-conicis, foliis serratis, caule repente.* Pract. Bot. / de Lin. p^r. Palau t^o.1^o. pag.110. / *Verbena nodiflora.* C. Bauh. / comment. Mat. sup. Diosc. 742. / Coji esta planta en el Jardin / Botanico de Sevilla año de 1793. / Se cria en Virginia y Sicilia : y en / España en Barcelona y Valencia / cerca del Mar. Palau. / Su raiz es perenne.

23. *Verbena Carolina*, L. *Verbena Caroliniana* L. / Entrena.

24. *Verbena Carolina*, L. *Verbena (Caroliniana) tetrandra*, / *spicis filiformibus, foliis indivisis lanceolatis serratis obtusiusculis subsessilibus.* P.B. de L. p^r. Palau t^o.1^o. 111... / Habita en la America Septentrio- / nal. Pal. / Su raiz es perenne. / Me dio

este esqueleto Don / Anastasio Guzmán, en Sevilla / en Septiembre del año de 1793. / con aquel nombre generico y especifico.

25. *Verbena officinalis*, L. Vervena oficinalis (Lin).

26. *Verbena supina*, L. Verbena Supina.

27. *Lippia citriodora*, H.B Verbena citridora / Entrena.

28. *Salvia officinalis*, L. Class. Secunda Diandria Ordo / Monoginia / *Salvia officinalis* Linn Tomo / 2º.pº.Palau pagº.128 / *Salvia oficinal* / Esta util y salutifera planta / se cultiva en Cordova pº. algunos / curiosos, bajo el nombre de *Salvia* / fina ; desde que se principia a / cultivar, pierde mucha parte de / la finura y grato aroma que po- / see en las sierras de Granada / de donde probablenº. la traerian / a esta Ciudad, pues que en esta / Sierra no se cria : es po- / deroso remedio contra todas las / enfermedades de Nervios, toni- / ca, Estomatica, y un poco astrin- / gente ; ultimamº. los antiguos / ponderaron tanto sus virtu- / des, que pº. ella preguntaron / a el oraculo : «Cur moriatur / «homo, cum *Salvia* nascatur in / «Horto» a que respondio «con- / tra vim mortis, non est me- / dicamentum in Hortis» como / indicando, qº. ano ser pº. esta / razon, seria un remedio uni- / versal.

29. *Salvia officinalis*, L. *Salvia officinalis* ? / 12.C. (tachado) / ésta es la mas fina qº. / llaman Granadina / V.5 de Julio.

30. *Salvia verbenaca*, L. *Salvia Verbenaca*.

31. *Salvia verticillata*, L. *Salvia* (*Verticillata*) foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis sub- / nudis, stilo corollae labio inferiori- / incumbente.P.B.de L. pº. P.tº.139. / *Horminum* sylvestre latifolium verticillatum. T.Inst.R.Her. / 178. Flora Espº.tº.5º.pº.237. / Esta especie se cria en Castilla / la vieja acia la Ciudad de Avila : / en la Alcarria, y Serrania de Cu- / enca. Quer. Florece en el Estio. / Coji este esqueleto en el Jardin / Botanico de Sevilla año de 1793.

32. *Salvia glutinosa*, L. *S.glutinosa* L. / *Salviae* species.

33. *Salvia sclarea*, L. Clas Iº. Diandria Ord. Monoginia / *Salvia sclarea* / Linn. Tom 1º. pagº.143 / *Salvia Esclarea* (vulgo) Amaro. Reverso : *Salvia Sclarea*.

34. *Salvia aethiopsis*, L. *Salvia* etiope.

35. *Salvia verbenaca*, L. *Salvia* (*ceratophyllcides*) foliis pinatifidis rugosis villosis, caule pani- / culato ramosissimo. Pract. Bot.de / Lin.pº.Palau tº1º.pag.144. / Habita en Sicilia y Egipto. Palº. / Esta especie la he visto cul- / tificada en el Jardin Botanico

de / Sevilla ; en donde coji este esq°. / leto en Septiembre de 1793.

36. *Salvia coccinea*, Juss *Salvia* (coccinea) foliis cordatis ovatis acutis serratis, subtus mol- / lissime tomentosis ; racemo termi- / nali verticillato. P.B. de L.p°.P.t°.1°.148. / Habita en el Cabo de Buena-espe- / ranza. Lin.p°.Pal. / He visto esta especie cul- / tivable en el Jardín Botánico de / Sevilla ; de donde traje á Córdoba / semilla de ella, y este esqueleto / en el mes de Septiembre del año / de mil setecientos noventa y tres.

37. *Salvia sylvestris*, L. *Salvia amplexicaulis* Lamarr / C m R H M.

38. *Salvia tiliaefolia*, Vahl. *Salvia tiliefolio*. Reverso : an *Serotina*?

39. *Salvia*, sp. *Salviae* especies.

40. *Ornus Europaea*, P. *Fraxinus ornus*.

Triandria. Monogynia

41. *Centrathus angustifolius*, DC. *Valeriana* (Rubra) floribus mo- / mandris caudatis, foliis lanceolatis ín- / tegerrimis. Pract.Bot. de P.t°.1°.181. / *Valeriana rubra*. T.I.R.H. / 131. F.C.t°.6°.443.Dod.pempt.91. / *Valeriana rubra dicta*. C.B. / com. Mat.in Diosc.p°.40. / Se cria en España en Aragon / cerca de Villarluego, Montalvan, / Camarena etc. Quer. / En Córdoba se cultiva en los / Jardines, y por los curiosos. / Crece dos á tres pies de alto : / produce muchas ramas, es perenne / y florece en los Meses de Abril / y Mayo.

42. *Centranthus Calcitrapa*, DC. *Valeriana calcitrapa* ? / Mayo vespere lugubri / Viznagar ? / An dioica ? (Otra etiqueta) : *Valeriana* / V. 5 de Julio.

43 *Fedia Cornucopiae*, Gärtn. *Valeriana* (Cornucopiae) floribus ringentibus / foliis ovatis sessilibus.P.B.de Lin. p°.Pal. t°.1°.pág.182. / *Valerianella cornucopioides*, flore galeato. / T.Inst.R.H.133. / Flora Española t°.6°.pag.446. / *Valeriana peregrina purpurea*.C.B.comm. / Mat°.sup.Diosc.pag.40. / Esta especie se cria en todos los campos de la- / bor del circuito de Córdoba : es annua f°: en Abril.

44. *Valeriana dioica*, L. *Valeriana dioica* W. / 1834 / Córdoba.

45. *Valeriana Phu*, L. Valeriana (Phú: floribus triandris, / foliis caulinis pinnatis, radicalibus in- / divis. P.B. de Lin. p. P. t. 1.º. p. 184. / Valeriana hortensis, Phu fo- / lio Olusatri, Dioscoridis. T. Inst. R. / H. 132. Quer F. E. t. 6.º. p. 442. / Phu magnum. C. B. com. Mat. / sup. Diosc. 38. Lag. 19. / Valeriana hortensis. Dod. p. 349. / Farm.: Valeriana mayor. / Se cultiva en Cordoba esta Va- / leriana, en la Alameda, y yo / la he cultivado, y remitido al Jar- / din Botánico de Sevilla planta / viva. Es perenne y florece en / Mayo y Junio. Se usa su raíz en / la Medicina.
46. *Valeriana tuberosa*, L. Valeriana / tuberosa W.
47. *Valerianella*, sp. Valeriana locusta / v. coronata. 19. C.
48. *Valerianella*, sp. Valerianae species / Valeriana locusta.
49. *Valerianella membranacea*, -Loisel. Valeriana / pumila / fructu / 6-dentato / caule simplici / foliis immis linearibus in- / tegris summis trifidis.
50. *Loeflingia Hispanica*, L. Loeflingia hispanica / Lin / Soto de Migª calientes. (Otra etiqueta): 35 Loeflingia. H. / Cordoba.
51. *Iris Pseudacorus*, L. Iris pseudo acorus W. / imberbis foliis ensiformibus / petalis alternis stigmatate / minoribus. Ger- men trigo- / num angulis sulcobifidis.
52. *Iris virginica*, L. Yris Virginica.
53. *Trimeza lurida*, Salisb. Class. Tertia Triandria Ord. / Monogonia / Yris Martinicensis ? / Linn. p. Palau tomo 1.º. p. / 241. Lirio de la Martini- / ca es planta cultivada / en casi todos los jardi- / nes de Cordova y entre / ellos en el de casa de donde cogi este esque- / leto.
54. *Iris persica*, L. Triandria Trigynia. / Yris persica.
55. *Rhynchospora fusca*, R. S. Schenus fuscus / W.
56. *Cyperus flavescens*, L. Cyperus Fravescens W.
57. *Cyperus fuscus*, L. Cyperus Fuscus W.
58. *Cyperus laevigatus*, L. Ciperus flannonicus / W.
59. *Scirpus lacustris*, L. Scirpus Lacustris / Cabrera.
60. *Scirpus Holoschoenus*, L. Scirpus holoschoenus (Cav).
61. *Fimbrostylis autumnalis*, Roem. Scirpus autumnalis / W.
62. *Scirpus silvaticus*, L. Scirpus Sylvaticus. W.
63. *Echinaria capitata*, Desf. *Cenchrus capitatus* / Esta plan- ta se la en- / vie al S.º. Ortega, por / Anthoxanthum ? : y á / la

verdad, ni yo le he vis- / to f.m., ni tres estam- / bres ni 1 pistilo; sino todas hermaf. / dos estambres, y dos pistos.

64. *Imperata cylindrica*, P.B. Sacharum Cilindricum. / (Cav) / Hermosa Grama / la he cogido frente de Casillas / Por el lado opuesto á la Alameda.

65. *Phalaris nodosa*, L. *Phalaris nudosa*? / nodosa W.

66. *Setaria viridis*, P.B. *Panicum Viride* Lin.

67. *Digitaria sanguinalis*, Scop. *Panicum Sanguinale*. Lin.

68. *Panicum Crus-galli*, L. *Panicum Crus-corvi* (Cav^a).

69. *Cynodon Dactylon*, P. *Panicum Dactylon* (Lin) / ó / *Paspalum Dactylon* (Cavan^a).

70. *Panicum miliaceum*, L. *Panicum Asperrimum* / Lag^a. / C in R H M.

71. *Panicum repens*, L. *Panicum Coloratum* (Lin.) / P. Repens et P. coloratum (Cavan^a) / Cavan^a ha reunido estas dos especies / en una.

72. *Panicum repens*, L. *Panicum Repens* Cav^a. / P. Coloratum L.

73. *Phleum tenue*, Scharad. ¿ *Phleum Bellardi*. W.? / P. Nodosum W.?

74. *Alopecurus pratensis*, L. *Alopecurus* / *pratensis* / W. [Otra etiqueta] : *Alopecurus Pratensis*. L. / En esta especie faltan las aristas á la / corola. Son de notar las glumas del / caliz comprimidas graciosam

75. *Alopecurus agrestis*, L. *Alopecurus Agrestis* L.

76. *Alopecurus geniculatus*, L. *Alopecuro* / arrodillado.

77. *Polypogon monspeliensis*, Desf. *Alopecurus Monspeliensis* / *Agrostis Panicea*. W. / Wildenow ha hecho un *agrostis* de / este *Alopecurus* reuniendo las dos / esp.^s *Panicum* y *Monspeliensis*.

78. *Polypogon monspeliensis*, Desf. *Alopecurus Paniceum* (Cavan^a).

79. *Milium effusum*, L. *Milium effusum* [tachado] / 16. L. / *Sorghum halepense* / *Millium halepense* Cav.

80. *Piptatherum miliaceum*, Coss. *Millium Multiflorum* (Cavan^a).

81. *Agrostis interrupta*, L. *Rara* / *Agrostis interrupta*. W.

82. *Agrostis canina*, L. *Agrostis canina* L.

83. *Agrostis capillaris*, L. *Agrostis Capillaris*, L.

84. *Agrostis capillaris*, L. *Agrostis capillaris* / Lin.
 85. *Mibora verna*, P.B. *Agrostis minima*. W.
 86. *Mibora verna*, P.B. *Agrostis Minima* W.
 87. *Agrostis canina*, L. *Agrostis vinealis*: var^o. β . W. / A Gigantea Roth.
 88. *Aira*, sp. 25 *Aira* H.
 89. *Catabrosa aquatica*, P.B. *Aira Aquatica* L.
 90. *Deschampsia caespitosa*, P. B. *Aira Cespitosa* L.
 91. *Melica nutans*, L. *Melica Nutans* L. / C in R H M.
 92. *Melica altissima*, L. *Melica* / *altissima*.
 93. *Melica minuta*, L. *Melica Montana* Cav.
 94. *Melica minuta*, L. *Melica Montana* Cav.
 95. *Poa*, sp. *Poa*.
 96. *Poa annua*, L. *Poa*... n^o.12 L / n^o.11 H. / *Poa annua*.
 97. *Eragrostis megastachya*, I.k. *Poa* n^o.11 / *megastachya* L. Peas. / n^o.10.H / *Briza eragrostis*. [Otra etiqueta]: *Briza eragrostis*. L. / ó / *Poa Eragrostis* L. / Entrena / Estas dos plantas se confun- / den y acaso son una misma / Cavan.^s p^a 312.
 98. *Scleropoa rigida* Gris. n^o.14.L. / n^o.13H. / *Poa rigida*.
 99. *Scleropoa rigida* Gris. *Poa Rigida* Cav.^s.
 100. *Poa bulbosa*, L. *Poa Bulbosa* L.
 101. *Briza minor*, B. *Poa pratensis* [tachado] n^o. 9 L. / *Briza minor* n^o. 5 H / esta es.
 102. *Briza media*, L.B. *virens* / Entrena / 8 / *Briza* L.n^o.8 media / *virens*. - - H n^o. 8.
 103. *Briza media*, L. *Briza media*. / *Poa* [tachado] n^o.7 L. varietas / *maxima* / n^o.7 H. media.
 104. *Briza maxima*, L. *Briza* ó *Poa* / *maxima*.
 105. *Briza maxima*, L. *Briza maxima* / *Poa* n^o.6 L. / 6 H.
 106. *Cynosurus echinatus*, L. *Cynosurus Echinatus*. L. [Otra etiqueta] : n^o.15 L / n^o.14 H. / *Cynosurus echinatus*.
 107. *Lamarckia aurea*, Moench. *Andropogon* [tachado] L n^o.5 / H n^o.4 / *Cynosurus aureus*.
 108. *Festuca arenaria*, Osb. *Festuca* / *Dumetorum* / W.
 109. *Festuca arundinacea*, Schreb. *Festuca foenicoides* / n^o.3 L / n^o.2H.
 110. *Bromus Matritensis*, L.H *Bromus matritensis*. / y Lag.
 111. *Festuca arundinacea*, Schreb. *Festuca foenicoides* / n^o.3 L / n^o.2 H / *Bromus* / *mollis*.

112. *Serrafalcus mollis*, Parl. *Bromus Mollis* L.
113. *Brachypodium pinnatum*, P.B. *Bromus Pinnatus* L.
[Otra etiqueta]: *Bromus Pinnatus*, L.
114. *Stipa pennata*, L. *Stipa plumosa* / v. *pennata* / nº1 H.
[Otra etiqueta]: *Stipa Pennata*, L. / Entrena.
115. *Stipa juncea*, L. ¿*Stipa capillata* L? [Otra etiqueta]:
Stipa Juncea / Cabrera.
116. *Avena elatius*, M.K. *Avena Elstior*, L. [Otra etiqueta]:
Avena Elatior.
117. *Avena fatua*, L. *Avena*. [Otra etiqueta]: *Avena fatua*.
118. *Trisetum neglectum*, R.S. nº13 L. *Avena panicea* /
nº 12 H. / *Bromus* (tachado). [Otra etiqueta]: *Avena Panicea*
Lamarc.
119. *Arundo*, sp. *Arundo Species?*
120. *Aristida coerulescens*, Desf. ¿*Aristida Hystrix* L? /
No es la *A Elatior*. [Otra etiqueta]: *Aristida* / *Elatior* / *Cavanilles* / *Cabrera*.
121. *Lolium temulentum*, L. *Lolium* (*temulentum*) *spica aristata*, *spiculis com-* / *pressis multifloris*. *Pract.Bot.de Lin.p°.P. t°.1°.p°.482.* / *Gramen Loliaceum, spica longiore, aristas / habens. T.I.R.H.516. Flora Española t°.5°.pag.176.* / *Lolium. Lag. 187.C.B.com.Mat.sup.Diosc.331.* / Esta planta se cria entre los sembrados de las / Campiñas de Cordoba y en los del ruedo de la Ciu- / dad, la llaman vulgarmente *Ballico*; es annua / Florece en Abril.
122. *Lepturus cylindricus*, Trin. *Rottboellia cylindrica*. W. / *Entrena*. [Otra etiqueta]: *Robbolia Cilindrica* / *Schreber* / *Cabrera*.
123. *Aegilops ovata*, L. *Aegilops ovata* / Linn. / R¹.Casa de Campo / Madrid.
124. *Aegilops ovata*, L. *Aegilops* / *Ovata* -t.L G L.
125. *Andropogon hirtum*, L. La creo un *Andropogon* / *Andropogon hirtus*. (Wild).
126. *Andropogon Ischaemum*, L. *Alopecurus agrotis* [tachado] / *Andropogon hirtum* 17 L. [Otra etiqueta]: Puede ser más bien / *Andropogon ischoemum* / L. / Yo asi lo tengo deter- / minado. Entrena.
127. *Penicillaria spicata*, W. *Holcus Spicatus* L.
128. *Sorghum saccharatum*, P. Remito á Vmd el exemplar /

que me encargó del *Holcus Saccharatus* L. / en mejor estado q°. el otro.

129. *Secale cereale*, L. *Secale Cereale* Cav.°

130. *Hordeum vulgare*, L. *Hordeum Vulgare* / Cabrera.

131. *Hordeum secalinum*, Schreb. *Hordeum* / *Nodosum* / Cabrera.

132. *Hordeum murinum*, L. *Hordeum* (*Murinum*) *flosculis lateralibus mas-* / *culis aristatis, involucris intermediis ciliatis.* / *Pract.Bot.de Lin p°.Palau t°.1°.pag.521.* / *Gramen secalinum, spicatum, vulgare.* / *T.I.R.H.517.Flora Española t°.5°.pag.189.* / Esta especie se cria con abundancia en / Cordoba en los alrededores y algunas calles / poco pisadas de la ciudad. es annua f°. en Abril.

133. *Triticum vulgare*, Vill. (*aestivum*) *calicybus quadri-* / *floris venti-* / *cosis glabris imbricatis aristatis.* *Pract.Botan.* / *de / Ln.p°.Palau tom.1°.pag.523* / *Triticum aristis longioribus, spica alba.* *Tour.* / *Inst.R. H.512.Quer Flora Esp.t°.6°.pag.427.* / Bien savida es la fertilidad de las Campiñas de / Cordoba. particularmente en criar los trigos que, anu- / almente se siembran en sus dilatadas tierras.

134. *Cutandia maritima*, Benth. *Triticum Maritimum* L. / No creo q°. sea trigo.

135. *Brachypodium distachyum*, P.B. *Triticum Ciliatum.* Cav.

136. *Scirpus fluitans*, L. 2°. 24 H. / Emparedada / 1 de Sbre.de 815.

137. *Globularia vulgaris*, L. *Globularia* / *vulgaris.* [Otra etiqueta]: *Globularia vulgaris* W. / *Caule folioso foliis ovatis / integerrimis.* Siles / 20 de Marzo.

138. *Globularia spinosa*, L. *Globularia* / *spinosa* / W.

139. *Cephalaria leucantha*, Schrad. *Scabiosa leucantha* L. / *Lepicephalus leucanthus* Lag. / Viznagar. 24 Julio.

140. *Succisa pratensis*, Moench. *Scabiosa* (*succisa*) *corollulis quadri-* / *floris aequalibus, caule simplici, / ramis approximatis, foliis lance-* / *olato-ovatis.* P.B.de L.p°.t° 1° 603. / *Scabiosa folio integro gla-* / *bro.T.I.R.H.466.Flora Espa-* / *ñola t°.6°.pag.260.* / Esta especie vi cultibada / en el Jardin Botanico de Sevi- / lla donde cogi este esqueleto, en / Septiembre de 1793. Se cria en / muchas partes de España : su / raiz perenne, florece en el Estio.

141. *Trichera arvensis*, Schrad. *Scabiosa arvensis* / W.
142. *Trichera arvensis*, Schrad. *Scabiosa arvensis* / Sierra de Segura / Siles.
143. *Scabiosa stellata*, L. *Scabiosa Stellata* / Cabrera.
144. *Scabiosa stellata*, L. *Scabiosa stellata* L. / varietas minor
145. *Scabiosa stellata*, L. *Scabiosa stellata* L. / *Asterocephalus* Lag. / Viznagar. [Otra etiqueta]: *Scabiosa* / Viznagar 26 de Julio.
146. *Scabiosa maritima*, L. Clas.4 Tretrandria ord.Monoginia / *Scabiosa* (*Atropurpurea*). Linneo Tomo 1°.Pag.611. / (Vulgo) / viuditas.
147. *Scabiosa ochroleuca*, L. *Scabiosa ochroleuca* / de Chipiona á / Regla. [Otra etiqueta]: *Scabiosa ochroleuca* / Cabrera.
148. *Pycnocomon rutaefolium*, Hffg. et Lk. *Scabiosa rutaefolia*?
149. *Pycnocomon rutaefolium*, Hffg. et Lk. *Scabiosa Rutaefolia* / Cabrera.
150. *Scabiosa tomentosa*, Cav. *Scabiosa tomentosa*. Cav. 1c. / *Asterocephalus tomentosus* / Lag. / Sierras de Segura.
151. *Scabiosa*, sp. *Scabiosa*.
152. *Scabiosa*, sp. *Scabiosa*...? / La especie no se puede / determinar sin ojas. / Entrena.
153. *Sherardia arvensis*, L. *Sherardia Arvensis*. L.
154. *Asperula arvensis*, L. *Asperula Arvensis* / Cav /
155. *Asperula arvensis*, L. *Asperula arvensis*.
156. *Asperula odorata*. L. *Asperula* / *odorata* / W. [Otra etiqueta]: Especie de la anterior / *jazminum redolet.* / *Asperula* Si / Vzgr.20 Julio.
157. *Asperula arvensis*, L. *Asperula* (*arvensis*) *foliis senis*, *floribus terminalibus* / *sessilibus aggregatis*. P.Bot. de Lin.p°.Palau.t°.1° pag.634 / *Gallium arvense*, *flore caeruleo*. T.Inst.R. Herb. / 115. Quer Flora Española t°.5°.pag.149. / *Asperula caerulea*. Dod.pempt.355. / Esta planta se cria entre los sembrados de los alrededores de Cordoba, con especialidad en los que estan / situados hacia la falda de la Sierra. / Es annua y florece en los meses de Abril y Mayo.
158. *Asperula cynanchica*, L. *Asperula cynanchica* L. [Otra etiqueta]: Corola monopetala tubo. infundibili / forme laciniadas 4 = estambres 4 ó / anteras oblongas pegadas al borde / interior

del tubo = estilos dos fili- / forme mui [tachado] cortos q°. apenas suben / la [tachado] 1/3 del tubo = estigmas en cabezuela / germen bilocular.

159. *Asperula cynanchica*, L. *Asperula* / *hexaphila* / W.

160. *Galium laeve*, Thuill. *Gallium Montanum*; L.

161. *Galium verum*, L. *Tetrandria Diginia* / *Gallium*. [Otra etiqueta]: *Galium Verum* L. / ó *G purpureum* L. / Entrena.

162. *Galium Aparine*, L. *Gallium Aparine* / Entrena.

163. *Galium setaceum*, Lamk. *Gallium caesaraugustanum*. L.

164. *Galium aristatum*, L. *Gallium Erectum* / Cavⁿles. / Cabrera.

165. *Galium rotundifolium*, L. *Gallium Latifolium*. L. / *Gallium foliis senis obovatolanceolatis* / retrorsum serrato-aculeatis panicula difusa, / flore Luteo. / Las corolas son quinquefidas con cinco estam- / bres y todas abortan ; lo he hallado en la Campi- ñue- / la y en la Palomera, observando en ambas los / mismos caracteres.

166. *Crucianella angustifolia*, L. Class. IV *Tetrandria* Ord. *Monoginia* / *Crucianela Angustifolia* / Linn. Tom. 1°. pag^a. 662 / *Crucianela* de oja angosta. [Otra etiqueta]: Esta especie está equivocada / pues no tiene flores / espigadas, dudo que / sea *crucianella*.

167. *Crucianella angustifolia*, L. *Crucianella Angustifolia* L.

168. *Crucianella angustifolia*, L. *Crucianela* / *angustifolia*. [Otra etiqueta]: *Crucianella* / *Angustifolia* L / Cabrera / de los puertos apdnos. [Otra etiqueta]: *Crucianela* / de Cordoba / seran variedades.

169. *Crucianella maritima*, L. *Crucianela* / *maritima*.

170. *Plantago major*, L. *Plantago (major) foliis ovatis glabris*, / scapo tereti, spica flosculis imbricatis. / Lin. Spec. Plant. p^r. p^a. t^o. 1^o. p^a. 691. / *Plantago latifolia*, sinuata. Tourn. / Inst. Rei Herv. 126. Flora Española t^o. / 6^o. 107. / *Plantago major*. Lag. in Diosc. 209. / Dod. pempt. 107. / vulgo: Lanten. / Esta Planta es muy común en Cordoba / abunda mucho en las huertas, en los Arro- / yos de las peñas, y Pedroches, y en sotos / humedos. Es perenne, y florece por Ma- / yo y Junio. [Reverso]: *Plantago (major) foliis ovatis glabris*, / scapo tereti, spica floribus.

171. *Plantago media*, L. *Plantago Media*.

172. *Plantago lanceolata*, L. *Plantago lanceolata* / v. β / trinervia / W.

173. *Plantago lanceolata*, L. *Plantago* (*Lanceolata*) foliis lanceolatis / spica subovata, nuda, scapo angulato. / Palau: t°.1. p.654.

174. *Plantago albicans*, L. *Plantago* (*Albicans*) foliis lanceolatis obliquis villosis, spi- / ca cylindrica erecta, scapo tereti. P. B.de L.p P.t°.1° pag.695. / *Plantago angustifolia*, albida, Hispanica. T.I.R.H. / 127. Quer Flora Española tom.6°.pag.109. / *Holostium hirsutum albicans majus*.Casp.Bauh / commet.Matth.sup. Diosc.678. / Se cria esta especie en los alrededores de Córdoba / en sitios aridos como margenes de caminos, parednes, y te- / rrenos de esta naturaleza: es su raiz p°.f°.Abril y Mayo.

175. *Plantago albicans*, L. *Plantago* / *albicans* / W.

176. *Plantago alpina*, L. *Plantago alpina* / W.

177. *Plantago macrorrhiza*, Poir. *Plantago coronopifolia*. / Entrena.

178. *Plantago macrorrhiza*, Poir. *Plantago* (*Coronopifolia*) foliis linearibus dentatis, / scapo tereti.Pract.Bot.de Lin.p°.Palau t°.1°.pag.699. / *Coronopus sylvestris hirsutior*.T.Inst.R.H.128. / Quer Flora Española. t°.5°.pag.6. / *Herba stella*, seu cornu cervinum.Dod.pempt.109. / *Coronopus*.Lag.in Diosc.212.Casp.Bauhin. / comment.Matth.pag.383. = vulgo: Estrellamar. / Se cria en los caminos, y tierras arenosas de / Córdoba: es perenne y florece en Abril y Mayo. [Otra etiqueta]: *Plantago coronopifolia*.

179. *Plantago subulata*, L. *Plantago Subulata* L. / Venta del Esp^{tu}. Sto.

180. *Plantago serraria*, L. *Plantago* (*Serraria*) Foliis lanceolatis quinquener- / viis dentatoserratis, scapo tereti.Pract.Bot.de Lin. / por Palau.t°.1°.pag.699. / Esta especie se cria en abundancia en algunos / sitios humedos de los campos de Córdoba, como en tie- / rra de los Palacios de la Galiana á los lados del camino / que atraviesa desde el arroyo del Moro á la Puente / Sansueña. = Es perenne florece en Mayo.

181. *Plantago Psyllium*, L. *Plantago* (*Psyllium*) caule ramoso herbaceo / foliis subdentatis recurvatis, capitulis / aphyllis.Pract. B.de Lin.p°. P.t°.1°.700. / *Psyllium majus erectum*.T.Inst. / R.H. 128.Flora Española.t°.6°.143. / *Psyllium*.Dod.pempt.115. / Lag. 418. = C.B.in Matth.753. / vulgo: Zargatona. / Esta planta es

muy comun en / los caminos y margenes de las tierras / de labor de los campos de Cordoba, / particularmente hacia la Albayda / es annua y florece en Abril y M°. [Otra etiqueta] : *Plantago psilium* Lin.

182. *Plantago Loefflingii*, L. *Plantago Loefflingii*. W.

183. *Plantago Bellardi*, All. *Plantago Bellardi*. W. Ambos son del Arrollo de las Piedras.

184. *Plantago Coronopus*, L. *Plantago coronopus*.

185. *Elaeagnus angustifolia*, L. *Eleagnus Angustifolia* / vulgo — Cinamomo.

186. *Alchemilla vulgaris*, L. *Alchemilla Vulgaris*. W.

187. *Parietaria cretica*, L. *Polygamia.Monoecia* / *Parietaria* (cretica) foliis subovatis, involucris fructiferis quinquefidis compressis : laciniis lateralibus majoribus. Pract. Bot. de Lin. p°. Palau t°. 1°. pag. 762. / Habita en Creta. Lin. / Coji ésta planta en el Jardín Botánico de Sevilla, año de 1793. donde me la dieron aquel nombre generico, y específico.

188. *Alchemilla arvensis*, Scop. *Aphane arvensis*. [Otra etiqueta] : *Aphane*.

189. *Cuscuta Europaea*, L. *Cuscuta* (*Europaea*) floribus sessilibus. / Pract. Bot. de Lin. p°. Palau t°. 1°. p°. 777. / *Cuscuta major* T. Inst. R. Her. / 652. Flora Española tom. 5° pag. 25. / *Cuscuta*. C. B. comm. Matt. sup. / Diosc. 879. Laguna 491. / Farm. *Cuscuta* ó *Epithymo*. / Esta parasitica planta se halla en Cordoba, en las inmediaciones de el arroyo Pedroches sobre las plantas que se crien entre los peñascos, y en otras partes : es annua y florece por Mayo. / Quando se halla sobre el tomillo se la da el nombre de *Epithymo*, y como crece sobre qualquier especie, recibe variado este nombre, compuesto de la voz Griega ἐπι q°. corresponde á la Latina *sub* que en nuestro Ydioma equibale á *en*, y del nombre de la planta q°. / la sustenta, como *Epitimbra*, *Episequiso*, *Epiteucurio*, *Epicisto*, *Epithapsia* &c. / por estar la del esqueleto asida á una Pimpinela se podría llamar *Epipoterio* ; aunque mas bien se acomoda el *epi* con nombres de dos syllabas.

190. *Hypocoum procumbens*, L. *Hypocoum* (*Procumbens*) siliquis arcuatis compressis articulatis. Pract. Bot. de Lin. p°. Palau t°. 1°. pag. 779. / *Hypocoum latiore folio*. T. Inst. R. H. 230. Flora Española t°. 5°. pag. 242. = *Hypocoum*. Dod. pempt. 449. / *Cuminum sylvestre* II. C. B. com. Mat. 556. / Esta planta se cria con abundan-

cia en los campos de labor / del circuito de Cordoba, particularmente en los del camino / de Lope-garcia ; es annua, florece en Marzo y Abril.

191. *Hypocoum procumbens*, L. Hipecoum procum- / bens. Elchecico Abril / 1812.

192. *Hypocoum pendulum*, L. Hypocoum / pendulum.

193. *Ilex Aquifolium*, L. Acebo / Ylex aquifolius / Royo frio 17 agto.

194. *Ilex Aquifolium*, L. Ilex Aquifolium L.

195. *Potamogeton natans*, L. *Potamogeton* (natans) foliis oblongo-ova / tis petiolatis natantibus. Pract.de Bot. / de Lin.p^r. Palau t^o.1^o.pag.784. / *Potamogeton rotundifolium*.Tourn. / Inst. R.Herv.233.F.Esp.t^o.6^o.p^a.133. / an *Potamogeton Dioscoridis*? / Esta planta se halla en Cordoba, / en el Arroyo Pedroches, en el de Ra- / banales, y en las balsas de Guadal- / quívir, en el Arrollo de la Palomera / y en otros sitios de Agua. / Crece sumergida en las aguas / echando una raiz gruesa asida al fon- / do, y elevando sus tallos hasta la superficie, (por mui hondo que este) donde na- / dan sus hojas sostenidas de largos pezo- / nes Sus espigas salen inera del agua / á florecer, en los meses de Junio y Julio.

196. *Potamogeton lucens*, L. *Potamogeton* Lucens. Lin.

197. *Potamogeton crispus*, L. *Potamogeton* crispum (Lin). [Otra etiqueta] : *Potamogeton* (crispum) foliis lanceola- / tis alternis oppositisve undulatis serra- / tis.Pract.Bot.de L.p^r.Palau t^o.1^o.786. / *Potamogeton* foliis crispis,sive lac- / tuca ranarum. Tourn.Inst.Rei Herv. / 233.Flora Española tom.6^o.pag^a.133. / Esta planta havita sumergida / en las aguas de varias partes de / España : en la Alcarria, en la se- / rrania de Cuenca.&c.Quer, y en / Andaluca. / Traje este esqueleto de Sevilla / año de 1793.me lo dio Guzman.

198. *Sagina procumbens*, L. *Sagina* procumbens L.y W. / *Sagina* / procumbens / La dificultad consistia en que nosotros suponiamos q^o. solo poseia 3 estilos,pero observando muchas flores me cerciore de que tenia 4 y caxa de / 4 ventallas, p^a. observar bien esto combiene ver los / frutos algo pasados y mucha paciencia.

Clase IV

199. *Heliotropium indicum*, L. Pentandria Monogynia. *Heliotropium* (indicum) foliis cordatoob- / tis acutis scabriusculis, spiciis solitariis, fruc- / tibus bifidis. Lin. Sp. P. p.^r. p.^u. t.^o. 2.^o. p.^a. 40. / Habita en una y otra india. Lin. / es annual y florece por Julio y Agosto. Crece / á la altura de dos pies :yo la he cultivado en / Cordoba á donde vino la semilla de Sevilla / remitida por D.^a. Pedro Abat, despues mi corres- / pondiente.

200. *Heliotropium indicum*, L. *Heliotropium indicum* / Lin / C in R.H.M.

201. *Heliotropium Europaeum*, L. *Heliotropium* (Europaeum) foliis ovatis / integerrimis tomentosis rugosis, spicis con / yugatis. Lin. Sp. Plant. p.^r. p.^u. t.^o. 2.^o. p.^a. 41. / *Heliotropium majus*, Dioscoridis. Tourn. / Inst. R. Herv. 139. F. E. t.^o. 5.^o. p.^a. 211. / *Heliotropium*. Dod. pempt. 70. / *Heliotropium majus*. Lag. in Diosc. 499. / vulgo : Verrucaria. / Esta Planta se cria con mucha abundan- / cia en Cordoba :en el campo de la Merced, en / el Marrubial, y demas in- mediaciones de / la ciudad. Es annua, y florece en el Ve- / rano. La usan fresca machacada, y aplicada / sobre las verrugas para con- sumirlas.

202. *Heliotropium Europaeum*, L. *Heliotropium Europeum*.

203. *Heliotropium parviflorum*, L. *Heliotropium Parviflorum* / Lin. / Cojido en Buenos aires.

204. *Heliotropium supinum* Clus. *Heliotropium* (supinum) foliis ovatis / integerrimis tomentosis plicatis, spicis so- / litariis. Pract. Bot. de L. p.^r. P. t.^o. 2.^o. 42. / *Heliotropium minus*, supinum. T. / I. R. Herv. 139. Flora Esp. t.^o. 5.^o. 211. / Dodor. pempt. 70. / Esta plan- ta se cria cerca de / Cordoba en sitios humedos y arenosos / en frente de los Pelambres del lado / de halla del Rio. La he visto con mu- / chisima abundancia desde Cordoba á / Almodovar. Crece echada sobre la tie- / rra, es annua y florece en Julio y / Agosto.

205. *Heliotropium supinum*, Clus. *Heliotropium Supinum* / Lin.

206. *Heliotropium Curasavicum*, L. *Heliotropium* (Curasavi- cum) feli- / is lanceolato-linearibus glabris / aveniis, spicis con-

jugatis. Pract. Bot. / de Lin. p.º. Palau t.º. 2.º. pag. 42. / Habita en lugares marítimos de / la América mas caliente. Pal. / Esta planta americana la / he cultivado en Córdoba, es anual, / florece en el estío: toda la planta / quando viva es de color garzo; bol- / viendose denegrida en la desecaci- / on, lo que sucede ordinariam.º. á las / mas especies de este genero.

207. *Myosotis intermedia*, Lk. *Myosotis scorpioides*.

208. *Myosotis versicolor*, Pers. *Myosotis versicolor*.

209. *Lithospermum officinale*, L. *Lithospermum / officinale /* Orilla del rio Carrizal / al pie de un cerrillo / en cuya cumbre hai ves- / tigos de una atalaya / lo cogi en la primavera / de 1812. Muñoz.

210. *Lithospermum arvense*, L. *Lithospermum (Arvense) seminibus / rugosis, corollis vix calycem superan- / tibus. Pract. B. de Lin. p.º. P. t.º. 2.º. 49. / Buglossum arvense, annuum, / Lithospermi folio. T. I. R. H. 134. / Flora Española tom. 3.º pag. 312. / Lithospermum arvense, radice / rubra. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 658. / Nace esta planta en los alre- / dedores de Córdoba entre los sembra- / dos del Marrubial, los Palacios de la / Galiana, y otros sitios. / Es anual, y florece por los / meses de Marzo y Abril.*

211. *Lithospermum arvense*, L. *Lithospermum Arvense. Cav.*

212. *Lithospermum fruticosum*, L. *Lythospermum / fruticosum / W.*

213. *Rochelia stellulata*, Rehb. *Lithospermum / Dispermum / W.*

214. *Lithospermum tenuiflorum*, L. *Lythospermum / tenuiflorum / W.*

215. *Lithospermum Apulum*, Vahl. *Lithospermum / apulum? / W.*

216. *Anchusa Italica*, Retz. *Anchusa officinalis. L.*

217. *Anchusa Italica*, Retz. *Anchusa (Officinalis) foliis lanceolatis, spicis im- / bricatis secundis. Pract. Bot. de Lin. p.º. Palau t.º. 2.º. 55. / Buglossum angustifolium majus, flore al- / bo vel coeruleo. T.º. Inst. R. H. 134. Flora Espa. t.º. 3.º. 310. / Buglossum vulgare. Lag. 456. C. B. comment. / Matth. sup. Diosc. 825. = vulgo: Lengua- / zos. / Esta planta se cria en los campos de labor del / circuito de Córdoba: su raiz es perenne, f.º. en Abril.*

218. *Anchusa undulata*, L. *Anchusa / angustifolia / W.*

219. *Anchusa undulata*, L. *Anchusa / undulata.*

220. *Alkanna tinctoria*, Tsch. Anchusa / tinctoria.
221. *Cynoglossum cheirifolium*, L. Cinoglossum / cheirifolium / W.
222. *Cynoglossum cheirifolium*, L. Cynoglossum cheirantifolium. L. / Cabrera.
223. *Omphalodes lusitanica*, Pourr. Cynoglossa lusitanica.
224. *Omphalodes linifolia*, Mnch. 12. Cinogl. linif. H.
225. *Omphalodes linifolia*, Mnch. *Cynoglossum* (Linifolium) foliis linearilanceolatis glabris. Pract. Bot. de Lin por Palau tº. 2º. pag. 63. / *Omphalodes Lusitanica*, Linifolio. T. I. R. H. 140. Flora Esp. tº. 6º. 13. / Esta planta se halla en varios sitios de los campos de Cordoba, como en tierra de las canteras y camino de la Palomera ; pero donde abunda mas y crece con mayor lozania es en todos los llanos qº median entre la Alameda y el Molino de Casillas. / Es annua y florece en Abril y Mº. Los colmeneros la conocen con el nombre de *Nevadilla*.
226. *Tuberaria variabilis*, Wk 14. C. / Cinoglossum? / *Helianthemum guttatum*.
227. *Cynoglossum Arundanum*, Coss. ? Cynoglossa alisada.
228. *Omphalodes rugulosa*, DC. Cynoglossum myosotoides? / W.
229. *Omphalodes rugulosa*, DC. Cynoglossum / cristatum / W. / varietas?
230. *Pulmonaria angustifolia*, L. *Pulmonaria* (angustifolia) foliis radicalibus lanceolatis. Pract. Bot. de Lin. pº. Palau tº. 2º. pag. 65 / *Pulmonaria alpina angustifolia*, Italica. T. Inst. R. H. 136. / no la trae Quer en su Flº. Espº. / Esta planta se cria en los alrededores de Cordoba, en los parajes de las hazas, como en las de mas aya de la Huerta nueva / camino de la piedra de la buena vista, y junto á la Huerta bayádares camº. de la Alº. flº. en Abl. 2º.
231. *Lithospermum graminifolium*, Viv. *Pulmonaria subfruticosa*.
232. *Symphytum officinale* L. Simfitum officinale Lin.
233. *Symphytum officinale*, L. *Symphytum* (Officinale) foliis ovato-lanceolatis / decurrentibus. Pract. Bot. de L. pº. Palau tº. 2º. pº. 69. / *Symphytum consolidamayor*. T. Inst. R. H. / 138. Quer Flora Española tº. 6º. pag. 344. / *Symphytum alterum*. Lag. 382. /

Esta planta se cria en varias partes de España / y se cultiba en Cordoba :es p°. y f. en Abril y M°.

234. *Symphytum tuberosum*, L. Class.quinta Pentandria Ordo / Monoginia. / *Symphitum tuberosum* / Linn.p°.Palau tom. 2°.p°. / 69 *Symphito tuberoso* / Se cultiba en Cordoba p°. / algunos curiosos y entre otros en / el Hospital de Jesus de donde / cogi este esqueleto ;es peren / ne y florece p° Mzo. y Abl.

235. *Symphytum tuberosum*, L. *Symphitum (tuberosum, foliis se- / midecurrentibus ;summis oppositis.* / Pract.Bot.de Lin. p°.P.tom.2°.69. / *Symphytum majus, tuberosa / radice.*T.Inst. R.H.138.Flora / Española tom.6°.pag.345 / *Symphytum tuberosum.*Dod. / pempt.134. / *Symphytum majus tuberosa / radice.* C.B.com.Mat.sup. D.683. / Se cria en las montañas de / Santandér,y otras muchas partes / de España.Secultiba en Cor- / doba en la Alameda,en el Hos- / pital de Jesus Nazareno y en el / del cardenal,y tambien yo la / he cultivado.Su raiz es perenne, / y florece por Abril y Mayo.

236. *Symphytum tauricum*, Willd. *Symphitum tauricum* / Willd. Enum Hort Berolin / C in R H M.

237. *Cerithe major*, L. *Cerithe (major) foliis ample- / xicaulibus,coroliis obtusiusculis / patulis.*P. B. de L.p°Palau t°.71. / *Cerithe quorundam major, / versicolor.*T.Inst.R.H.80.Flo- / ra Española t°.4°.pag.143. / Esta planta se cria en mu- / chas partes del circuito de Cor- / doba,tanto en tierras de labor co- / mo en terrenos incultos :como en / los olivares de la Galiana,en / los Olivares del Obispo junto á la / Alameda &c. es annua y florece / en los meses de Primavera.

238. *Cerithe major*, L. *Cerithe major.*

239. *Cerithe major*, L. *Cerithe Mayor* L. / Entrena.

240. *Cerithe major*, L. *Cerithe / aspera* / En las riveràs del / Guadalimar junto / ó frente de Veaz.

241. *Onosma simplicissimum*, L. *Erica species.* / *Onosma / simplicissima / w.* / Fuen-cAliente.

242. *Onosma simplicissimum*, L. *Onosma / simplicissima.*

243. *Onosma echioides*, L. *Onosma echioides.*

244. *Pulmonaria angustifolia*, L. *Pulmonaria angustifolia* / W.

245. *Echium Italicum*, L. *Echium / italicum.*

246. *Echium Italicum*, L. *Echium italicum* / W.

247. *Gregoria Vitaliana*, Dub. Aretia Viteliana / W.

248. *Primula officinalis*, Jcqu. *Primula* (veris) varietas. / *Primula* (elatior) Limbus corol- / larum planus. Lin. Sp. P. p. pu. / t.º. 108. / *Primulaveris* pallido flore, elati- / or. T. I. R. H. 124. F. / E. t.º. 6.º. 136. / *Primula Veris* altera. C. B. Com. / Matthiol. super. / Diosc. 802. / Esta Planta vegeta en nuestra Pe- / ninsula : en los / Pirineos, montes de Avila / en Castilla la Vieja &c. Quer. Se cul- / tiva en Cordoba en el Jardin del Obis- / po. Es perenne, y florece / en Marzo y / Abril, no grana semilla y se propaga de / planta, en / Cordoba. Se advierte en esta *Primula* un caracter bastante no- / (reverso) : table, y es que al mismo tiempo que levantan / sus es- / capos con las umbelas, arroja de la ra- / iz otras flores sencillas, / sostenidas de largos / pedunculos : lo que no he visto notado en nin- / guna descripción ; ni he advertido gravado en / ninguna fi- / gura de quantas de *Primulas* / he visto en diversos Autores. Por / lo que es- / toi dudoso en que esta sea la variedad de la misma / especie, ó va- / riedad, de variedad tal vez, ó acaso sien- / do este / caracter constante podria constitu- / ir especie distinta ; lo que no / se puede de- / terminar sin haver visto antes todas las / especies / y variedades de este Genero.

249. *Primula officinalis*, Jcqu. Creo ser la misma / q.º. se cul- / tiva en los Jardines / Canalia 812. / *Primula veris* / Esta es sin / cultivo.

250. *Primula officinalis*, Jcqu. *Primula veris*. W.

251. *Asterolinum stellatum*, Lk. Hffg. *Lysimachia* / *Linum* / *stellatum* / Palau. tom. 2 pag. 130 / Esta especie tiene la capsula / de 5 ventallas. / Reverso : Se cria con abundancia en / el rio de / los Molinos de Siles / bajo la peña del Olivar en toda / la madre / de dicho Rio florece por / Mayo. La determinó Entrenas.

252. *Anagallis arvensis*, L. *Anagallis Arvensis* L. / morulli. / Entrena.

253. *Anagallis arvensis*, L. *Anagallis Arvensis minima*. / morelli.

254. *Anagallis linifolia*, L. *Anagallis* / *Linifolia* / Cabrera.

255. *Anagallis*, sp. *Anagallis*.

256. *Plumbago Europaea*, L. *Plumbago* (Europaea) foliis am- / plexi- / caulibus lanceolatis scabris. Pract. / Bot. de Lin p.º. Palau / t.º. 2.º. pag. 146. / *Plumbago quorundam*. T. Inst. / R. H. 141. Fl. / Esp.º. t.º. 5.º. pag. 112. / Esta planta la he visto en mu- / cha abun-

dancia en las cercanías / de Carmona, y en todo el camino de / allí á Sevilla donde la coxi : se cul- / tiva en algunas partes de Cordoba. / Su raíz es perenne, crece de pie y / medio á dos, y florece en el Estio

257. *Calystegia sepium*, R.Br. *Convolvulus* (*sepium*) *foliis sagittatis / postice truncatis, pedunculis tetragonis u- / nifloris*. Lin. Sp. P. p^a.t^o.2^o.p^a.155. / *Convolvulus major albus*. Tourn. Inst. / Rei Herb. 82. Flor. Españ. t^o.4^o.p^a. 402. / *Smilax laevis*. Lag. in Diosc. 463. / *Smilax laevis, major*. Dod. pemp. 392. / *Smilax laevis*. C.B. comment. Ma- / ttiol super Diosc. 839. / Esta planta se cria cerca de Cordo- / ba en el Arroyo del Moro, y en otros si- / tios de esta naturaleza : crece del largo / de siete ú ocho pies enredada entre los ar- / busculos : su raíz es perenne, y flore- / ce en los Meses de Julio y Agosto.

258. *Calystegia sepium*, R. Br. *Convolvulus Sepium*.

259. *Ipomoea purpurea*, Roth. Class. V Pentandria Ord. Monoginia / *Convolvulus Purpureus* / Lin. Tom. 2^o. pag^a. 159 / *Convolvulo Purpureo* / (Vulgo) Marabillas.

260. *Convolvulus althaeoides*, L. *Convolvulus althaeoides*.

261. *Convolvulus althaeoides*, L. *Convolvulus* (*Althaeoides*) *foliis cordatis sinuatis seri- / ceis : lobis repandis, pedunculis bifloris*. Pract. Bot. de Lin. / por Palau t^o. 2^o. pag. 167. / *Convolvulus peregrinus, pulcher, folio Betonicae*. T. / Inst. R. H. 85. Flora Española t^o. 4^o. pag. 405. / Esta especie se halla mui frecuente en los pare- / dones / y laderas de los campos del circuito de Cordoba : su raíz es / perenne, sus tallos crecen á dos pies enroscados, ó postrados.

262. *Convolvulus pentapetaloides*, L. *Convolvulo de 5 lacinias*.

263. *Convolvulus lineatus*, L. *Convolvulus lineatus*.

264. *Ipomoea sagittata*, Poir. *Convolvulus Wheleri* / W.

265. *Convolvulus lineatus*, L. *Convolvulo / rayado*.

266. *Convolvulus lanuginosus*, Desr. *Convolvulo / capitatus* / Cab. 237 / V. 3 de Julio.

267. *Ipomoea Quamoclit*, L. *Ipomea quamoclit*.

268. *Campanula patula*, L. *Campanula Patula* / ó / C. — Carece de ojas, y no / se puede determinar la especie / Entrena.

269. *Campanula patula*, L. ¿*Campanula Patula?* / C. / Entrena. (Otra etiqueta) : *Campanula* / Vngr.

270. *Campanula patula*, L. *Campanula Patula Cav^a*.

271. *Campanula hispanica*, Wk. Campanula / tenera — tier-necita.
272. *Campanula Rapunculus*, L.? Campanula ó prismato / carpus porosa.
273. *Prismatocarpus nitidus*, L'Hérit. Campanula hybrida (tachado hybrida) / prismato / carpus / Webb.
274. *Specularia Speculum*, A.DC. Campanula Speculum / L. / C in R H M.
275. *Specularia Speculum* A.DC Campanula speculum (tachado speculum) / hybrida W.
276. *Specularia hybrida* A.DC. Campanula / hibrida.
277. *Campanula Erinus*, L. Campanula Erinus.
278. *Campanula Rapunculus*, L. Campanula Hispidula / rapunculus.
279. *Campanula Loefflingii*, Brot. Campanula / erinoides / W.
280. *Campanula Loefflingii*, Brot. Campanula / moliis an Saxatilis? (tachado) / erinoides W.
281. *Campanula*, sp. Campanula / Viznagar 3 de Julio / No se ve bien la / fig^a de las ojas.
282. *Campanula*, sp. Plumbago? / Pentandria / Estigma partido en 3 / 5 escamas cubren al germen / Campanula / Arroyofrio 17 Agt^o.
283. *Campanula*, sp. Campanula / Vzgr.20 Julio.
284. *Campanula mollis*, L. Campanula / velutina.
285. *Campanula mollis*, L. Campanula / microphila?
286. *Campanula mollis*, L. Campanula microphila. / de Cavanilles / Amo 11 Jul.
287. *Campanula*, sp. Campanula / species nova? / Prismatocarpus species.
288. *Campanula saxatilis*, L. Campanula / saxatilis W.
289. *Trachelium caeruleum*, L. Trachelium Coeruleum / vulgo — Hermosilla.
290. *Samolus Valerandi*, L. *Samplus* (Valerandi).Pract.Bot. / de Lin.p^r.Palau.t^o.2^o.p^a.234 / *Samolus valerandi*.T.Inst. / R.H. 143. F.E.t^o.6^o.p^a.249. / Esta yerba se cria con abundancia en Cordoba en las margenes de Guadalquivir,y en el Arroyo de Pedroches,y otros sitios bañados de Agua limpia.Es perenne y florece en Julio y Agosto. / La dan el nombre de Yerba / de

la Erisipela, por el uso que / se hace de ella en esta enferme- / dad, aplicandola machacada, y cu- / randola.

291. *Lonicera Caprifolium*, L. *Lonicera caprifolium*.

292. *Lonicera Caprifolium*, L. Class, quinta Pentandria Ordo / Monoginia / *Lonicera caprifolium* / Linneo p^r. Palau t^o. 2^o. / pag^a. 255 = *Lonicera* / *caprifolio* (vulgo) Ma- / dre-selva. Se cria a- / bundantem^o. en la sie- / rra de Cordova y espar- / ce a el tpo de estar flo- / rida un suave y a- / gradable olor a lar- / ga distancia p^r. / lo que se seria aprecia- / ble en los jardines = / virtudes / Sus ojos son vulne- / rarias y detersibas y / el agua destilada de / sus flores quita la in- / flamacion de los ojos / ved a / Linn.p^r. / Pal.t^o. y / p.citada.

293. *Lonicera Periclymenum*, L. *Lonicera periclymeno*.

294. *Lonicera Periclymenum*, L. *Lonicera Periclime* / num.

295. *Mirabilis Jalapa*, L. *Mirabilis* (Jalapa) *flicribus congestis* termi- / nalibus erectis. L.d.P.p^r.p^u.t^o.p^a. 274. / *Jalapa* flore purpureo. Tourn. / Inst.R.H.129.Fl.Esp.t^o.5.^op^a.257. / *Solanum Mexicanum*, flore mag- / no.C.B.P.168. / *Admirabilis* perviana, flore varii / coloris albo rubicunda. (Et altera species) / Swent. Florileg. lib.2^o.fol.24. / vulgo Don Diegos ó Juanes de noche, y en / Cordoba Don Pedros. / Esta planta havita en todas partes, por la variedad y her- / mosura del color de sus en una y otra / India: se cultiva en toda España: en Cordo- / ba flores, varia tam- / bien de magnitud pues la hai enana. / Crece a la altura de tres pies mui ramosa / su raíz es perenne; florece en el verano.

296. *Coris Monspeliensis*, L. *Coris monspeliensis* / W.

297. *Verbascum Thapsus*, L. *Verbascum* / *thapsus* W.

298. *Verbascum phoeniceum*, L. *Verbascum phoeniceum* / 29 de Mayo a la subida / de S.Estevan junto al Convto. / de S. Francisco, y vi otras / dos plantas á la salida / de Andujar por la tro- / cha, y no he visto otras / es planta mui bonita.

299. *Verbascum Blattaria*, L. *Verbascum blataria* / Mi amado y querido Jose no / puedes tener una ydea de lo q^o. / me an conplasido tus dos cartas , y saber te allas bien disfrutan- / do de una completa salud esto... (reverso): ente q^o. pueda causarte la me / nor inconioididad fueras a ma / drid y tubieras el gusto de ber a / tus amigos y despues te binie / ras con el generar esto no qui / ta para q^o. tu con mas conosimi / ento agas lo q^o. mejor te aco- mo / des pero tu benida no quiero / ...

300. *Datura Stramonium*, L. *Datura* (*Stramonium*) pericarpium spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. Pract. B. de L. p. P. t.º. 2º. / 288. / *Stramonium* fructu spinoso, oblongo, flore albo. T. Inst. R. Herv. / 119. Flora Esp. t.º. 6º. p.ª. 336. / *Solanum foetidum spinosum*. / c. B. com. Mat. in Diosc. 228. / Esta planta dicen ser originaria de America; pero se halla connaturalizada en nuestra Peninsula: en Cordoba se cria con abundancia en las orillas del Rio, particularmente desde el arenal hasta el Molino de Martos. Crece de quatro pies de alto: es annua, y florece en los meses de Julio y Agosto.

301. *Datura Metel*, L. *Datura* (*Metel*) pericarpium spinosis nutantibus globosis, foliis cordatis subintegris pubescentibus. / Pract. Bot. de Lin. p. Pal. t.º. 2º. 290. / *Stramonium* fructu spinoso, rotundo, flore albo simplici. T. Inst. / R. H. 118. Flora Española t.º. 6º. 337. / *Stramonium*. Lag. 421. / Esta especie he visto cultivada en el Jardin Botánico de Sevilla donde coji este esqueleto: despues la he observado en Cordoba en la orilla del Rio al lado de alla de la ciudad, mas arriba de la Zua: lo que estrañe. en el año de 1793.

302. *Datura arborea*, L. *Datura* *Arborea* Cav.ª. / En cambio de la *Catalpa ternifolia* Cav.ª. q.º. creo es la q.º. me remitió.

303. *Hyoscyamus albus*, L. Class. V Pentandria Ord. Monoginia / *Hiosciamus Albus* / Linn. Tom. 2º. pag.ª. 293 / *Hiosciamus* blanco (vulgo) Beleño blanco.

304. *Hyoscyamus physaloides*, L. *Hyoscyamus Physaloides* / Linn. / C in R H M.

305. *Nicotiana Tabacum*, L. Class. V Pentandria Ord. Monoginia / *Nicotiana Tabacum* / Linn. Tom. 2º. pag.ª. 298 *Nicotiana* / *Tabaco* (vulgo) *Tabaco* / *Habitaba* solo en America hasta q.º. *Nicotiana* la introdujo en Europa.

306. *Nicotiana rustica*, L. *Nicotiana* (*Rustica*) foliis petiolatis ovatis integerrimis, floribus obtusis. Lin / Sp. Plant. p.ª. p.ª. tom. 2º. pag. 299 / *Nicotiana minor*. T. I. R. H. 117. / *Hyoscyamus tertius*. C. B. comm. / Matth. super. Diosc. 750 / vulgo: *Tabaco* fino ó *tabaco* pequeño. / Esta Planta es originaria de la America como todas las demas especies de este Genero; y esta muy extendida en Cordoba (tachado Cordoba) / Europa: en Cordoba se halla en muchas casas / donde la conocen por aquel nombre vulgar. /

Es annua, crece de dos pies de alto, y flore- / ce en los Meses de Julio y Agosto.

307. *Atropa Belladonna*, L. *Atropa* (Belladonna) caule herba- / ceo, / foliis ovatis integris. L.S.P.p^r.pⁿ.t^o.2^o.302. / *Belladonna* majoribus foliis, et / floribus. T.I.R.H.77.F.E.t^o.3^o. / 203. / *Solanum* lethale. Dod. pempt.456. / *Solanum* somniferum. Swert. flo- / rileg. lib.2^o. fol.20. / *Solanum* majus sive herba Bel- / ladonna. C. B. comm. Mat. sup. Diosc.756 / Esta Planta se cria en España en te- / rrenos incultos, desiertos, y sombríos: en el / monte de ntra. S.^{ra} de Monserrate: &c. / Quer. a he cultivado en Cordoba y he / remitido semilla de ella al Jardin Bo- / tanico de Sevilla. Es pe- / renne, crece de / quatro pies de alto, y florece por Junio. / Es nar- / cotica y venenosa: sus frutos comi- / dos matan, y se socorre este peligro con / los acidos vegetales, como el de Limon &c.

308. *Nicandra physaloides*, Gaertn. *Nicandra physaloides*, W. / *Atropa physaloides*. (Lin).

309. *Nicandra physaloides*, Gaertn. *Atropa Physalodes*.

310. *Physalis*, sp. *Physalis*...? / Entrena.

311. *Withania somnifera*, Dun. *Solanum* / ¿ *Physalis somni- / fera* L.? / no hai fruto p^r lo q^o dudo / Entrena.

312. *Withania somnifera*, Dun. *Physalis* (sommifera) caule fruticoso, / ramis rectis, floribus confertis. Lin. Sp. / Plant. p^r.pⁿ. t^o.2^o.p^a.306. / Alkekengi fructu parvo, verticillato. / Tourn. Inst. R.H.151. Fl. Esp. t^o.2^o.224. / *Solanum somniferum*. Dod. pempt.455. / En Cordoba Orobale. / Se cria en Andalucia, y señaladamen- / te en Malaga. Se cultiva en Cordoba en / muchas casas, donde ha- / cen mucho uso de / las hojas para las ulceras de las piernas. / Crece á la altura de tres ó quatro pies, y / es perenne, florece en el Verano.

313. *Physalis Alkekengi*, L. *Physalis* (Alkekengi) foliis ge- / minis inte- / gris acutis, caule herbaceo inferne ramoso. / Lin. Sp. Plant. p^r.pⁿ. t^o.2^o.p^a.310. / Alkekengi officinarum. Tourn. Inst. R. / Herb.151. Flora Española t^o.2^o.p^a.222. / *Solanum vesicarium* Dod. pempt.454. / *Solanum Halcacabum*. Lag. n. Diosc.419. / O.B.com. Matth. sup. Diosc.754. Swert. / Florileg. 1b.2^o. fol.20. / vulgo: Vegi- / ga de Perro. / Se cria en España en las viñas, y cerca som- / brias, particularmente en las de Castilla la Vieja / y en el Real sitio de Aranjuez. &c. Quer. / Se cultiva en Cordoba; donde la he cultivado y he propagado. Produce los tallos de dos pies de largo, / y debi-

les, su raiz es perenne, y rastrera, florece por Ma- / yo y Junio. Su fruto tiene uso en la Medicina.

314. *Physalis angulata*, L. *Physalis Angulata* Lin. / C in R H M.

315. *Withania frutescens*, Pauq. *Physalis tuberosa* Cav^a. / C in R H M.

316. *Solanum diphyllum*, L. *Solanum* (*diphyllum*) caule iner- / mi fru- / ticoso, foliis geminis, altero minore, flo- / ribus cymosis. Lin S.P : p^r.p^u.t^o.2^o 315. / An : Rubrum? / Esta Planta fue traída á Cordoba / el Año de 1790 remitida por D^a. Pedro / gutierrez Troncoso Boticario en el Pu- / erto de St^a. Maria, con el nombre de / hierva de la abundancia. / Produce el tallo angular y ahorqui- / llado, / perece en el invierno ó á lo menos padece / mucho en el, segun la graduacion del frio. Florece por Septiembre y Octubre / crece á la altura de tres pies.

317. *Solanum Dulcamara*, L. Class V Pentandria. Ord. Mo- / noginia / *Solanum Dulcamara* / Linn. Tom. 2^o. Pag^a. 315 / Solano dulce-amargo.

318. *Solanum Dulcamara*, L. *Solanum dulcamara* / varietas β.

319. *Solanum Dulcamara*, L. *Solanum* (*Dulcamara*) caule / inermi fru- / tescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, / ra- / cemis cymosis. L. Sp. P. p^r.p^u.t^o.2^o.p^a.315. / *Solanum scandens*, seu *Dulcamara*. T. / Inst. R. H. 149. F. E. tomo 6^o. p^a. 316. / *Dulcamara*. Dodon. pempt. 402. / en Cordoba : vulgo Yerva de la cuchillada. / Esta Planta se halla en las cercanias / de Cordoba en sitios ume- / dos : en la desembocadu- / ra del Arroyo Rabanales al Rio, Soto de quema- / dillas &c. y en la Ciudad la tienen en mu- / chas casas, donde hacen uso de ella en las / heridas por lo que le dan aquel nombre. / Sus tallos crecen echados del largo de / diez ó doce pies : es perenne y florece en / Mayo y Julio.

320. *Lycopersicum esculentum*, Mill. Class. V. Pentandria / Ord. Monoginia / *Solanum Lycopersicum* / Linn. Tom. 2^o. pag^a. 319. / Solano Licopersico (vulgo) Tomates.

321. *Solanum nigrum*, L. *Solanum Nigrum* / Entrena.

322. *Solanum Sodomaeum*, L. *Solanum* (*Scdomeum*) caule / aculeato fruticoso / tereti, foliis pinnatifide-sinuatís sparse acu- / leatis nudis, calycibus aculeatis. L. S. P. p^r.p^u. / tomo 2^o. p^a. 329. / bita en Africa. Linneo. / Este Solano se cultiva en los Jardines / Botanicos de España : fue venida su semi- / lla á Cordoba el

Año de 1792 enviada / por don Pedro Abat, Catedrático de Bota- / nica del Jardín de Sevilla. / Crece a la altura de tres ó quatro / pies : es perenne, y florece en los Meses / de Abril Mayo, y Junio : / sus frutos son / del tamaño de Nueces, y estan maduros en / el Ynvierno.

323. *Solanum cornutum*, Lam. *Solanum Cornutum* / Lamark / C in R H M.

324. *Lycium vulgare*, Dun. *Lycium* (*Barbarum*) foliis lance- / olatis, calycibus subbifidis. Pract. / Bot. de Lin. p.º. Palau t.º. 2.º. / p.º. 345. / Habita en Africa y Europa. Pal. / Esta especie de Lycio / es un Ar- / busto endeble que crece de tres / á quatro pies poco / mas ó menos / muy poblado de ramas : es peren- / ne y florece en / el estio. / Hállase cultivado en el Jar- / dín Botánico de Sevilla, / en / donde cogi este esqueleto, año / de 1793.

325. *Lycium Europaeum*, L. *Lycium* (*Europaeum*) foliis obli- / quis, ramis flexuosis teretibus. / Practica Bot. de Lin. p.º. P. t.º. 2.º. / 346. / vulgo Cambronera. / Este Arbusto se halla en las / inmediaciones de Cordoba formando / ballados, por la espesura de sus / ra- / mas armadas de agijones. Crece de / cinco á seis pies de alto, / es peren- / ne, y florece en Agosto y Septi- / embre.

326. *Erythraea spicata*, P. *Chironia Spicata* (Willdenow).

327. *Erythraea spicata*, P. *Chironia Spicata* W. / Entrena.

328. *Erythraea Centaurium*, P. *Chironia Centaurium* (Wild).

329. *Rhamnus infectoria*, L. 32, H / Ramus infectorius? / grain: doavignon.

330. *Rhamnus Frangula*, L. *Rhamnus Frangula*? / W.

331. *Rhamnus Alaternus*, L. *Rhamnus* (*Alaternus*) inermis, / floribus dioicis, stigma- / te triplici, foliis serratis. Pract. B. de / Lin. p.º. Pal. t.º. 2.º. p.º. 385. / Alaternus. I. (et II) Clus. histor. 56. T. Inst. R. / H. 595. Flora Española t.º. 2.º. pag. 200 non videatur ejus fig.º. / Este arbusto se cria en Cordoba en varias partes de / su Sierra, y / le tengo observado, en los Vallados de los Palacios / de la Galiana el sexo femenino en distinto pie que el masculi- / no. Crece / á la altura de un hombre ó algo mas, es peren- / ne y florece en / los meses de Febrero y Marzo.

332. *Rhamnus Alaternus*, L. *Rhamnus alaternus* W. / seu / Philica elatior Bauh. / 20 de Marzo.

333. *Rhamnus Alaternus*, L. *Rhamnus Alaternus* / Cabrera.

334. *Zizyphus Spina-Christi*, Willd. Ramno espina de / Christo / de 5 ojuelas.

335. *Zizyphus vulgaris*, Lam. Rhanus Zizifus / Vulgo- Azo- faifo.

336. *Rhamnus Alaternus*, L. Rhamnus Hispanicus, folio Bu- xi, / minor. T. 593. Q. t.º. 6º pag. 199. / vulgo : Tamujos. Cordubae.

337. *Rhamnus lycioides*, L. Rhamus / lycioides.

338. *Ribes rubrum*, L. Ribes rubrum / Grosellero / Caban. p. 380. / Jaen Hacienda del Doctoral.

339. *Lagoaecia cuminoides*, L. Lagoaecia cuminoides.

340. *Celosia cristata*, L. Celosia (coccinea) foliis ovatis stric- / tis inauriculatis, caule sulcato, spicis / multiplicibus cristatis. Pract. Bot. / de Lin. p.º. Palau t.º. 2º. p.º. 461. / Amaranthus panicula incurva. / T. I. R. H. 235. F. E. t.º. 2º. p.º. 283. / Amaranthus holoseri- / cus sangui- / neus reticulatis floribus. Swent. Flo- / rileg. lib. 2º. fol. 21. / en Cordoba : vulgo Borlas. / Habita en la India. Lin. / Se cuitiva en España : en Cordoba / en todos los Jardines, y casas particulares, / por su color, y varia disposicion de sus cres- / tas, las he visto formano una perfec- / ta esfera de seis Pulgadas de diame- / (reverso) : tro. Crece á la altura de tres ó quatro / pies, es annua, y florece en los Meses / de Agosto, y Septiembre.

341. *Illecebrum*, sp. Illecebrum...

342. *Chaetonychia cymosa*, Wk. Illecebrum cymosum / W.

343. *Paronychia argentea*, Lam. Illecebrum (Paronychia) flo- / ribus bracteis nitidis obva- / llatis, caulibus procumbentibus, foliis laevibus. Pract. / Bot. de Lin. p.º. Palau tomo 2º. pag. 467. / *Parony- / chia Hispanica*. T. I. R. H. 507. Quer / Flora Española t.º. 6º. pag. 63. = vulgo : *Sanguinaria* / Esta se cria en el circuito de Cordoba, en te- / rrenos guijarrosos, y en los caminos, como en toda la cu- / esta de la Ásomadilla. &c. su raiz es p.º. uorece en Mº

344. *Paronychia capitata*, Lam. Illecebrum capitatum / Siles de Segura 812.

345. *Paronychia pollygonifolia*, DC. Illecebrum / polygonoi- / des / W.

346. *Paronychia alsinefolia*, Juss. Illecebrum / alsinefolio / W.

347. *Chaetonychia cymosa*, Wk. Illecebrum Cimosum / Ca- / brera

348. *Thesium pratense*, Ehrh. Esta planta qº. Vmd me dio p.º. deter- / minarla y qº. sospechaba Vmd se un / Plumbago, es el /

thesium Linophylum.L. / varietas α mui bien. / Clase 5ª.Ordª
1º.florª. incompletas.

349. *Vinca major*, L. *Vinca major* / *Vinca* (minor) caulibus
procum- / bentibus,foliis lanceolato-ovatis / floribus pedunculatis.
Pract Bot. / de Lin.pª.Palau tom.2º.pag.492. / *Pervinca vulgaris*,
angustifo- / lia,flore coeruleo.T.Inst.R.H. / 120.Flora Esp.tom.
6º.pag.82. / *Clematis prima*.C.B.com. / Matthiol.sup.Diosc.679.
/ *Clematis Daphnoides*.Dodom. / pempt.405 / *Clematis*.Lag.380.
(Reverso) :Farm.Vincapervinca. / vulgo :Yerba Doncella. / Esta
planta se cria en Cordo- / ba en el arroyo de las peñas detras / de
la Huerta del Naranja,en el de / Pedroches detras del Molino del
pa- / pel con mucha abundancia,y en / todos los arroyos,Huertas
y sitios / humedos de la sierra.Produce los / tallos mui largos,
tendidos por tier- / ra,es pª. y florece pª. Abril,y sigue.

350. *Ceratonia Siliqua*, L. *Ceratonia Siliqua*.

351. *Atriplex laciniata*, L. *Atriplex Laciniata* L. / Entrena.

352. *Vincetoxicum nigrum*, Mnch. *Asclepias nigra* / Vzgr.
(Otra etiqueta) :Si es lo qª creo pª. la oja / Lo tengo Deter /
minado por / *Apocynum Venetum* / y lo veremos fresco. / Entrena.

353. *Gomphrocarpus fruticosus*, R.Br. *Asclepias Syriaca* (ta-
chado Syriaca) / fruticosá.

354 *Stapelia variegata*, L. Class.V Pentandria Ord.Diginia /
Stapelia Variegata / Linn. Tom.2ºpagª.568 / Estapelia de varios
colores. (Otra etiqueta dice) :*Stapelia Variegata*.Foliculos.

355 *Chenopodium urbicum*, L. *Chenopodium urbicum*.

356 *Chenopodium rubrum*, L. *Chenopodium rubrum*.

357. *Chenopodium murale*, L. *Chenopodium Murale* (Lin).

358. *Chenopodium hybridum*, L. *Chenopodium hybridum*.

359. *Chenopodium urbicum*, L. *Chenopodium urbicum* Lin /
ó , *Chenopodium hibridum*.Lin / Son muy parecidas algunas /
especies de este genero de / modo qª. tal vez seran solo / varie-
dades

360. *Chenopodium hybridum*, L. *Chenopodium Hybridum* L.
/ Entrena

361. *Chenopodium Botrys*, L. *Chenopodium* (Botrys) foliis
oblongis sinuatis,rave- / mis nudis multifidis.Pract. B. de L. pª.
Pal.º.2º.pag.580 / *Chenopodium Ambrosioidis*,folio sinuato.T.Inst.
/ R.H.509.Flora Española tª.4º.pag.223. / *Botrys*.Lag.346.C.B.
com.Mat.620.Dod.pem.34. / Esta planta es común en el circuito

de Madrid y otras / partes de España. *Qer. La* he cultivado en Cordoba / algunos años :es annua y florece en Julio y Agosto.

362. *Chenopodium ambrosioides*, L. *Chenopodium*...? / ambrosioides / botris W. / foliis lanceolatis / integris.

363. *Chenopodium ambrosioides*, L. *Chenopodium* / Ambrosioides. / the de España.

364. *Kochia scoparia*, Schrad. *Chenopodium Scoparia* L. / *Eutrena*.

365. *Chenopodium album*, L. *Chenopodium albicans* / vulgaria.

366. *Salsola Tragus*, L. *Salsola* (*Tragum*) herbacea, erecta, foliis su- / bulatis spinosis laevibus, calycibus ovatis. *Lin / Spec. Plant. p^r. p^u. t^o. 2^o. p^a. 589.* / *Kali spinosum*, foliis longioribus, et angustioribus. *T. I. R. H. 247. F. E. t^o. 5^o. 298.* / *Tragum*. *Lag. in Diosc. 405. CB. com- / ment. Mattiol. super Diosc. 730.* / Esta planta se cria con mucha abun- / dancia en Cordoba, en las margenes de Gua- / dalquivir, como en el arenal, los Pelambres, / y en la Ysla de los Molinos por bajo del / Puente. Es annua y florece en los Meses / de Julio y Agosto.

367. *Salsola Tragus*, L. *Salsola tragan*. L.

368. *Comphrena globosa*. L. *Gomphrena* (*Globosa*) caule erecto, foli- / is ovato-lanceolatis, capitulis silitariis, / pedunculis diphilis. *Lin. Sp. P. p^r. p^u. t^o. 2^o. 603.* / *Amarantoides*, *lychnidis* folio, ca- / pitulis purpureis. *T. I. R. H. 654. Flora / Española tom. 2^o. 281.* / vulgo :Siemprevivas encarnadas. / havita en la India. *Lin. / Se cultiva esta Americana plan- / ta en los Jardines de España :en Cor- / doba esta mui estendida, y asi la hai / en todas partes. Varia con las cabezuelas / blancas ó de color de Plata. Es annua, / crece a la altura de pie y de medio, florece / en los Meses de Julio, Agt^o y Septiembre.*

369. *Ulmus campestris*, L. Almotesa ú olmo.

370. *Eryngium*, sp. *Eringium*.

371. *Eryngium tricuspdatum*, L. *Eringium tricuspdatum* / W.

372. *Eryngium tricuspdatum*, L. *Eringium tricuspdatum* / W.

373. *Eryngium maritimum*, L. *Eringium* / *Maritimum* / Ca- brera.

374. *Eryngium campestre*, L. *Eryngium* (*Campestre*) foliis

radicalibus ample- / xicaulibus pinnato-lanceolatis. Pract. Bot. de L. / p^r. Palau t^o. 2^o. pag. 641 / *Eryngium vulgare*. T. I. R. H. 327. F^o. E^a. V. 82. / *Eryngium*. Lag. 279. = *montanum*. C. B. com. 505. / Esta se cria en los campos del circuito de Cordoba, la / llaman vulgarment^o. *cardo cudo* y correder: su raiz / es perenne, florece en los meses de Mayo y Ju^o.

375. *Eryngium amethystinum*, L. *Eryngium coeruleum* (tachado *coeruleum*) / *Ametistinum* / 55 H.

376. *Bupleurum rotundifolium*, L. *Bupleurum* / *Rotundifolium*.

377. *Bupleurum rotundifolium*, L. *Bupleurum* / *rotundifolium*.

378. *Bupleurum rotundifolium*, L. *Bupleurum* (*rotundifolium*) *invo-* / *protractum* Link. / *lucris universalibus nullis, foliis* / *perfoliatis*. P. B. de L. p^r. P. t^o. 2^o. 654. / *Bupleurum perfoliatum*, / *rotundifolium*, *anun.* T. Inst. / R. H. 310. *Flora Esp.* t^o. 3^o. 332. / *Perfoliata*. C. B. com. Mat. / *super Diosc.* 805. *Dod. pempt.* 104. / Esta planta se cria entre los / sembrados, de las inmediaciones / de Cordoba, particularmente / en los de hacia la Alameda. Es / *annua*, y florece en Mayo y J^o.

379. *Bupleurum rotundifolium*, L. *Bupleurum rotundi-* / *folium* / 25. H.

380. *Bupleurum Odontites*, L. *Bupleurum* / *Odontites* / *Cabrera*. (Otra etiqueta): *Bupleurum Semicompositum* / *Entrena*. (Otra etiqueta): *Bupleurum?* / 33 / C.

381. *Bupleurum fruticosum*, L. *Bupleurum* / *fruticosum*.

382. *Bupleurum fruticosum*, L. *Bupleurum* (*Fruticosum*) *frutescens*, / *foliis obovatis integerrimis*. Pract. Bot. / de Lin. p^r. Palau t^o. 2^o. pag. 662. / *Bupleurum arborescens*, *Salicis-* / *folio*. T. Inst. R. H. 310. *Flora España-* / *la tcm.* 3^o. pag. 334. / *Seseli Aetiopicum frutex*. / *Dodon. pempt.* 312 / Esta especie se cria en el Reyno / de Córdoba junto á Baena: la he / visto cultivada en el Jardín Botánico / de Sevilla donde coji este esqueleto. / Es perenne, y crece á la altura de / un hombre poco mas ó menos, muy / poblado de tallos.

383. *Bupleurum frutescens*, L. *Bupleurum...*? / *frutescens*. / 23 L.

384. *Torilis Anthiscus*, Gmel. *Torilis antriscus*.

385. *Caucalis daucoides*, L. *Caucalis Daucoides*.

386. *Caucalis daucooides*. L. *Caucalis* (Daucooides) *umbellis trifidis aphyllis, umbellulis trispermis triphyllis*. P.B. de L. p^r. Pal. tom. 2^o. pag. 675. / *Caucalis Monspeliaca, echinato magno fructei*. T. I. / R.H. 323. Flora Española t^o. 4^o. pag. 98. est. ? / Esta planta se cria en los campos de labor del circuito de / Córdoba : es annua. Haunque de aquellos caracteres especificos / de *Jacquin* aplicados p^r. Palau á esta especie se colige carecen / de involucro universal ; supone Lineo expresamte. tenerlo / quando la describe en su Sp. plant. 3. edic. pag. 346. por lo / que me inclino á que la nuestra es la especie dicha, variando en tener involucro universal y no tenerlo, como tambien en el numero de las semillas, cuyas variaciones parece / se observan en las mas de las especies de este Genero.

387. *Turgenia latifolia*, Hoffm. *Caucalis latifolia* / Linn. et Cabanilles.

388. *Turgenia latifolia*, Hoffm. *Caucalis latifolia* / W.

389. *Caucalis arvensis*, Huds. *Caucalis Arvensis*. W.

390. *Ammi Visnaga*, Lam. *Daucus visnagoides* Entrena. / D. seminibus levibus, umbella univ. basi coalita, involucro / bi-triphylo petala integra. / Vulgo visnagorro.

391. *Ammi Visnaga*, Lam. *Daucus Visnaga* L.

392. *Daucus muricatus*, L. Class. V. Pentandria Ord. Diginia. / *Daucus Muricatus* / Linn. Tom. 2^o. pag^a. 684 / Dauco con puntas rigidas.

393. *Daucus muricatus*, L. *Daucus muricatus*.

394. *Daucus gummifer*, Lam. *Daucus Lucidus*. W. / Es parecido al D. Mauritanico / y al D. Carota. Se diferencia del 1^o. / en no tener flosculo central este / y del 2^o. en la oja y peciolo / lampiños.

395. *Daucus hispidus*, Desf. *Daucus Hispidus* Entrena. / D. seminibus radi umbellule tribus / hispidis, centrali vero tuberculosa, / involucro universali pinato, partiali / que ternati, caule hispido tenuifolio. / Corrija Vmd el Latin.

396. *Ammi majus*, L. *Ammi Majus*. W.

397. *Capnophyllum peregrinum* (L.) Nob. *Conium* / *Dicotimum* / Cabrera.

398. *Selinum carvifolium*, L. *Selinum* (*Carvifolia*) caule sulcato / acutangulo, involucro, universali evanido, pistillis fructus reflexis. Pract. / Bot. de Lin. p^r. Palau t^o. 2^o. 695. / Se cria esta planta en España / en la Alcarria, Asturias, y otras / partes. Vease á

Palau. / Me dio este esqueleto en Sevi- / lla Don Anastasio Guzman, con / aquel nombre generico y especi- / fico. año de 1793.

399. *Peucedanum Cervaria* (Cuss), Lapeyr. 34.H / *Athamanta cervaria*?

400. *Athamanta Mathioli*, Wulf. 2°.H. / *Athamanta Mathioli* W.

401. *Crithmum maritimum*, L. *Crithmum* (Maritimum) foliolis / Lanceolatis carnosis. Pract. Bot. de L. / p°. Palau t°. 2°. pag. 706. / *Crithmum*, foeniculum mariti- / mum, minus. T. Inst. R. H. 317. Flo- Española tom. 5°. pag. 14. / *Crithmum* marinum. Dodon. / pemp. 705. / *Crithmum* I. Casp. Bauhin. / comment. Mat. sup. Diosc. 381. Lag. 212. / Se cria en las costas del Mar / Mediterraneo y Oceano en España. / vide Quer. La halle cultibada en / el Jardin Botanico de Sevilla don- de coji este esqueleto. año de 1793.

402. *Magydaris panacifolia* (Vahl.), Lange. ¿ *Cachrys Panacifolia* W. ? / Esto: muy dudoso en el nom / bre de esta Planta, cuya semilla / no está madura ni en estado / de ver nada. Sube a la altura de / un hombre y las ojas caulinas ternadas. /

403. *Ferula Tingitana*, L. *Ferula tingitana* L. / Como las ojas radicales y del / tallo se habian secado podra / haber variacion en la especie.

404. *Heracleum Sphondylium*, L. *Heracleum sphondylium* / 35. / H.

405. *Apium nodiflorum*, Rchb. *Sium nodiflorum*, L. / Orilla del Manzanares.

406. *Oenanthe prolifera*, L. *Oenanthe* / *Prolifera*.

407. *Oenanthe Phellandrium*, Lam. *Phellandrium Acuatium* L.

408. *Ligusticum Mutellina*, Grantz. *Phellandrium Mutellina* ? / No he visto la oja radical / pero la semilla es de *Phellandrio*.

409. *Bifora testiculata*, Spreng. in Schult. *Coriandrum* (testiculatum) fructibus didymis. Pract. / Bot. de Lin. p°. Palau t°. 2°. pag. 759. / *Coriandrum* minus testiculatum. T. Inst. R. H. / 316. Que Flora Española t°. 4°. pag. 427. / *Coriandri* altera Ircon. Dod. pempt. 302 / Esta especie se halla en los campos de Cordoba en ti- / erras de labor : es annua florece en Abril y M°.

410. *Bifora testiculata*, Rchb. Cilantro / de testiculos.

411. *Myrrhis odorata*, Scop. *Scandix odorata* / W. (Otro ejemplar y otra etiqueta) : *Scandix* / *odorata*.

412. *Scandix Pecten Veneris*, L. *Scandix Pecten veneris*. L.
413. *Scandix Pecten Veneris*, L. *Scandix* (Pecten veneris) seminibus rostro longissimo. P. / Bot. de Lin. p^r. Palau t^o. 2^o. pag. 761. / *Scandix* semine rostrato, vulgaris. T. Inst. R. H. / 326. Flora Española t^o. 6^o. pag. 262. / *Scandix*. Lag. 222. C. B. com. Matth. / *Scandix* Pecten Veneris. Dod. pemp. 701. / Es muy común esta planta entre los sembrados del circuito de Córdoba: es anual y florece en Abril y M^o.
414. *Anthriscus vulgaris*, Pers. *Scandix Anthriscus* / W. / *Cherophilum Anthriscus* / Ventenat.
415. *Scandix australis*, L. *Scandix* / australis.
416. *Peucedanum Ostruthium*, Koch. *Imperatoria* (Ostruthium) Lin. Sp. Plant. / p^r. p^o. t^o. 2^o. p^a 773. / *Imperatoria* major. Tourn. Inst. R. H. / 317. Flora Española t^o. 5^o. 270. / *Astrantia*. Dodod. pemp. 320. / Farm. *Imperatoria*. / Se cria en los Montes Pirineos de Cataluña, / en el Moncayo de Aragón, y en otros muchos / de nuestra Península. Quer. Es perenne: y / florece por Junio y Julio. / La he cultivado, y se cultiva en Córdoba en / la Alameda en el Hospital del Cardenal &c. / y en el Año de 1794 remiti desde esta Ciudad á la de Sevilla, á D^a. Pedro Abat Catedrático de Botánica en la Sociedad Médica, / una Planta arraigada para aquel Jardín.
417. *Elaeoselinum Loscosii*, Lange. *Thapsia Asclepium*. L.
418. *Opopanax Chironium*, Koch. *Pastinaca opopanax*. W. / No tenía ya ojos.
419. *Smyrniium perfoliatum*. L. *Smyrniium Perfoliatum* L. / En la bajada p^a el olivar de / Val de las huertas 19 Junio.
420. *Smyrniium perfoliatum*, L. *Smirniium* / perfoliatum.
421. *Apium nodiflorum*, Rchb. *Sium Repens* W (tachado Repens W) / *Sium Nodiflorum* L. (Otra etiqueta dice): *Anetum Segetum* L.?
422. *Trinia vulgaris*, DC. *Pimpinella Glauca*. L. / sera *Seseli pimpinelloides*?
423. *Pimpinella villosa*, Schousb? *Pimpinella* ahorquillada / *Orchis*.
424. *Viburnum Tinus*, L. *Viburnum tinus*. W.
425. *Viburnum Tinus*, L. *Viburnum* / *Thinus* / Cabrera.
426. *Viburnum Lantana*, L. *Viburnum* lantana.
427. *Viburnum Lantana*, L. *Viburnum* lantana / W.

428. *Viburnum Opulus*, L. *Viburnum* (*Opulus*) *foliis lobatis, petiolatis glandulosis.* / V.^o *roseum*. Pract. Bot. de Lin. p.^r. Palau t.^o. 2.^o. pag. 829 / *Opulus* flore globoso. T. Inst. R. H. 607. Quer. Flora / ra Española t.^o. 6.^o. pag. 18. / *Sambucus aquatica polyanthos*. C. B. C. B. com. M. 874. / Este arbusto se cria en los montes de Leon y Asturias: / Quer. y se cultiva en Cordoba en Jardines y casas par- / ticulares, la llaman *Mundo* por la disposicion globo- / sa de sus flores, florece en los meses de Mz.^o. y Abril.

429. *Sambucus nigra*, L. *Sambucus* (*nigra*) *cymis quin- / que partitis, caule arboreo.* Pract. / Bot. de Lin. p.^r. Palau t.^o. 2.^o. p.^a. 835. / *Sambucus fructu in umbel- / la nigro.* T. I. R. H. 606. Flora / Espa- ñola tom. 6.^o. pag. 243 / *Sambucus*. C. B. com. Matth. / sup. Diosc. 873. Lag. in eodem 887. / vulgo: *Sauco*. / Se cultiva en Cordoba el Sa- / uco, hecho arbol mui frondoso, en / varias partes, como en el Hospi- / tal de esus, en la Alameda, y / algunas casas particu- lares, flore- / ce en Mayo, y Junio, / se hace uso de la / flor en la / farma- / cia.

430. *Tamarix Gallica*, L. *Tamarix Gallica* L. / Entrena.

431. *Corrigiola littoralis* L. *Corrigiola Littoralis* / 23. H. 20. C.

432. *Telephium oppositifolium*. L. Le he contado 5 estambres 3 pistilos / y aunque exactam.^o. no estan marcados / todos los caracteres en el caliz y venta- / ilas de la caxa. me parece es el / *telephium oppositifolium*. W. / Examina la Vmd. tal vez variaran / los estambres.

433. *Alsine mucronata*, L. Podra ser la *Alsine Mucronata* / vea Vmd la nota de W. despues / de la minuarta montana.

434. *Alsine mucronata*, L. La Plantita tiene cinco estambres / y 3 pistilos las anteras color de Lila / y algo mellizas: En caso de no ser / la *Alsine mucronata* es una espe / cie nueva de este Genero.

435. *Stellaria media*, Vill. *Alsine* (*Media*) *petalis bipartitis, foliis ova- / to-cordatis.* Pract. Bot. de Lin. p.^r. Pal. t.^o. 2.^o. 853. / *Alsine media*. T. I. R. H. 243. F. E. t.^o. 2.^o. 257. / *Alsine*. Lag. 432. C. B. com. Mat. in D. 782. / vulgo *Pamplina*. / Esta planta es harto comun en Cordoba en / las huertas, Jardines, y todos los sitios humedos / de la ciudad: es annua y florece en Marzo y A.^o.

436. *Parnassia palustris*, L. *Parnasia palustris* / Boissier [véase: *Oxalis* nov. sp.].

437. *Armeria elongata*, Hoffm. Statice Armeria.
438. *Armeria elongata*, Hoffm. Statice armeria v. / alliacea.
439. *Armeria elongata*, Hoffm. Statice armeria.
440. *Statice Limonium*, L. Statice limonium / armeria.
441. *Statice echioides*, L. 24.L. / Statice echioides.
442. *Armeria caespitosa*, Bss. Statice iuniperifolia W. / coespitosa. Caban.
443. *Statice dichotoma*, Cav. 36 Statice dechotoma / Cabanilles H. / Velezia rigida.
444. *Statice ferulacea*, L. Staticeae Ferulacea / Cabrera.
445. *Statice ferulacea*, L. Statice ferulacea.
446. *Statice sinuata*, L. *Statice* (sinuata) caule herbaceo, / foliis radicalibus alternatim pinna- / to-sinuatis, caulinis ternis trique- / tris subulatis decurrentibus. Pract. / Bot. de Lin. p. Palau tº. 2º. p. 876. / *Limonium peregrinum*, fo- / liis Asplenii. T. Inst. R.H. 342. / Flora Española tom. 5º. pag. 353. / Se halla esta planta en Ali- / cante, Reino de Valencia cerca de / Malaga, de Cadiz y otras partes de / Andalucía. Quer. / Coji este esqueleto del Jardín / Botánico de Sevilla. año de 1793.
447. *Linum catharticum*, L. *Linum catharticum*.
448. *Linum angustifolium*, B.R. *Linum angustifolium*.
449. *Linum usitatissimum*, L. *Linum* / usitatissimum / se cria silvestre / en las costas del / oceano.
450. *Linum tenuifolium*, L. *Linum tenuifolium*.
451. *Linum tenuifolium*, L. *Linum tenuifolium* / W.
452. *Linum tenuifolium*, L. *Linum tenuifolium* / v.
453. *Linum Narbonense*, L. ?Lino azul / de francia.
454. *Linum flavum*, L. Lino de flor / amarilla-rosa.
455. *Linum flavum*, L. *Linum flavum*?
456. *Linum strictum*, L. *Linum strictum*.
457. *Linum strictum*, L. *Linum strictum* (Cavanº).
458. *Linum suffruticosum*, L. *Linum suffruticosum*.
459. *Linum suffruticosum*, L. *Linum* / suffruticosum / W.
460. *Linum suffruticosum*, L. *Linum suffruticosum*? / 36/H.
461. *Linum africanum*, L. *Linum africanum*.
462. *Linum*, sp. Pentandria / Pentaginia / Samolus? / *Linum* / 34 / L.

463. *Crassula*, sp. *Crasula*. 18 C. / y *Sedum* (tachado y *Sedum*).

464. *Sedum rubens*, L. *Crassula rubens* / W.

Clasis / VI / Hexandria / Ordo / Monogy / nia . .

465. *Narcissus poëticus*, L. *Narsisus Poeticus*. / Arroyo de las piedras / florece por 8b^{re}.

466. *Narcissus Pseudo-Narcissus*, L. *Narcisus pseudo Narcisus* / W / Dehesa del Oro -12 Abril.

467. *Narcissus Pseudo-Narcissus*, L. *Narcissus bicolor* L / Entrena.

468. *Narcissus Tazetta*, L. *Narcissus* (*Tacetta*) *spatha multiflora*, nectario campa- / nulato plicato truncato triplo petalis brevior, foliis / planis. *Pract. bot. de Lin. p^o. Palau t^o. 3^o. pag. 43.* / *Narcissus palidus*, círculo luteo. *T. Inst. R. Herb.* / 354. *Quer. Flora Española t^o. 5^o. pag. 477.* / *Narcissus* I. C. Bauth. *comment. Mat. sup. Diosc. 858.* / Esta especie se cria con abundancia en sitios humedos de / los campos de Cordoba, como en la Albayda, en el Cerro / de las hermitas y otras partes. florece en En^o y Feb^o.

469. *Narcissus Bulbocodium*, L. *Hexandria. Monogynia.* / G. / *Narcisus* : / De Narcisso, cierto Mancebo mui pagado de su belleza / el qual segun fingen los Poetas se transformo en esta / Planta. / (*Bulbocodium*) *spata uniflora*, / nectario turbinato, petalis majore, geni- / talibus declinatis. *P. B. de L. p^o. P. t^o. 3^o. 44.* / *Narcissus montanus, juncifolius, caly-* / *ce flavo. T. I. R. H. 356. F. E. t^o. 5^o. 478.* / *Narcissus, Pseudonarcissus juncifolius*, / tube non fimbriata, flore flavescente. / *Swert. florileg. fl. 21.* / Este Narciso se cria se cria en las / Provincias de España : en Andalucía en- / tre Sevilla y Lisboa. / Trage este esqueleto de Sevilla el / Año de 1793 donde me lo dio D^{na}. Anas- / tasio Guzman, entonces agregado á a- / quel Jardin Botanico. &tc.

470. *Narcissus Jonquilla*, L. *Narcissus* (*Jonquilla*) *spatha multi* / *flora*, nectario campanulato brevi, fo- / liis subulatis. *P. Bot. de L. Pal. t^o. 3^o. 45.* / *Narcissus juncifolius, oblongo* / *calyce, luteus, major T. Inst. Rei.* / *H. 355. Flora Española t^o. 5^o. pag. 477.* / Esta se halla en las campiñas / de Cordoba en sitios humedos, y don- / de la he visto con mas abundancia / es en la Ysla que formo mas

arriba / de Lopegarcia el Rio quando dexo a- / quel molino en
seco. Se cultiva tam- / bien en la Ciudad p^r. su vista y olor agra- /
ciable : florece en Enero y Febrero.

471. *Narcissus*, sp. Narciso / hermoso / con lacinias / en la
campanilla / 6 estambres / iguales.

472. *Pancratium maritimum*, L. *Pancratium* (Maritimum)
spata multi- / flora, petalis planis, foliis lingulatis. / Lin. Spec.
Plant. p^r. pⁿ. t^o. 3^o. pag. 47. / *Narcissus maritimus*. T. J. R. H. / 377.
Flora Española tomo 5^o. pag. 478. / *Narcissus Pancratium maritimum*,
/ flore albo. Swert. florileg. lib. 1^o. fol. 27. / vulgo : Narcisos. / Esta
Planta que havita en las cos- / tas maritimas del Oceano de Anda-
/ lucia, se cultiva en Cordoba en Jar- / dines, y Casas particulares.
La dan va / rios nombres, pero áquel es el mas fre- / quente. Flo-
rece por Julio y Agosto.

473. *Oporanthus luteus*, Herb. ? Amarillys Belladona.

474. *Allium Moly*, L. *Allium Mollis*. L. S. P. 432. / Clase sexta
orden Monoginia. / *Allium angustifolium*, / *umbelatum*, *album*.
T. Y. R. H. 385.

Clasis / VIII / Octendria, / Ordo / Monogy- / nia

475. *Allium Chamaemoly*, L. *Allium* / Vzgr. 10 Julio. (Otra
etiqueta dice) : Class 6^a Hexandria Ordo / Monoginia / *Allium*
Chamaemolis / Linn. Tom. 3^o. Lag^a 86 / Ajo pequeño Moli.

476. *Allium subvillosum*, Salzm. *Allium clusianum* / W.

477. *Tulipa silvestris*, L. *Tulipa* (*Sylvestris*) flore subnutan-
te, fo- / liis lanceolatis P. B. de L. p^r. Pⁿ. t^o. 3^o. 101. / *Tulipa minor*,
lutea. T. Inst. Rei / Herv. 376. Flora Española t^o. 6^o. 432. / Esta es-
pecie de *Tulipa* se cria en / varias Provincias de España : en Anda-
/ lucia cerca de Carmona &tc. Quer. / Su raiz es perenne, bulbosa ;
y flo- / rece en los meses de Primavera. / Trage á Cordoba, en el
año de / 1793 cebollas de ella, y este esqueleto, / del Jardin Bota-
nico de Sevilla.

478. *Tulipa silvestris*, L. *Tulipa silvestris* ?

479. *Tulipa Gesneriana*, L. *Tulipa* (*Gesneriana*) flore erecto,
foliis ovato-lan- / ceolatis. Pract. Bot. de Lin. p^r. Palau t^o. 3^o. pag^a.
101 / *Tulipa praecox*, *lutea*. T. Inst. R. H. 373. Q^r. t^o. 6^o. 432. / *Nar-*
cissus. V. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 859. / *Tulipa major*. Dod. pempt.

/ Esta planta se cultiva en Cordoba en varios Jardines / y casas particulares, yo la he cultivado tambien algu- / nos años. Fue traída á España, de Capadocia año de / 1559. segun Gesnero, á cuya memoria se consagra.

480. *Ornithogalum Pyrenaicum*, L. *Ornithogalum Pirenaicum* L. /

481. *Ornithogalum umbellatum*, L. *Ornithogalum umbellatum* / W. / en la torrecita del Carrizal / 28 de Marzo.

482. *Scilla italica*, L. *Scilla italica* / W.

483. *Scilla Peruviana*, L. *Scilla Peruviana* / Entrena.

484. *Anthericum ramosum*, L. *Anthericum ramosum*.

485. *Convallaria majalis*, L. *Convallaria Mayalis*.

486. *Convallaria Polygonatum*, L. *Convallaria Polygonatum* / Fuente del Texo.

487. *Endymion nutans*, Dun. *Hyacinthus* (Nonscriptus) *corollis campanulatis sex- / partitis apice revolutis*. P. Bot. de L. p. 158. / *Hyacinthus oblongo flore, coeruleus, major*. T. / Inst. R. H. 344. Quer Flora Española t.º 5.º. 237. / *Hyacinthus non spicatus*. Dod. pempt. 216 / Se cria en varias partes de España: vease á Quer / la cultivo en Cordoba, traxe sus bulbos del Jardín / Botánico de Sevilla, en 1793. f.º en Abril.

488. *Uropetalum serotinum*, Ker *Hyacinthus* (*Serotinus*) *petalis exte riobus sub- / distinctis, interioribus coadunatis*. Præd. Bot. de / Lin. por Palau t.º 3.º. pag. 159. / *Hyacinthus obsoleto flore*. T. Inst. R. H. 345. / Quer Flora Española. t.º 5.º. pag. 238. / Esta especie se cria en Cordoba en Peña-taxa- / da y otros sitios de la Sierra: florece en Abril.

489. *Uropetalum serotinum*, Ker. *Hyacinthus Serotinus* / Lachenalia. (Otra etiqueta dice): *Hyacinthus Serotinus* / Cab. / Batan de Siles.

490. *Hyacinthus orientalis*, L. *Hyacinthus* (*Orientalis*) *corollis infundibuliformis se- / mixfidis basi ventricosis*. P. Bot. de Lin. p.º Pal. t.º 3.º. 160. / *Hyacinthus Orientalis major et minor*. Dedon. / pempt. 216. / *Hyacinthus Orientalis alter*. C. B. com. Mat. 744. / Esta planta se cria ó mas La llaman Ja/cintos, su raiz es p.º, florece en Mz.º. sus corolas son azules.

491. *Hyacinthus orientalis*. L. *Hyacinthus* (*Orien-*

talís).V^s. / Estas variedades del Jacinto Oriental se cul- / tiva nen Cordoba en el Jardin del Obispo y / otros de cu- / riosos :de la variedad blanca tra- / xe una cebolla de Jardin Botánico de Sevilla / año de 1793. florece en Marzo y Abril.

492. *Muscari comosum*, Mill? *Hyacinthus Cymosus*.

493. *Muscari racemosum*, DC. *Hyacinthus (Racemosus) co-* / *rolliis ovatis, summis ses-* / *silibus (rectius sterilibus) foliis laxis.* Pract.Bot:de / Lin.p^r.Palau t^o.3^o.pag.164. / *Muscari arvense, Jun-* / *cifolium, coeruleum, mi-* / *nus.* T.Inst.R.H.348. Flora Española t^o. 5^o.pag.457. / He visto esta especie en la cerca de Peñataja- / da camino de Linares, y en algunos sitios de la Ala- / meda, y otros sitios cerca de Cordoba. florece en Abril.

494. *Muscari racemosum*, DC. *Hyacinthus Race / mosus*.

495. *Juncus*, sp. *Juncus*.

496. *Juncus filiformis*, L. *Juncus filiformis*.L.

497. *Juncus supinus*, Moench. *Juncus Bulbosus*.

498. *Juncus bufonius*, L. *Juncus buffonius / H.9*.

499. *Juncus Jacquini*, L. *Juncus Jacquini*. L.

500. *Carex muricata*, L. *Juncus Muricatus / Cabrera*.

501. *Frankenia pulverulenta*, L. *Franquenian / Pulverulenta*.

502. *Rumex verticillatus*, L. *Rumex / verticillatus / Ca-* / *brera*.

503. *Rumex Patientia*, L. *Rumex Patientia*.

504. *Rumex crispus*, L. *Rumex crispus / Lin*.

505. *Rumex pulcher*, L. *Rumex Pulcher*.

506. *Rumex bucephalophorus*, L. *Rumex bucephalof-* / *orus / W*.

507. *Rumex vesicarius*, L. *Rumex Vesicarius* Lin.

508. *Rumex Tingitanus*, L. *Rumex Tingitanus / Cabrera*.

509. *Rumex Acetosa*, L. *Rumex Acetosa / Azedera*.

510. *Rumex Acetosella*, L. *Rumex / acetosella / W*.

511. *Rumex Acetosella*, L. *Rumex acetosella*.L. / *Venta del* / *espirt^o. St^o*.

512. *Rumex*, sp. *Rumex*

513. *Colchicum autumnale*, L. *Colehicum (Autumnale) foliis* / *pla-* / *nis lanceolatis erectis.* Pract.Botan. / de Lin.p^r.Palau t^o.3^o. p^a.265. / *Colchicum commune.* C.B.67. / T.348.F.E.t^o.4^o.p^a.386. / *Colchicum.* Lag.430. Dodon / pempt.460. C.B.com. Matt. sup. / Diosc.777. / *Colchicum vernum flore pur-* / *pureo.* Swert. florileg.

lb°. 1°. fol. 56. / Se cria esta planta cerca de / Cordoba, en las to-
rronteras del A- / rroyo de las peñas detras de la Hu- / erta del
Naranjo, en la Albayda, / y en la Campiña tambien. florece / en
el Otoño, y arroja las ojas en el invierno.

514. *Alisma Plantago*, L. *Alisma plantago*.

515. *Alisma Plantago*, L. *Alisma* (Plantago) foliis ovatis /
acutis, fructibus obtuse-trigo-nis. / Pract. Bot. de Lin. p^r. Palau t°. /
3°. 273. / *Ranunculus palustris*, Planta- / ginis folio, ampliore. T.
Inst. R. / H. 292. Flora Española t°. 6°. 168. / *Plantago aquatica*. La-
guna en / Diosc. pag. 371 / Coji este esqueleto en el jardin / Bota-
nico de Sevilla en 1793. haunq°. / todabia no lo he visto tengo
notic / ia cierta de que se cria en Cordo- / ba en quemadillas. /
Crece de dos á tres pies de alto. Reverso : Esta especie la cogi en
1796 en el / canal de Manzanares, de donde p^r. / comision del
p^r. Catedratico del Rl. / Jardin Botanico D. Casimiro Orte- / ga
lleve un zesped á dicho Jardin.

516. *Aesculus Hippocastanum*, L. Heptandria, Monoginia.
Folium communis / magnitudinis, AEs- / culi Hippocastani, /
petiolo dissecto. = / in 1794.

Clase VIII

Clasis / VIII / Octandria, / Ordo / Monogy- / nia

517. *Tropaeolum peregrinum*, L. Octandria Monogynia /
Tropeolum Peregrinum / vulgo - Canarios.

518. *Oenothera mollissima*, L. *Oenothera* (mollissima) foliis
lanceolata- / tis undulatis. Lin. Spec. Plant. p^r. p^a. / t°. 3°. p^a. 308. /
Habita en el Campo de Buenos-ayres L. / Se cultiba en Cordoba
esta exo- / tica planta en la Alameda de el Obis- / po, y en mi
Hortulo Botanico. tengo / noticia de que su semilla vino á Cor- /
doba de Sevilla. Es suavissima al tacto. / Es annua, ó dura dos
Años, y / florece por Junio y Julio. / Crece de la altura de un
pies á dos.

519. *Oenothera*, sp. *Oenothera*.

520. *Epilobium hirsutum*, L. *Epilobium* (hirsutum) foliis
oppositis lance- / latis serratis decurrenti-amplexicaulibus. / Lin.
Spec. Plant. p^r. p^a. t°. 3°. p^a. 313. / *Chamaenerion villosum*, magno flo-

re, / purpureo. T. Inst. R. H. 303. F. E. tº. 4º. 187. / *Lysimachia siliquosa*, hirsuta, magno flo- / re purpureo. C. B. pin. 245. / *Lysimachia purpurea* Fuchs. 491. / *Pseudolysimachium purpureum* I. Dod. / Pempt. 85. / Este arbusto crece a la altura de un hombre, en las inmediaciones de Córdoba, como es / en el Arro Pedroches, y en la Palomera, donde lo / he cojido, y en otros Arroyos y sitios de agua qº. / es donde abita. Florece por Mayo y Junio.

521. *Epilobium tetragonum*, L. *Epilobium tetragonum* / L. / Entrena. (Otra etiqueta dice): *Epilobium* / Vzgr. 20 Julio.

522. *Epilobium tetragonum*, L. *Epilobium tetragonum* L.

523. *Calluna vulgaris*, Salisb. *Erica vulgaris* / vulgo-Brezo.

524. *Calluna vulgaris*, Salisb. *Erica foliis quaternis corollis ovatis* / *coeruleis antheris muticis inclusis* / *stilo exserto floribus spicatis* / no me atrevo á determinarla *Vulgaris* / Se cogio en Fuencaliente. / *Erica vulgaris* varietas δ W.

525. *Calluna vulgaris*, Salisb. *Erica Vulgaris* / varietas / W Cabrera.

526. *Erica scoparia*, L. *Erica scoparia*. W.

527. *Erica vagans*, L. *Erica purpurascens* / umbria / W. / de Morote.

528. *Daphne Mezereum*, L. Dehesa de los Endrinales Sierra de / Alcaraz dia 16 de Marzo de 1812. / Planta de 8 estambres mas largos / corola monopetala / 4 drifida / de un pistilo ovario de figura de huebo / tubo cortisimo stigma en cabezuela. / Caliz comun de unas 6 ojuelas / llamanla Martin Polo / Es purgante mordaz / *Daphne* / *mezereon*.

529. *Daphne Mezereum*, L. *Daphne mezereum* / W. / Royo frio y Sierra del agua.

530. *Thymelaea dioica*, All. *Dapne Dioica*.

531. *Daphne Gnidium*, L. *Daphne Gnidium* (Lin).

532. *Thymelaea Passerina*, Lbe. *Stellera passerina* / W. / en Sbº. en la Palomera.

533. *Thymelaea nitida*, Endl. 18. H. / 2 / *Paserina nitida* / Pereon.

534. *Thymelaea orientalis*, Meiss. *Passerina* / *orientalis* / W.

535. *Acer platanoides*, L. *Acer* / *platanoides*. / W.

536. *Acer campestre*, L. *Acer campestre*. L. / C in R H M.

537. *Polygonum Bistorta*, L. *Polygonum* / *Bistorta* / Cabrera.

538. *Polygonum Persicaria*, L. *Polygonum* (*Persicaria*) *flori-*

bus hexandris / digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceo- / latis stipulis ciliatis. L. Sp. P. p. t. 3. p. 428. / *Persicaria* mitis, maculosa, et non ma- / culosa. Tourn. I. R. H. 509. Fl. Esp. t. 6. 79. / *Persicaria*. Dodon. pempt. 597. / Esta Planta se cria con mucha abundan- / cia en Cordoba en las margenes del Guadal- / quivir, y en qualquiera parte de la Ciudad, en / sitios pantanosos. Crece á la altura de dos ó tres / pies, es annua y florece en Julio y Agosto.

539. *Polygonum orientale*, L. *Polygonum* (Orientale) floribus heptan- / dris digynis, foliis ovatis, caule erecto, / stipulis hirtis, hypocateriformibus. / Lin. Spec. Plant. p. t. 3. p. 430. / *Persicaria* Orientalis, Nicotianae fo- / lio, calice florum purpureo. Tourn. C. 38. / Flora Española tomo 6. p. 81. / Habita en Oriente y en la India. Lin. / Esta planta exotica, se cultiva en Es- / paña en los jardines de muchos curiosos, co- / mo lo dice Quer en su Flora Española ; la / vi la primera vez en Cordoba en el Jar- / din del Obispo á donde parece vino lá semi- / lla de Madrid ; la he cultivado ; crece á la / altura de quatro pies, florece en Julio y Agosto.

540. *Polygonum aviculare*, L. *Polygonum* Aviculare Lin.

541. *Cardiospermum Halicacabum*, L. *Cardiospermum* (Halicacabum) foliis / laevibus. L. Sp. P. p. t. 3. p. 448. / *Corindum* folio ampliore, fructu / majore. T. I. R. H. 431. F. Esp. t. 4. 433. / *Halicacabus* peregrinus. Dodon. / pempt. 452. / *Vesicaria* Repens. C. B. comm. / Matth. super. Diosc. 755, / Habita en las Indias. Lin. / Esta Planta es exotica y se cultiva / en España : en Cordoba en muchas casas / particulares ; unos la llaman *Bombitas*, / y otros *Farolillos*. El año de 1793 invie / semilla de ella al Jardin Botánico de / Sevilla. Crece agarrandose con sus cirros á / los cuerpos vecinos, de 5 pies de alto, florece en Julio. ☉

Clasis. / IX, / *Enneandria* / Ordo / *Monogy-* / *nia*

542. *Laurus nobilis*, L. *Laurus* (nobilis) foliis lanceolatis / venosis perennantibus, floribus / quadrifidis dioicis. Pract. Bot. de / Lin. p. Palau t. 3. pag. 462. / *Laurus vulgaris*. T. Inst. R. / Herv. 59. Flora Esp. t. 5. pag. 319. / *Laurus*. Lag. in Diosc. 64. C. B. / com. Mat. 125. Dod. pempt. 849. / Se haya el Laurel en Cordo- / ba en muchisimas partes, y en ca- / si todas las Huertas de la sierra / y en muchos arroyos de ella. Es Ar- / bol de 15. p. de alto, fl. en Mz. y Abl.

Clase X

543. *Anagyris foetida*, L. *Anagyris foetida*.

544. *Cercis Siliquastrum*, L. *Cercis* (*Siliquastrum*) *foliis corcato-or- / bicularis glabris*. P.B.de L.p^r.P.t^o.3^o.499. / *Siliquastrum*.T.Inst.R.H.647. / *Flora Española* tom.6^o.pag.296. / *Arbor Judae*.Dod.pempt.786. / *Casp.Bauhin.com.Matt.sup.Diosc*.171. / *vulgo*:Arbol del Amor. / Este Arbol se cultiva en Cordoba / en la Alameda, de donde se han sacado / varias plantas que se hallan en otros / Jardines. Es mui corpulento y robusto, / y en el mes de Abril,quando se halla / despojado de oja, se cubre todo el de flo^o. / encarnadas q^o. ofrecen un aspecto agradable. (Otra etiqueta dice):*Cercis Siliquatrum flos. / Cercis Siliquastrum / fructus*.

545. *Cassia occidentalis*, L. *Cassia* (*Occidentalis*) *foliis quin- / quejugis ovato-lanceolatis mar- / gine scabris,exterioribus majo- / ribus,glandula baseos petiolorum*. / *Pract.Bot.de Lin. p^r.Pal. t^o.3^o.511.* / Habita en la Jamaica.Lin. / Coji esta planta en el Jar- / din Botanico de Sevilla año de / 1793, donde me dixeron ser la / especie dicha.

546. *Asplenium Ruta-muraria*, L. A. *Ruta muraria* / con las cajas Maduras.

547. *Cassia marylandica*, L. *Cassia Acuminata?* W / Entrena. (Otra etiqueta dice): *Cassiae quaedam species.* / coxi esta especi de Casia en la Huer- / ta de los Padres Agustinos de Sevilla.

548. *Cassia laevigata*, Willd. No es la Robinia pseudo / Acaria. / La creo *Cassia floribunda* / Cav^s. / Entrena.

549. *Ruta graveolens*, L. *Ruta* (*Graveolens*) *foliis decompositis,floribus laterali- / bus quadrifidis*.*Pract.Bot.de Lin. p^r.Pal. t^o.3^o. pag.538.* / *Ruta sylvestris*, major.Tourn.Inst. R.H. 257. / *Quer Flora Española t^o.6^o.pag.228.* / *Ruta*.I.ag.in Diosc.298.*Casp. Bauhin.* / comment.Matth.540. = *vulgo*:*Ruda.* / Esta planta se cria en la Sierra de Cordo- / ba,y donde la he visto con mayor abundancia es / en los contornos del castillo de la Albayda. / es perenne y florece en Abril y Mayo.

550. *Haplophyllum Hispanicum*, Spach. *Ruta Linifolia* / Palau t^o.3.p.540. / (Otra etiqueta dice): *Ruta linifolia* W. tomo

2. pag.544 / Unica mata que he visto,cogida / el 2 de Julio entre la Puerta y / Veas en el Valle de Guadalimar / año de 1829.

551. *Melia Azedarach*, L. *Melia* (*Azedarach*) foliis bipinnatis. Pract. B. de L. p. P. t. 3.º. 552. / *Azodorach*. Dod. pempt. 848. / T. Inst. R. H. 616. Flora Española tom. 3.º. pag. 193. / *Pseudosycamoros*. C. B. com. / Matthiol. super Diosc. 232. / vulgo: *Arbol del Paraiso*. / Este arbol se cria en Cordoba / muy corpulento y frondoso, en la / cerca de la Huerta Morales en / frente de San Cayetano, y dentro de la Ciudad en la casa frente / al colegio de la asumpcion, en / el Convento de Religiosas Agustinas de St.ª Maria de las Nieves, y otros sitios y casas particulares. Florece en Mayo y / Junio.

552. *Tribulus terrestris*, L. *Tribulus* (*terrestris*) foliolis sexjugatis subaequalibus, seminibus quadricornibus, Lin. / Sp. Plant. p. p. t. 3.º. p. 567. / *Tribulus terrestris*, Ciceris folio, seminum integumento aculeato. T. Inst. R. H. / 266. Flora Española t. 6.º. p. 412. / *Tribulus terrestris*. Dodon. pempt. / 557. Lagun. in Diosc. 385. / vulgo Abrojos. / Sus tallos crecen del largo de un pie en / contorno de la raiz echados sobre tierra: es / annual y florece por Julio. / Se cria en abundancia en todos los alrededores de esta Ciudad, y dentro de ella / como en el campo de la Merced, Marrubial, / y en patios de casas grandes y calles poco pisadas.

553. *Saxifraga punctata*, L. *Saxifraga punctata* / W.

554. *Saxifraga Geum*, L. *Saxifraga* (*Geum*) foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. / Pract. Bot. de Lin. p. Palau t. 3.º. 640. / *Geum rotundifolium*, minus. T. / Inst. R. H. 251. F. E. t. 5.º. p. 164. / *Saxifraga* iv. Casp. Bauhin. / comment. Matth. sup. Diosc. 694. / Esta planta se cria en Cordoba, en la cuesta de trasierra suviendo, / pasado el sitio que llaman el rebenton; / en todo el cerro de la izquierda, donde / la he cogido, y visto repetidas veces. / Su raiz es perenne, brota en el / Otoño, y florece en Abril y Mayo.

555. *Saxifraga Geum*, L. *Saxifraga Geum*.

556. *Saxifraga rotundifolia*, L. Caliz adherente / Decandria. Diginia / Jenave Abril 812. / *Saxifraga rotundifolia*. (Otra etiqueta dice): ¿*Saxifraga Granulata*? / Entrena.

557. *Saxifraga tridactylites*, L. *Saxifraga* (*tridactylites*) foliis / caulinis cuneiformibus trifidis / alternis, caule erecto ramoso.

Pract. / Bot.de Lin. p^r.Palau t^o.3^o.p^a.648. / Saxifraga verna, annua, hu- / miliar. T.I.R.H. 252.F.E.t^o 6^o. 256. / Paronychia altera. Dod.pem. 113 / Esta plantica se cria en Cordo- / ba en las paredes viejas,y en al- / gunos patios enladrillados,como / en el del Argibe de Capuchinos,y / en el del ángulo grande de S^a. Ag.^a / es annua y florece en Abl. y M^o.

558. *Saxifraga tridactylites*, L. Saxifraga tridactylites / W.

559. *Saxifraga exarata*, Vill. Saxifragia de Cesped.

560. *Saxifraga muscoides*, All. Saxifraga muscoides. W / Solo esé exemplar separado es / por donde he podido determi- / nar la especie, apésar de no / estar mui seguro por el color / q^e es blanco en la mia / S.Coespitosa.W.

561. *Gypsophila Struthium*, L. *Gypsophila* (Struthium) fo- / liis line- / aribus carnosis,axillaribus confer- / ris teretibus.P.B. de L.p^r.P.t^o.3^o.660. / *Lychnis* Hispanica,Kali fo- / lio,multiflora. T.Inst.R.H.338. / Flora Española t^o.5^o pag.382. / Se da en los cerros de las Sa- / linas del Real Sitio de Aranju- / ez en terre- / nos incultos,secos,a / ridos y arenosos.La raiz es pe- / renne,y florece por Agosto. Q^r. / Vi esta planta cultivada en / el Jardin Botanico de Sevilla / donde coxi este esqueleto.1793.

562. *Saponaria officinalis*, L. Saponaria officinalis Cav / Entrena (Otra etiqueta dice): Saponaria officinalis Lin.

563. *Saponaria officinalis*, L. Saponaria officinalis, L. / Cabrera.

564. *Gypsophila porrigens*, Boiss. Xabonera / que se estien- / da. / porrigens W. / Dehesa del Oro.

565. *Saponaria ocymoides*, L. Saponaria ocymoides. [Sin etiqueta ni planta].

566. *Dianthus barbatus*, L. *Dianthus* (Barbatus) floribus ag- / gregatis fasciculatis, / squamis calycinis evaño-subulatis tubum aequantibus,fo- / liis lanceolatis.Pract.Bot.de Lin.p^r.Palau t^o.3^o. pag 670. / *Caryophyllus hortensis*,barbatus,angustifolius,(vel la- / ti- / folius.) T.Inst.R.H.332.Flora Esp^a.t^o.4^o.pag.74. / *Armerius* flos alter.Dod.pempt.176 / Esta planta se cultiva en los Jardines y casas particu- / lares de Cordoba,y la dan la denominación de *Ramilletes*. / p^r. la disposición de sus flores. es p^o. florece en Mayo &tc.

567. *Dianthus Seguierii*,Chaix. *Dianthus* / carthusianorum / Lin. Lag. / varietas.

568. *Dianthus Seguierii*, Chaix. *Dianthus Carthusianorum* / Entrena. (Otra etiqueta dice) : *Dianthi Species*.

569. *Dianthus prolifer*, L. *Dianthus Proliferus*.L. / (Otra etiqueta dice) : Cianela blanca. (Y otra etiqueta) : Dudo sea Cyanela porque / le falta el caracter de tener / un estambre doble largo que / los otros !La planta está sin / fruto ni ojas por lo cual se / ra aventurado cuanto se diga.

570. *Dianthus prolifer*, L. *Dianthus* / prolifer.Lin / Lag.

571. *Dianthus Caryophyllus*, L. *Diantho clavellina* / *Caryophyllus* / W.

572. *Dianthus Caryophyllus*, L. Class. X Decandria Ord Diginia / *Dianthi Cariophili* / varietas? / Linn.tom.3°.pag°.674 Clavellinas.

573. *Dianthus deltoides*, L. *Dianthus Deltoides* L. / C.° in H R M.

574. *Dianthus chinensis*, L. *Dianthus Chinensis*. / Entrena. (Otra etiqueta dice) : Esta esp. es. / *Dianthus Chinensis* L. / Entrena.

575. *Dianthus plumarius*, L. *Dianthus Plumarius* L. / C in R H M.

576. *Dianthus virgineus*, G. G. *Dianthus* / *virgineus* / W / an *pungens*?

577. *Dianthus Hispanicus*, Ass. *Dianthus hispanicus* / Asso. Lag.

578. *Dianthus*, sp. *Dianthus carregianosum*.

579. *Silene inflata*, Sm. *Cucubalus* / Behen / Cabrera.

580. *Silene littorea*, Bröt. *Silene Lusitanica*? = / *S.Sericea* W.? / Entrena.

581. *Silene Gallica*, L. *Silene Gallica* L / La otra sera / especie nueva. / Entrena.

582. *Silene Gallica*, L. *Silene Gallica*.L.

583. *Silene cerastioides*, L. *Silene cerastioides* L.? / *S. Gallica* L? / Entrena.

584. *Silene cerastioides*, L. *Silene cerastioides*.

585. *Silene cerastioides*, L. *Silene cerastioides* W.

586. *Silene paradoxa*, L. *Silenes*? / 10 C. / Cambron. / 9 Julio. (Otra etiqueta dice) : *Silene* / *paradoxa* preciosa / hacia las juntas / de Guadalimar / y Guadalmena.

587. *Silena paradoxa*, L. *Silene paradoxa*?

588. *Silene portensis*, Hffg. *Silene Portensis* L. / Entrena.
(Otra etiqueta dice) : *Silene* / 11 G. / V. 5 Julio.
589. *Silene viscosa*, Pers. 73 Lag. / *Silene Viscosa* Cabrera /
Sp. nova. [Otra etiqueta dice] : *Cabrera* / S. *Portensis*.
590. *Silene Armeria*, L. *Silene armeria* / W / *Saponaria* /
ocymoides.
591. *Silene Saxifraga*, L. *Silene saxifraga*.
592. *Silene*, sp. *Silene*.
593. *Silene*, sp. 34. *Silene* H.
594. *Silene*, sp. *Silene*.
595. *Silene*, sp. 33 *Silene* H.
596. *Silene ciliata*, Pourr. *Silene ciliata* / W.
597. *Stellaria Holostea*, L. *Stellaria holostea* W / in rupibus
- mense Junio - 29 - / en las rîscas del Cerro del rayo / y del
arroyo blanquillo sobre / Navalasna.
598. *Arenaria tetraquetra*, L. *Arenaria* / 9.C. 13.M H. / V.
8 de Julio. [Otra etiqueta dice] : *Arenaria tetraquetra* / *rubra* /
var^a. W. / Entrena.
599. *Arenaria tetraquetra*, L. *Arenaria* / 12H. 8.C. / Cam-
bron / 9 de julio. [Otra etiqueta dice] : *Arenaria tetraquetra* / L /
striata [tachado *striata*] Entrena / *pungens* L.
600. *Arenaria serpyllifolia*, L. *Arenaria serpyllifolia* / W. /
S.S.
601. *Spergularia rubra*, Pers. *Arenaria rubra* / W.
602. *Spergularia rubra*, Pers. *Arenaria rubra* / W.
603. *Spergularia media*, P. *Arenaria media*.
604. *Arenaria gypsophiloides*, L. *Arenaria* / *gypsophiloides*.
605. *Alsine setacea*, M. et K. H / *Arenaria* 19. / *saxatilis*.
606. *Alsine setacea*, M. et K. *Arenaria saxatilis* / W. / la-
ricifolia.
607. *Arenaria grandiflora*, L. *Arenaria* / *iuniperina* / W.
608. *Arenaria balearica*, L. *Arenaria* / *coespitosa* / W. / Rio
molinos / an idem cum sequenti?
609. *Arenaria polygonoides*, Wulf. *Arenaria polygonoides*
/ W.
610. *Alsine recurva*, Wahlenb *Arenaria* / *recurva* / W.
611. *Arenaria*, sp. *Arenaria*.
612. *Cotyledon Umbilicus*, L. *Cotyledon Umbilicus*.
613. *Pistorinia hispanica*, DC. *Cotyledon hispanica*.

614. *Pistorinia hispanica*, DC. Cotyledon hispanica / W.
615. *Umbilicus hispidus*, DC. Cotyledon viscosa / W.
616. *Sedum Telephium*, L. *Sedum* (*Telephium*) foliis planius- / culis serratis, chorymbo folioso, caule / erecto. Pract. Bot. de Lin. p^r. P. t^o. 3^o. 750. / *Anacampseros*, vulgo faba crasa. / T. I. R. H. 264. Flora Esp. t^o. 3^o. 17. / *Telephium alterum sive Crasula*. / Dondon. pempt. 130. / *Fabaria*. C. Bauhin. comm. / Matthioli. in Diosc. 472. / Dice Don Josef Quer que se / cria en algunas partes de Andalu- / cia ; pero no señala el Lugar. / Se cultiva en Cordoba en / muchas partes, y la llaman canji- / lona. La usan para los callos de los pi- / es, y Grietas de los pechos. Crece de / un pie, es perenne, florece en Julio. Reverso : Tengo observada esta especie en Cataluña, junto á Caella á la parte / de la montaña / en 1795.
617. *Sedum reflexum*, L. *Sedum reflexum* [tachado rupestre];
618. *Sedum sexangulare*, L. *Sedum* de 6 angulos.
619. *Sedum sexangulare*, L. *Sedum Sexangulare* L. / Entrena (Otra etiqueta dice) : 30 H. / en Jaen / *Sedum* / acre.
620. *Sedum atratum*, L. *Sedum atratum* / W.
621. *Oxalis Acetosella*, L. *Oxalis Acetosella* L. / Entrena.
622. *Oxalis corniculata*, L. *Oxalis* (*corniculata*) pedunculis umbelliferis, caule ra- / moso. diffuso. Pract. Bot. de Lin. p^r. Palau t^o. 3^o. pag. 771. / *Oxys lutea*. T. Inst. R. H. 88. Flora Española t^o. 6^o. 42. / *Trifolium acetosum luteum*. C. B. com. Mat. 608. / Esta planta es harto comun en los Jardines, y tierras / cultivadas de Cordoba : se esparce mucho sobre la tierra / á causa de producir sus tallos raices, á trechos ; por lo que / no es facil esterminarla. Esp^o. florecé en Abl. y Mayo.
623. *Oxalis monophylla*, L. En el año de 1812 coji esta planta en / el viznagar junto á la fuente que llama / ban del pino, é hize de ella la descripcion / siguiente. / Caliz libre de 5 lacinas profundamente / henchidas hasta su base. / Corola de 5 petalos. / Estambres 5 y otros 5 alternos de cada uno / de los quales sale un hacecito de filamentos / coronados por unos globulitos que no se si / seran antheras. / Germen aovado. 5 estigmas sentadas / una caja de 5 ventallas y 10 celdas / semillas menudisimas. / Reflexionando sobre el caracter de las / antheras asurcadas y persuadido á q^o. los / filamentos de los 5 estambres mas cortos / pueden ser las paredes ó ventallas de las / antheras ya abiertas : y tambien á q^o. / abriendose las ventallas de la caja en dos / por

el dorso pudo parecer caja de 10 cel- / das me inclino á creerla una espe- / (reverso) :cie nueva de *Oxalis* pues en este / caso solo varia del caracter generico / en tener los estigmas sentados sin / estilo vease Caban.nº.1111.. / Yo no la he visto fresca / Pero en vista de lo que / Vmd dice tal vez sera , la *Oxalis ros- trata* W. / ó la *O.Lepida* unicas / especies de ojas simples. / es lastima no tener mas / exemplares,pª examinar / la bien. Puede Vmd ver el Sonnini / *Parnasia palustris* / Boissier.

624. *Oxalis cernua*, Thbg. *Oxalis cernua*.

625. *Agrostemma Githago*, L. *Agrostemma* Gitago.

626. *Agrostemma Githago*, L. *Agrostema* Jitago.

627. *Lychnis coronaria*, Lam. *Agrostemma* Corona - / ria.

628. *Lychnis Chalcedonica*, L. *Lychnis* (*Chalcedonica*) *flori- bus* / *fasciculatis fastigiatis*. *Pract.Bot.* / de Lin.pª.Palau.tº.3º pag.779. / *Lychnis hirsuta*, flore incarnatº, major. T.I.R.H.334. / *Flora Española* tº.5.º pag.382. / *Flos Constantinopolitanus.* / *Dodon.pempt.*178. / Esta planta habita en Rusia / y se cultiva en los Jardines de Cor- / doba, su raiz es perenne, crece de / dos á tres pies, y florece por Ju- / nio y Julio. Le tengo obserbada / la capsula de una celdilla.

629. *Cerastium vulgatum*, L. *Cerastium vulgatum* / L.

630. *Cerastium viscosum*, L. *Cerastium viscosum* / W. / Rio molinos.

631. *Cerastium semidecandrum*, L. *Cerastium semidecan- drum*? W. / *Stamina* 8. *Stili* 5. *petalis bifi-* / *dis*, *calice brebioribus* in eo / obserbavi.

632. *Cerastium dichotomum*, L. *Cerastium* *Dichotomum* / 21.C.

633. *Cerastium glomeratum*, Thuill. *Cerastio* apretado / *Ce- rastio* apretado / en las rocas de Segura.

634. *Cerastium glomeratum*, Thuill. *Cerastio* / apretado.

635. *Spergula arvensis*, L. Planta curiosa que debe / bus- carse para determinarla. / No es necesario buscar otra pues aun- que / con bastante trabajo, remojando en agua / dos capullos qº. tenia pude contarle los / 7 estambres ó mas y los 5 pistilos. / *Spergula Arvensis*. W.

Clase XI

636. *Euphorbia serrata*, L. Euforbia / Serrata / Cabrera.
 637. *Euphorbia spathulata*, Lam. Euphorbia spatulata W. /
 Especie mui rara en esta / Wildenow la pone como exótica pero
 yo / estoí en q° es esta especie ú otra nueva / Siempre es planta
 curiosa.

Clasis / XII / Icosandria / Ordo / Monogy- / nia

638. *Philadelphus coronarius*, L. Class.12 Ycosandria Ord.
 Monog. / Philadelphus Coronarius / Linn.p.P.Tom.4.Pag.127 /
 Philadelpho de coronas (vulgo) ge- / ringuilla :en Cordoba lo lla
 man Celinda.

639. *Philadelphus coronarius*, L. G. Philadelphus / De Phy-
 ladelpho Rey de Egipto. / Philadelphus (Coronarius) foliis sub- /
 dentatis.P.B.de Lin.p° P.tom.4°.127. / Syringa alba, seu Philadel-
 phus / Athenaei.T.Inst.R.H.617.Florá / Española tom.6°.pag.345.
 / vulgo :Zelinda... / Este Arbusto dice Linneo se / cria en Ale-
 mania y Suiza.Se cultiba en Cordoba en muchisimas par- / tes,
 donde le dan aquel nombre.Sus / flores gozan un subidísimo y
 agrada- / ble aroma :crece á 7 p°.fl.° en Mayo.

640. *Amygdalus communis*, L. Amigdalus Communis / Al-
 mendro.

641. *Amelanchier vulgaris*, Mnch. Mespilus. [Otra etiqueta
 de otro ejemplar dice] :Mespilus / pseudo-cidonia [tachado] /
 (=Pirus Amelan / chier).

642. *Sorbus Chamaespilus*, Crtz. 20 de Abril / Mespilus
 chamaemes- / pilus W. / me parece especie nu / eva foliis serratis
 acute / como el Chamaespilus / y subtus tomentosus como /
 el Cotoneaster Riomolinos. [Falta el ejemplar].

Clase XIII

643. *Chelidonium majus*, L. Chelidonium / maius.
 644. *Chelidonium majus*, L. Chelidonium maius W. / Siles.
 28 de Marzo.

645. *Glaucium luteum*, Scop. Chelidonium (*Glaucium*) pedunculis / unifloris, foliis amplexicaulibus / sinuatis, caule glabro. Pract. Bot. / de Lin. p^r. Palau T^o. 4^o. p^a. 301. / *Glaucium* flore luteo. T. Inst. / R. H. 254. Flora Esp. t^o. 5^o. p^a. 165. / *Papaver corniculatum*. Lag. in / Diosc. 415. majus. Dodon. pem 448. / *Papaver* flore luteo corniculatm. / Swert. florileg. lib. 2^o. fol. 22. / Habita en los suelos mariti- / mos de España, y se cultiva en Cor- / doba, en el Jardín de la Alameda, / y p^r. mi : es perenne fl^o. Abl. y M^o. (Reverso) : Observé esta especie en la playa / del Mediterráneo, en Cataluña / junto á Malgrat, en Sbre de 1795 / y de ayi trage semilla á Córdoba.

646. *Papaver hybridum*, L. *Papaver* (*Hybridum*) capsulis subglobois torosis hispi- / dis, caule folioso multifloro. P. B. de L. p^o. Palau t^o. 4^o. 304. / *Papaver erraticum*, capite oblongo, hispido. Tourn. / Inst. R. H. 238. no lo trae Quer F. E. / Esta especie se cria en los campos de labor de los / alrededores de Córdoba en los mismos sitios que la / Hamapola vulgar : es yerba anual y florece en / los meses de Marzo y Abril.

647. *Papaver hybridum*, L. *Papaver hybridum*.

648. *Papaver Rhoeas*, L. *Papaver* (*Rhoeas*) capsulis glabris globosis, caule piloso mul- / tifloro, foliis pinnatifidis incis. Pract. Bot. de Lin. p^r. / Palau tom. 4^o. pag. 306 / *Papaver erraticum*, majus Dioscoridis, Plinii, / Theophrasti. T. Inst. R. H. 238. Flora Española t^o. 6^o. 54. / *Papaver erraticum*. Lag. C. B. com. Mat. 745. / Se cria en abundancia asombrosa en todos los / campos de labor del circuito de Córdoba, la llaman A- / mapola, es annua y florece en Marzo y Abril.

649. *Papaver somniferum*, L. Class. Decima-tercia Polian- / dria / Ordo Monoginia / *Papaver cristatum*° papa- / paberis somniferi / Linn. p^r. Pal. tom. 4^o. p^a. / 308. / Se cultiva en Córdoba en / casi todos los jardines bajo el / nombre de Amapolas de Yndias, / este esqueleto no es de los mas / dobles aun quando su semilla / lo era, p^r. algunas circunstan- / cias que acompañaron el tpo. / de su sembradura, otras son / como el buelo de los Claveles. (Reverso) : mas grandes. a esta benefi- / ca planta devemos la salutife- / ra medicina del opio, tan acre- / ditada de algun tpo. a esta par- / te y no sin mucha razon, es el / tónico difusivo mas poderoso, / que se conoce, pero aun es mas / calmante y anodino, y pudiera / llamarse con razon el reme / dio unibersal, y el manjar de / los

Dioses, hablando con el / lenguaje de los Poetas, en el es / tado de
 opio puro es mas narcoti- / ca que calmante, pero en el de ex- /
 tracto acuoso segun los ultimos , metodos, es el anodino mas se- /
 guro, y posee las propiedades di- / chas arriba en el mas alto grado.

650. *Glaucium corniculatum*, Curt. Papaver / corniculatum.

651. *Nymphaea lutea*, L. Nymphaea (Lutea) foliis carda- /
 tis integerrimis, calyce petalis / majore pentaphyllo. Pract. Bot. /
 de Lin. p^r. Palau t^o. 4^o. pag. 316. / Nymphaea lutea, major. / T. Inst.
 R. H. 261. F. Esp. t^o. 5^o. 497. / Nymphaea lutea. C. Bauhin. / com.
 Mat. sup. Diosc. 643. Dodon. / pemp 585. / Vi esta planta en un
 pilon / de agua en el Jardin Botani- / co de Sevilla, donde cogi
 este esqt^o.

652. *Tilia platyphylla*, Scop. Tilia (Europaea) floribus nec-
 tario / destitutis. P. B. de L. p^r. P. t^o. 4^o p^a. 329. / Tilia foemina, folio
 majore. T. / Inst. R. H. 611. Flo. Esp. t^o. 6^o. p^a. 388. / Tilia. Lag. in
 Diosc. 78. foemi- / na. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 156. / vulgo : Tila. /
 Este Arbol que es de la corpulen- / cia de un Alamo, se cria en Es-
 paña / en Aragon, Asturias, y los pirineos de / Jaca, se cultiva un
 gran Arbol en Cor- / doba en el Ospital de Jesus, de donde se /
 han sacado varias plantas. florece en / Mayo, y Junio.

653. *Tilia ulmifolia*, Scop. Tilia microphylla / Decandolle.

654. *Tilia platyphylla*, Scop. Tilia Platyphyllos / Decandolle.

655. *Cistus laurifolius*, L. Cistus laurifolia / W.

656. *Cistus laurifolius*, L. Cistus Laurifolia. W. / Ledon?

657. *Cistus ladaniferus*, L. Cistus Ladaniferus. W.

658. *Cistus Monspeliensis*, L. Cistus Monspeliensis / Ca-
 trera.

659. *Cistus salviaefolius*, L. Cistus Salvifolius W.

660. *Cistus albidus*, L. Cistus / albidus / W.

661. *Cistus albidus*, L. Cistus Albidus.

662. *Cistus crispus*, L. Cistus Crispum. L.

663. *Cistus crispus*, L. Cistus crispus L.

664. *Cistus crispus*, L. 38 Cistus crispus / H.

665. *Halimium halimifolium* (L.) Wk. Cistus Halimifolius.
 L. / sericeus. W.

666. *Cistus Clusii*, Dun. Cistus Libanotis. L.

667. *Cistus Clusii*, Dun. 34 Lag. / Cistus Libanotis. fol. nob.
 [tachado rosmar].

668. *Cistus Clusii*, Dun. *Cistus Rosmarinifolios* / Libanotis L.
669. *Cistus Clusii*, Dun. *Cistus libanotis* / W.
670. *Halimium umbellatum*, (L.) Spach. *Cistus* / *umbellatus* / W. / ipse est / *libanotis*.
671. *Halimium umbellatum*, (L.) Spach. *Cistus umbellatus* W. / Arroyo de D.Lucas.
672. *Helianthemum Fumana*, Mill. *Cistus* / *calycinus* / W.
673. *Helianthemum Fumana*, Mill. *Cistus* / *calycinus*.
674. *Helianthemum laevipes*, Pers. *Cistus Levipes*. / *fumana* / W.
675. *Helianthemum montanum*, Vis. *Cistus canus* W.
676. *Helianthemum montanum*, Vis. *Cistus Italicus* / Cabrera.
677. *Helianthemum marifolium*, (Cav.) DC. *Cistus* / *Marifolius*.
678. *Tuberaria variabilis*, Wk. *Cistus guttatus*.
679. *Helianthemum salicifolium*, (L.) P. *Cistus Guttatus*. W. / tambien encuentro yo xaras. / sin herborizar en las Sierras de / Segura. / Es el *Cistus punctatus* W.
680. *Helianthemum ledifolium*, (L.) W. *Cistus* / *Ledifolius* / Abril de 1808.
681. *Helianthemum salicifolium*, (L.) P. n° 39 H. / *Cistus salicifol.*L.
682. *Cistus glaucus*, Pourr. *Cistus Ledon*.W.
683. *Helianthemum salicifolium* (L.) P. *Cistus Salicifolius* / W.
684. *Helianthemum ledifolium* (L.) W. *Cistus Niloticus* L.
685. *Helianthemum Aegyptiacum* (L.) Mill. *Cistus aegyptiacus* W. / Lagar del rosal 10 de Abril.
686. *Helianthemum Aegyptiacum* (L.) Mill. *Cistus aegyptiacus*.
687. *Helianthemum Aegyptiacum* (L.) Mill. *Cistus aegyptiacus* / W.
688. *Helianthemum squamatum* (L.) P. *Cistus squamatus*. / Otra etiqueta dice: Determinada por D^a. / Pedro Abatt catedra / tico de Botanica en / Sevilla. / Yo la tengo por variedad del / C. *Racemosus*.
689. *Helianthemum vulgare*, Gaertn. *Cistus...Surreianus*. /

nº 33 Lagc^a. / Esta especie se distingue de / las demas herbaceas con estipulas / p^r. las hojas florales sentadas y / sin estipulas, y p^r. las flores en / espiga ladeada y rebuelta : tiene / los calyces mas agudos q^o. las de- / mas especies, y diez estambres.

690. *Helianthemum vulgare*, Gärtn. *Cistus numularius* / W.

691. *Helianthemum vulgare*, Gärtn. 30 / *Cistus serpilifolius* / W.

692. *Fumana glutinosa* (L.) Bss. *Cistus thimifolius* / W. / An sp.nova / quae veriilatus dici / poterit / nan stipulae in folia abeunt.

693. *Fumana glutinosa* (L.) Bss. *Cistus Thymifolius*.

694. *Fumana glutinosa* (L.) Bss. *Cistus Thimifolius* / Cabrera. (Otra etiqueta dice) : *Cistus thym* / *Fumana viscida* Spach / 10 M / Vzgr - 2 Julio.

695. *Helianthemum pilosum* (L.) P. *Cistus pilosus* / v. β W. / 38.

696. *Helianthemum pilosum* (L.) P. *Cistus strictus* [tachado strictus] / W. *pilosus* v. β

697. *Helianthemum pilosum* (L.) P. *Cistus racemosus* / H. / Segura.

698. *Helianthemum pilosum* (L.) P. *Cistus Racemosus* / Cabrera.

699. *Helianthemum pilosum* (L.) P. 33 / *Cistus racemosus*.

700. *Helianthemum hirtum* (L.) P. *Cistus polifolius* / W. / *hirtus* [tachado polifolius].

701. *Cistus populifolius*, L. *Cistus Populifolius*, L.

702. *Cistus* sp. 11 *Cistus*, H.

703. *Cistus ladaniferus*, L. Xara como romero.

704. *Helianthemum glaucum* (Cav.) Bass. *Cistus croceus* / W.

705. *Helianthemum organifolium* (Lam.) P. *Cistus dichotomus?* / W.

706. *Helianthemum Lippii*, Pers. *Cistus ellipticus* / W. / *polianthos*.

707. *Helianthemum Lippii*, Pers. *Cistus elipticus* / W. / 29.

708. *Helianthemum lavandulaefolium* (Lam.) DC. *Cistus lavandulaefolius* / W.

709. *Helianthemum variabile*, Spach. *Cistus mutabilis* / Caban. / 38 / H. / 38 / C.

710. *Tuberaria variabilis*, Wk. Cistus plantagine- / us / W.
711. *Tuberaria variabilis*, Wk. Cistus / plantagineus / W.
712. *Helianthemum salicifolium* (L.) P. Cistus punctatus / W.
713. *Tuberaria variabilis*, Wk. Cistus serratus. W / aunque no tiene los Pétalos / aserrados, creo es mas bien esta / especie que el . C. Guttatus / pero de las dos no escapa.
714. *Corchorus olitorius*, L. Corchorus (olitorius), capsulis ob- / longis ventricosis, foliorum serra- / turis infimis setaceis. Pract.Bot. / de Lin.p^r.Palau t^o. 4^o.pag.369 / Corchorus sive Me- / lochia. T. / I.R.H. 259 / Esta planta habita en Asia, / Africa y America. Pal. la vi culti- / bada en el Jardin Botanico de Se- / villa, año de 1793. donde cogi este / esqueleto : es annua y florece / en / el Estío.
715. *Paeonia officinalis*, L. Polyandria.Diginia / G. / Paeo- / nia. / Llamada asi porque Paeon, medico antiguo / la descubrio ó / puso en uso. / *Paeonia* (Officinalis) foliolis oblongis.mascula./Prac. Bot. de Lin.p^r.Palau tom. 4^o pag. 382. / *Paeonia* folio nigricante, splendido, quae mas.T. / Inst.R.H.273.Flora Española t^o. 6^o. pa- / gina 42. / *Paeonia* mas. Dod. pempt.194.C.B.com.Mat.655. / La Peonia se cría en la sierra de Cordoba,y donde se / halla en gran- / disima abundancia es en las Gmonosas / dehesas situadas hacia Villa-viciosa :su raiz es perenn, / florece en Abril y Mayo.
716. *Delphinium Consolida*, L. Delphinium consolida / ú / otra especie.
717. *Delphinium Ajacis*, L. Class.Decima - tercia poliand^a. / Ordo Triginia / Delphinium Ajacis / Linneo por Palau t^o.4^o. p^a.390 / Delphinio de Ajax / vulgo Espuela de Caballero / Se cultiva en casi / todos los jardines de / Cordova,y varia ma- / villasam^t.en los colo- / res de la corola y doblan- / do su flor, q^o.se hace ri- / zada y plena.
718. *Delphinium Ajacis*, L. Delfinium / ajacis / W.
719. *Delphinium peregrinum*, L. Delphinium Peregrinum Lin
720. *Delphinium peregrinum*, L. Delphinium peregrinum / ó / D. Ajax / Entrena.
721. *Delphinium Staphysagria*, L. Delphinium / Staphisa- / gria.
722. *Delphinium Staphysagria*, L. Delphinium (Staphisa- / gria) necta- / riis tetraphyllis petalo brevioribus / foliis palmatis,

lobis obtusis. Pract. / Bot. de Lin. p^r. Palau t^o. 4^o. p^a. 394. / *Delphinium* Platanifolio, Sta- / phisagria dictum. T. I. R. H. 428. / Flora Española tom. 5^o. pag. 44. // *Staphisagria*. C. B. com. Mat. / sup. Diosc. 850. Lag. 471. Dod. p. 366. / vulgo: Albarraz. / Se cria esta especie en el / termino de Cordoba, particularmt^o. / en las dehesas de Rivera, se hace / gran cosecha de sus semillas, que sir- / [Reverso]: ve para matar los piojos con su / cocimiento. Es annua y florece / por los meses de Mayo y Junio.

723. *Delphinium*, sp. *Delfinium* / V. 14 Julio.

724. *Aquilegia vulgaris*, L. Classis Decima-tercia Poliandria Ordo / Pentaginia / *Aquilegia vulgaris* / Linneo p^r. Palau t^o. 4^o. / pag^a. 405 = *Aquilegia* / vulgar. (vulgo) *Aquile-* / ña, Manto real, Peli- / canos. / Se cultiva en Cordo- / va en casi todos los / Jardines y entre ellos / en el de la Condesa / de la Torre de donde / obtube este esqueleto.

725. *Aquilegia vulgaris*, L. *Aquilegia* (vulgaris) nectariis incurvis. Pract. Bot. de / Lin. p^r. Palau t^o. 4^o. pag. 405. / *Aquilegia syl-* / vestris. T. Inst. R. H. 428. Quer / Flora Española t^o. 3^o. pag. 81. // *Aquilegia*. Dod. pempt. 181. *Aquilina*. C / Bauhin. comment. Matth. sup. Diosc. 457 / Esta planta se cultiva en Cordoba, la llaman / *Pelicanos*, varia produciendo las flores dobles, y de co- / lor blanco, florece en Abril y Mayo.

726. *Nigella arvensis*, L. *Nigella* / *Arvensis* / Cabrera.

727. *Nigella orientalis*, L. *Nigella Orientalis*.

728. *Nigella Damascena*, L. *Nigella Vulgaris* / vulgo Arañas.

729. *Anemone coronaria*, L. *Anemone Coronaria*.

730. *Anemone coronaria*, L. *Anemone* (coronaria) Variet. α / Pract. Bot. de Lin. p^r. P. t^o. 4^o. 434. / *Anemone tenuifolia*, mul- / tiplex, rubra. C. B. P. 176. / *Anemone tenuifolia ple-* / no flore, ex atro purpuracen- / ti. Swert. florileg. lib. 1^o. fol. 4. / Esta hermosa *Anemone* / se cultiva en todos los Jardines / de Cordoba, y en muchisimas casas, Su raiz es p^o. fl^o. en Mz^o. y Al

731. *Anemone palmata*, L. *Anemone* (Palmata) foliis cordatis / sublobatis, calyce hexaphylo colorato. / Lin. Spec. Plant. p^r. p^a. t^o. 4^o. p^a. 435. / *Anemone Cyclaminis* seu *Malvae* / Folio, lutea. C. B. P. 173. T. I. R. Herv. / 275. F. E. t^o. 3^o. p^a. 34. / *Anemone hortensis* lutea. Swert. / Florileg. lib. 1^o. fol. 3. / Esta planta se cria con abundancia á / una Legua de distancia de la Ciudad de Cordoba /

en Sierra-morena,enterritorio del Lagar de / torre-doria,y en todos aquellos contornos,donde / la he obserbado,y de donde la traje á Cordoba el / Año de 1792. Su raiz es perenne,tuberosa,de / donde salen las ojas con pezones mui largos,ha- / llandose estas pegadas al suelo alrededor de la plan- / ta p^r.estar aquellos sote- rrados.Florece en Abril.

732. *Anemone*, sp. *Anemone*.

733. *Clematis Vitalba*, L. *Clematis* (*Vitalba*) foliis pinnatis foliolis cordatis / scandentibus.Pract.Bot.de Lin.p^r.Palau t^o.4^o. 449. / *Clematitidis sylvestris latifolia*.T.I.R.H.293. / Quer Flora Española t^o.4^o.pag.51. / *Clematis*. tertia.C.B.com.Matth.pag. 680. / *Clematis altera*.Lag.in Diosc.380. / *Vitalba*.Dodon.pemp. 404. / Se cria en Cordoba en el arroyo Pedroches y otros / su raiz es perenne,brota en Mz^o.y f^o.Junio y J^o.

734. *Clematis Vitalba*, L. Class. decima-tercia Poliandria / Ordo Poliginia / *Clematis vitalva* / Linneo p^r.P.t^o.4^o.p.449. / *Cle- matide vitalva* (vulgo) / Yerba de los Pordioseros.este / nombre lo deve a ser una / planta muy acre y corrosiba / razon p^r.q^o.los Pordioseros fin- / gidos se la aplicaban a el cu- / erpo,y se for- maban llagas : / se cria con mucha abundancia en la sierra de Cor- dova / donde vulgarm . la llaman / yerba Molinera = flore- / ce p^r.Junio,y Julio.

735. *Clematis Flammula*, L. *Clematis Flamula* Lin.

736. *Thalictrum flavum*, L. *Talictum Flavum*.L.

737. *Adonis autumnalis*, L. *Adonis / autumnalis*.

738. *Adonis vernalis*, L. Umbria Abril.1812. / 48.L. / *Ado- nis vernalis*.

739. *Ranunculus bullatus*, Lge. Polyandria Polygynia / G / *Ranunculus*. / *Ranunculus* (*bullatus*) = / foliis ovatis serratis, scapo nudo / unifloro.Lin.Spec.Pantarum / p^r.p^a.t^o.4^o.p^a.471. / *Ranunculus Lusitanicus*,folio sub- / rotundo,parvo flore.Tourn. Inst. / Rei Herbar.286. / Flora Española t^o.6^o.p^a.171. / *Ranuncu- lus Lusitanicus*.Dod. / pempt.420. / *Ranunculus latifolius*,*bullat- us*, / *Asphodeli radice*.C.B.P.181. / Se cria con mucha abundan- cia en / los con tornos de Cordoba,como es en las / canteras,en las inmediaciones de la / Arrizafa &c.florece por Octubre y / Nobiembre :su raiz es perenne :p^r.cri- / arse en la Arrizafa y flo- recer en Nobiembre / la llaman vulgariamente flores de San Diego.

740. *Ranunculus repens*, L. *Ranunculus* (*Repens*) &c.Pract.

/ Bot.de Lin.p^r.Palau t^o.4^o.p^a.483. / Variatus floribus plenis. =
/ vulgo: Boton de Oro. / Esta planta se cultiba en / Cordoba, en
Jardines y casas / particulares; se propaga y cunde / mucho con
sus sarmientos: es pe / renne y florece en Marzo y / Abril.

741. *Ficaria ranunculoides*, Moench. *Ranunculus* (*Ficaria*) fo-
liis cordatis angulatis petio- / latis, caule unifloro. Pract. Bot. de Lin.
p^r.Pal.t^o.4^o.471. / *Ranunculus vernus*, rotundi folius, minor. Tour-
nef. / Inst. R. H. 286. Quer Flora Española t^o.6^o. pag.166. / *Che-
lidonium minus*. Lag. in Diosc.257. Casp.B. / comment. Matth. pag.
468. / Esta planta se cria en sitios humedos de los campos de /
Cordoba, como el Arroyo Pedroches, en el Bosque de la A- / lame-
da, en las Acequias de las Huertas. &tc. f^o. en Mz^o

742. *Cyrianthe Asiatica* (L.) Freyn. *Ranunculus Asiati /
cus*.

743. *Cyrianthe Asiatica* (L.) Freyn. *Ranunculus* (*Asiaticus*)
V^o. / Pract. Bot. de Lin. p^r. P t^o 4^o. 478. / Se cultiva en Cordoba en
/ los jardines y casas particula- / res: su raiz es p^o. f^o. en Mz^o.

744. *Ranunculus bulbosus*, L. *Ranunculus bulbosus*.

745. *Ranunculus acris*, L. *Ranunculo / acre*.

746. *Ranunculus peltatus*, Schrank. *Ranunculus Aquati / lis*.

747. *Helleborus niger*, L. *Helleborus fetidus* [tachado feti-
dus] niger / W.

Clase XIV

Clasis / XIV / *Didynamia*. / Ordo / *Ginnos- / per / nia*

748. *Ajuga pyramidalis*, L. *Aiuga pyramidalis*. / cultivada
en casa / 1814.

749. *Ajuga reptans*, L. *Ajuga* (*reptans*) *stolonibus reptanti-
bus*. Pract. Bo- / tanic. de Lin. p^r. Palau t^o.4^o. pag.525. / *Bugula*.
Dod. pempt.135. T. Inst. R. H. 209. / Flora Española t^o.3^o. pag.317.
/ Se cria en varias partes de España vease Q^r. / la cultibo en Cor-
doba, y el año de 1794 invié / un cesped de ella á Sevilla; se pro-
paga mucho / rastreando, es perenne y florece en Abril y M^o.

750. *Ajuga Chamaepitys*, Schreb. *Teucrium / Chamepitis*.

751. *Ajuga Chamaepitys*, Schreb. *Teucrium chamaepyt* L.

752. *Teucrium Pseudo-Chamaepitys*, L. *Teucrium* / pseudo-chamepitis / W.

753. *Teucrium Pseudo-Chamaepitys*, L. *Teucrium Pseudo-Cha-* / mepytis.

754. *Ajuga Iva*, Schreb. *Teucrium Iva* L. / Cabrera.

755. *Teucrium fruticans*, L. *Teucrium fruticans*. / Vulgo-Olivilla.

756. *Teucrium Marum*, L. *Teucrium* (Marum) foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis subtus tomentosis, floribus racemosis secundis / Pract.Bot.de Lin.p^r. Palau t^o.4^o. 534. / *Chamaedris incana maritima frutecens, foliis lanceolatis*. T.I. R.H. / 205. Flora Española t^o.4^o.p^a.167. / *Marum*. Lag.296.C. B. comm. / Mat.in Diosc.536. / Farm.Marum Cortusi, et verum. / Se cria en el Reyno de Valencia, / y se ha cultivado en Córdoba en Jesus / Nazareno, y se cultiva hoy por mí. / En el año de 1790. remiti un / gran Zesped de esta planta al Jardín / Botánico de Sevilla, donde la vi en / el de 93. Es perenne, y florece en los / Meses de Junio y Julio. / El olor de esta planta es sumamente agradable á los Gatos, los incita / á Luxuria, por lo que se deleitan en mor- / derla, y revolcarse sobre ella, derramando muchas babas, y alguna vez su es- / perma, quedando despues como aturdidos / ó enagenados. Por este motivo, para con- / servarla, no se puede tener en el suelo, / ni en parte donde ellos la alcancen.

757. *Teucrium Scorodonia*, L. *Teucrium Scorodonia*.

758. *Teucrium scordium*, L. *Teucrium* / *Scordium* / Cabrera.

759. *Teucrium Chamaedrys*, L. *Teucrium* / *chamaedrys*.

760. *Teucrium Chamaedrys*, L. Class.XIV Didinamia Ord. Gimnospermia / *Teucrium Chamaedris* / Linn.Tom.4^o.Pag^a. 543 / *Teucrio Chamaedris*.

761. *Teucrium Pyrenaicum*, L. *Teucrium* / *pyrenaicum* / W. (tachado *An rotundifolius*?).

762. *Teucrium Polium*, L. Class.XIV Didinamia Ord. Gimnospermia / *Teucrium Polium* / Linn.Tom.4^o.pag^a. 547 / *Teucrio Polio* (vulgo Zamarrilla. (Otra etiqueta dice): Dudo q^o sea *teucrium* / per no hai corola.

763. *Teucrium Polium*, L. *Teucrium* (Polium) capitulis subrotundis, foliis oblongis / obtusis crenatis tomentosis sessilibus, caule postrato. Pract. / Bot.de Lin.p^r.Palau. t^o.4^o.pag.547. (Otra

etiqueta dice) : *Teucrium* (Polium). V^a. β. Práct. Bot. de Lin. p^r. / Palau t^o. 4^o. pag. 547. / *Polium montanum album*. T. Inst. R. H. 206. / Quer Flora Española t^o. 6^o. pag. 114. / Se cria con mucha abundancia en Cordoba / en terrenos incultos y margenes de los caminos de la sierra y en toda la falda de ella : es perenne y florece en los meses de M^o. y J^o.

764. *Teucrium Polium*, L. *Teucrium Polium* L. / Entrena.

765. *Teucrium Polium*, L. *Teucrium polium* Lin. / seu capitatum / W.

766. *Teucrium gnaphalodes*, Vahl. *Teucrium Gnaphalodes*. W.

767. *Teucrium capitatum*, L. *Teucrium valentinum*.

768. *Teucrium fruticans*, L. *Theucrium rorismarinifolio?* / 41. H. / V. 8 Julio.

769. *Teucrium pyrenaicum*, L. *Teucrium* / son dos variedades. ? / *rotundifolium* / 45. L. / C. istmo 21 de Julio.

770. *Micromeria graeca*, Bth. *Rara*. / *Satureia Graeca* L.

771. *Satureja hortensis*, L. *Satureia* (Hortensis) *pedunculis bifloris*. / Lin. Sp. Plant. p^r. pⁿ. t^o. 4^o. p^a. 555. / *Satureja sativa*. Tourn. p. 197. Flora Española t^o. 6^o. p^a. 253. / *Satureja*. Dod. pempt. 289. / *Satureja*. Lag. in Diosc. 294. / vulgo Axedrea. / Dice Quer en su Flora Española que se / cria naturalmente en algunos terrenos de / España ; pero no los señala, se cultiva en las / huertas y Jardines, y en Cordoba en muchas / partes. Es annua y florece por Junio y / Julio.

772. *Coridothymus capitatus*, Rchb. *Satureia* (Capitata) *floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis*. Pract. Bot. de Lin. p^r. Palau / t^o. 4^o. pag. 555. / *Thymus capitatus*, qui Dioscoridis. T. Inst. R. / Herv. 196. Quer Flora Española t^o. 6^o. pag. 384. / *Thymus*. Lag. 292. = *Thymum*. C. B. comment. / Matth. sup. Diosc. 531. = vulgo : *Tomillo legitimo*. / Esta planta se cria con mucha abundancia / en los terrenos aridos de los campos de Cordoba, es / perenne y florece en los meses de Junio y Julio.

773. *Micromeria graeca*, Benth. *Satureya* / *Linifolia* Cabrera / Desfontaines.

774. *Thymbra spicata*, L. *Thymbra spicata*.

775. *Thymbra spicata*, L. *Thymbra verticillata* / W.

776. *Hyssopus officinalis*, L. *Hyssopus* (Officinalis) *spicis secundis, foliis lanceolatis*. Pract. / Bot. de Lin. p^r. Palau t^o. 4^o. 558. / *Hyssopus officinarum*, coerulea seu *spicata*. T. Inst. R.

H. / 200. Flora Española tº.5º. pag.247. / *Hyssopus vulgaris*. Dod. pem- / pt.287. / Esta planta se cria en varias / partes de España : Quer, y se cultiba / en Cordoba por algunos curiosos. / Es perenne y florece en Ma- / yo y Junio. Su semilla la hice ve- / nir á Cordoba del Jº. Bº. de Sevilla.

777. *Nepeta Cataria*, L. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia / *Nepeta Cataria* / Linn. Tom 4º. pagª. 561 / *Nepeta Cataria*.

778. *Nepeta Cataria*, L. *Nepeta* / *Cattaria* / *Cabrera*.

779. *Nepeta violacea*, Brot. *Nepeta violacea* L. / *Entrena*. (Otra etiqueta dice) : *Nepeta* / V. 3 de Julio.

780. *Nepeta violacea*, Brot. *Nepeta Violacea*.

781. *Nepeta Nepetella*, Koch. *Nepeta Nepetella* L. / *Entrena*.

782. *Nepeta tuberosa*, L. *Nepeta tuberosa* / *Statice limonum*.

783. *Nepeta tuberosa*, L. *Nepeta* (*Tuberosa*) *spicis sessilibus terminalibus, bracteis ovatis coloratis, foliis summis sessilibus*. Pract. B. de L. pº. P. tº. 4º. 564. / *Cataria Hispanica, supina* / *Betonice folio, tuberosa radice*. / T. I. R. H. 202. F. E. tº. 4º. pª. 33. / Se cria esta especie de plan- / ta tres leguas de Cordoba entre / campo alto y campo baxo, cami- / no de los Pedroches, y la he visto / hacia las suebas de la Albayda. / Su raíz es perenne : florece en Mayo.

784. *Lavandula vera*, DC. *Lavandula* (*Spica*) *foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis*. / Pract. B. de L. pº. Palau tº. 4º. 571. / *Lavandula angustifolia*. T. I. / R. H. 198. F. E. tom. 5º. pª. 315. / *Dodon. pempt. 273*. / *Lavandula*. C. B. comm. Mat. / sup. Diosc. pag. 32. / vulgo Alhucema / Se cria en Andalucía : se / hace mucho uso de la flor para / perfumar, la planta se culti- / ba en Cordoba para dibuxos en / los Jardines. Es pº., flº. en Junio.

785. *Lavandula vera*, DC. *Lavandula spica* / W.

786. *Lavandula dentata*, L. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia. / *Lavandula Dentata* / [tachado *spicata*]. Linn. tom. 4º. pagª. 572 / *Lavandula Dentata*.

787. *Lavandula dentata*, L. *Lavandula* (*Dentata*) *foliis pinnato-dentatis, spicis ramosis*. Prct. / Bot. de Lin. pº. Pal. tº. 4º. pag. 572. / *Lavandula foliis crenatis*. T / Inst. R. H. 198. Fl. Esp. tº. 5º. pª. 316. / Esta especie dice Quer la ha / visto en el contorno de Cordoba ; / mas yo no la he visto todavia. / Se cultiba en el

Jardin Bo- / tanico de Sevilla el año de 1793. / donde cogi este esqueleto :es pe- / renne y florece en el Estio.

788. *Lavandula Stoechas*, L. *Lavandula* (*Stoechas*) foliis lanceo- / lato-linearibus integerrimis, spi- / cis comosis. P.B. de L. p^r. P. t^o. n^o. 572. / *Stoechas purpurea*. T.J.R.H. / 201. Flora Española t^o. 6^o. p^a. 335. / *Stoechas*. Lag. 284. C.B. com. / Mat. sup. Diosc. 518. / vulgo *Cantueso*. / Esta planta se cria con mu- / chisima abundancia en las cer- / cañas de Cordoba en terrenos / aridos y guija- / rrosos, como en la / peña de la buena vista, en el / arroyo de las peñas, y en toda la / Sierra. Es perenne y florece. / en los meses de Abril y Mayo.

789. *Sideritis montana*, L. *Sideritis* (*montana*) herbacea ebracteata / calicibus corola (tachado brevioribus) maioribus spinosis / labio superiore trifido. Palau. t. 4. p. 576. / La cogí en Nabalasna cortijada de Segura / y la traxe viva á Cordoba año de 1814.

790. *Sideritis Romana*, L. *Sideritis Romana* / Mayo 24 / Cavan. f. 323.

791. *Stachis recta*, L. No se pueden observar / los estambres revueltos / *Stachis recta* Cav / ó / *Sideritis romana* Cav / Entrena.

792. *Sideritis Romana*, L. *Sideritis romana* 22. L.

793. *Sideritis incana*, L. *Sideritis* / *incana* / W. (Otra etiqueta dice) : Collado arenoso - 10. Julio.

794. *Sideritis incana*, L. *Sideritis* / blanquecina.

795. *Sideritis scordioides*, L. *Sideritis scordioides* / W. / Desde la Venta de Ezpelui / en el sitio de las Canteras / viniendo á Andujar.

796. *Sideritis scordioides*, L. *Sideritis* / *Scordioides* / W.

797. *Sideritis hirsuta*, L. *Sideritis* / de pelo aspero.

798. *Sideritis hirsuta*, L. *Sideritis* / *hirsuta*.

799. *Mentha silvestris*, L. *Mentha* (*Sylvestris*) spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis ser- / ratis sessilibus, staminibus co- / rolla longioribus. Pract. Botan. de / Lin. p^r. Palau tom. 4^o. pag. 583. / *Mentha sylvestris* folio longi- / ore. T. J. R. H. 189. Fl^a. Esp^a. t^o. 5. 429. / *Menthastrum*. C. B. comment. / Matthiol. sup. Diosc. 527. Lag. 291. / Se cria esta especie en varias / partes de España : vease á Quer. / Me dio este esqueleto con aquel / nombre Generico y Especifico, Dⁿ. / Anastasio Guzman en Sevilla / año de 1793.

800. *Mentha rotundifolia*, L. *Mentha* Menthast- / rum. / [Otra etiqueta dice] : *Mentha Rotundifolia* L. / Entrena.

801. *Mentha aquatica*, L. *Mentha Hirsuta* L. / M. ¿Aquatica? / Entrena.

802. *Mentha aquatica*, L. *Mentha* / Aquatica / Cabrera.

803. *Mentha aquatica*, L. *Menta Rotundifolia* L. / Entrena. (Otra etiqueta dice) : Class.XIV Didinamia Ord. Gimnosp^a. / *Mentha Aquatica* / Linn.Tom.4^o.pag^a.586. / *Menta Aquatica*.

804. *Mentha sativa*, L. Class.XIV Didinamia Ord.Gimnosperm^a. / *Mentha Sativa* / Linn.Tom.4^o.pag^a.587. / *Menta Sativa* (vulgo) Yerba buena.

805. *Mentha sativa*, L. *Mentha* (Gentilis) floribus ver- / ticillatis,foliis ovatis acutis ser- / ratis,staminibus corolla brevioribus.Pract.B.de L.p^r.P.4^o.588. / *Mentha hortensi*,verticillata,Ocymi odore.T.Inst.R.H. / 189.Flora Española t^o.5^o.pag.486. / *Sandalos* llaman en Cor- / doba á esta planta que se culti- / ba en muchisimas parte de la / Ciudad :la raiz tiene perenne / y cundidora :florece en Junio / y Julio y parte de Agosto.

806. *Mentha sativa*, L. Class.XIV Didinamia Ord Gimnosperm^a. / *Mentha Gentilis* / Linn.Tom.4^o.pagina 588 / *Menta Gentil* (vulgo) Sandalos.

807. *Mentha Pulegium*, L. *Mentha pulegium*. / Lin. / Spec. plant.807. / clase 14.orden gimnosperm. / *Mentha aquatica*, seu *Pulegium* vulgare.T.189.

808. *Mentha Pulegium*, L. *Mentha Pulegium* / vulgo Poleo / Cabrera.

809. *Glechoma hederaceum*, L. Class.Decima-quarta Didinamia / Ordo Gimnospermia / *Glechoma Hederacea* / Linn.p^r.Palau tom.4^o.p^a. / 594 *Glechoma* como Yedra (vulgo) / Yedra terrestre : es sola en su especie hasta aora,ó p^r. lo menos / p^r.Linneo y Cabanilles,se cultiva en Cordova en varios jardines,y entre ellos en el de el Hospital de Jesus,de donde trage / este esqueleto.

810. *Lamium amplexicaule*, L. *Lamium amplexicaule* L.

811. *Betonica officinalis*, L.

812. *Betonica officinalis*, L. *Betonica officinalis* / W.

813. *Stachys germanica*, L. *Stachys germanica* Cav.

814. *Stachys palaestina*, L. *Stachis* / de Palestina?

815. *Stachys recta*, L. *Stachys recta*,Mayo / 22.

816. *Stachys recta*, L. *Stachys recta* 23.C.
817. *Stachys recta*, L. *Stachys recta* / Entrena.
818. *Stachys recta*, L. *Stachys recta*.
819. *Ballota nigra*, L. *Balota negra*.
820. *Marrubium candidissimum*, L. *Marrubium* / *candidissimum* / W. / Siles-Junio-29.
821. *Ballota hirsuta*, Bth. *Marrubium hispanicum*.L.
822. *Leonurus Marrubistrum*, L. *Leonurus* / n°. 41 C. (Otra etiqueta dice) : *Leonurus. Marrubias* / *trum?* / Entrena.
823. *Phlomis fruticosa*, L. *Phlomis Fruticosa* Cav°. / Entrena. (Otra etiqueta dice) : Class. XIV Didinamis Ord. Gimnospermia / *Phlomis Lichnites* / Linn. Tom. 4°. pag°. 634 / *Phlomis Lichnitis* (vulgo) *Candilera*.
824. *Phlomis purpurea*, L. *Phlomis Purpurea*.
825. *Phlomis Lychnitis*, L. *Phlomis Licnithis-Mayo* 22.
826. *Phlomis Lychnitis*, L. *Phlomis* (*Lychnites*) *foliis lanceo-* / *latis tomentosis, floralibus ovatis,* / *involucris setaceis lanatis.* Pract. / Bot. de Lin. p°. Palau t°. 4°. p°. 634. / *Phlomis Lychnitis.* T. I. R. H. / 178. Flora Esp. t°. 6°. pag. 95. / Esta planta se cria en Cor- / doba en terrenos aridos y gijar- / rosos, como en toda aque- / lla par- / te del camino de los Pedroches pa- / sada la puente. Es f°. en Mayo.
827. *Marrubium supinum*, L. *Phlomis Nisolii?* / [Otra etiqueta dice] : No es el *Plom:is Nisolii*, / ni ninguna especie de / las q° describe Lineo, Acaso / W. la trahera. como no , esta fresca no se puede decidir / sera el *Marubium Peregrinum*.
828. *Phlomis Herba venti*, L. *Phlomis herbaventi.* Cav°.
829. *Phlomis Herba venti*, L. *Phlomis herva - venti* L. / no se cria muy cerca de cordo / ba aunq° ignoro el paraje.
830. *Moluccella spinosa*, L. n° 426 / *Mollucela Spinosa* Cav.
831. *Origanum Dictamnus*, L. *Origanum* (*Dictamnus*) *foliis inferiori-* / *bus tomentosis, spicis nutantibus.* Lin. / Spec. Plant. p°. p°. t°. 4°. p°. 647. / *Dictamnus Creticus.* C. B. P. 222. / *Dictamnium verum.* Dod. pemp. 280. / *Origanum Creticum, latifolium, to-* / *mentosum, seu Dictamnus Creticus.* T. / I. R. H. 199. / *Dictamnium.* Lag. in Diosc. 288. / Farmc : *Dictamnus, vel Dictamus Cret.* / Ha- / vita en el Monte Ida de Creta. L. / Esta Planta apreciable p°. ser exotica / se cultiva en Córdoba por algunos Curiosos, / donde vejeta con la mayor lozania : sazona / sus semillas, y nace de ellas :

yo la he cultiva- / do,y el Año de 1792 invie una maceta della / al Jardin Botanico de Sevilla,donde la vi / con complacencia el de 93. Es perenne y flo- / rece en el Estio.

832. *Origanum vulgare*, L. *Origanum* (Vulgare) spicis subro- / tundis paniculatis conglomeratis, / bracteis calyce longioribus ovatis. / Pract.Bot.de L.p^r.P.t^o.4^o.p^a.649. / *Origanum sylvestre*, Cunilla / bubula Plinii.T.I.R.H.198. / Flora Española t^o.6^o.p^a. 26. / *Origanum sylvestre*.Lag.286. / Dodon.pempt.285. / *Origanum Vulgare*.C.B. in / Comment.Mat.sup.Diosc.519. / Se cria en toda la Sierra-mo- / rena de Cordoba.Se hace mucho / uso de el en las viandas ; es pe- / renne y florece en el Verano.

833. *Origanum Majorana*, L. *Origanum Mayorana* / vulgo - Mejoranas.

834. *Origanum Majorana*, L. Class.XIV Didinamia Ord. Gimnospermia / *Origanum Mayorana* / Linn.Tom.IV pag^a.652. / Oregano Mejorana ó Almoradux.

835. *Thymus vulgaris*, L. *Thymus vulgaris* / varietas γ W.

836. *Thymus Zygis*, L. *Thymus Zygis*.Cav.

837. *Thymus Zygis*, L. *Thymus* (*Zygis*) floribus verticillato- / spicatis,caule suffruticoso erecto,foli- / is linearibus basi cilia- / tis.Pract.Bot. / de Lin.p^r.Palau tom.4^o.pag.655. / *Thymbra His- / panica*,*Coridis fo- / lio*.T.I.R.H.197.F.E.t^o.6^o.p^a.377. / Esta plan- / ta se cria con mucha / abundancia en las cercanias de Cor- / doba, como en el Marrubial,y parti- / cularmente en los cerros que vier- / ten / al Arroyo Pedroches,es perenne,y / florece por Abril y Mayo.

838. *Thymus Cephalotus*, L. Ve se el caracter diferencial / de la Satureia q^o la separa / del thymus.en Lin tourn. / *Thymus Cephalotus* L. / Entrena / vide viride.

839. *Thymus Cephalotus*, L. Class.XIV Didinam. Ord. Gim- / nosper^a. / *Thimus Cephalotus* [tachado Capitatum] / Linn Tom. 4^o.pag^a.657. / Tomillo de cabezuela.

840. *Coridothymus capitatus*, Rchb. ¿An thymus Villosus L.? / Entrena. (Otra etiqueta dice) :Thimus / Capitatus / Ca- / brera.

841. *Melissa officinalis*, L. Class.XIV Didinamia ord.Gim- / nosper^a. / Mellisa Oficinalis / Linn.Tom.4^o.pag^a 660 / Melisa ofi- / cinal V.Toronjil.

842. *Melissa officinalis*, L. Melisa oficinalis.Lin.

843. *Calamintha officinalis*, Mnch.Meth. Melissa / Calamin-
ta / Cabrera.

844. *Calamintha grandiflora*, Mnch. Calaminta Montana /
Rodr. / Melissa calamintha.L. / C in R H M.

845. *Calamintha grandiflora*, Mnch. Class.XIV Didinamia
Ord.Gimnospermia / Chalaminta Montana Vel / Mellisa Chala-
mintha / Lin.Tom.4º.pagª.661. Melissa calaminta / Mellissa pe-
dunculis axilaribus / dichotomis longitudine foliorum Mat.Me-
dic 176 = Mellissa foliis subhirsutis ova- / to-lanceolatis acute
serratis petiolis / florioris comosis folia superantibus Hall. /
Cavª. nº. 241.

846. *Ocimum Basilicum*, L. ClassXIV Didinamia Ordo /
Gimnospermia / Occimum Basilicum / Linn. Tom.4ºpagª.678 /
Albahaca Real.

847. *Brunella alba* Pall. ap., M.Bieb. Prunela Laciniata /
Entrena.

848. *Brunella alba* Pall. ap., M.Bieb Prunela Laciniata /
Lin. / Puente-honda - Junio-29.

849. *Cleonia Lusitanica*, L. Cleonia Lusitanica / Cabrera.

850. *Rhinanthus minor*, Ehrh. Rhinanthus / crista-galli.

851. *Trixago apula*, Stev. Rhinanthus (Trixago) calycibus
hir- / suto-tomentosis,foliis oppositis,obtuse / serratis,caule sim-
plicissimo.Pract.Bot. / de Lin.pª.Palau tom.4º.pag.709. / Pedicu-
laris maritima,folio oblongo / serrato.T.I.R.H.172.F.E.tª.6º.69. /
Esta planta se cria en si- / tios humedos ; en Cordoba en el Arro-
 / yo Pedroches, y en el Caño Bazan / cerca de la Arrizafa.Es
annua / y florece por Mayo y Junio.

852. *Euphrasia officinalis*, L. Euphrasia (Officinalis) foliis
ova- / tis lineatis argute dentatis.Pract / Bot.de Lin pª.Palau
tª.4º.pag.712 / Euphrasia Officinarum.T.I. / R.H.174.Flora Es-
pañ.tª.5º.pª.92. / Esta plantica se cria en / Cordoba en los prados
de las dege- / sas,y en qualquier suelo ó terreno / de corteza,como
en la Peña de / la buena vista,y en Peña taxa- / da y la Campi-
ñuela,y otros. / Es annua y florece en Abril y / Mayo.

853. *Euphrasia officinalis*, L. Euphrasia officinalis L.

854. *Odontites viscosa* (L.), Rchb. Eufrosia linifolia se cria
junto / á Siles de Segura y desde el Bonillo / á Villarodrigo lla-
mase vulgarmentª. / Algarabia. 40.C. / 42.H.

855. *Odontites viscosa* (L.), Rchb. Eufrosia viscosa 37.L. /

Se cria con abundancia junto á / Siles de Segura camino de la fuente / Salivas y por todo el cerro de la hermita de St^a. Quiteria.

856. *Odontites viscosa* (L.), Rchb. *Euphrasia Viscosa*. L. (Otra etiqueta dice) : *Euphrasia Purpurea* W.

857. *Linaria pilosa*, DC. *Linaria pilosa* (Desfontaines) / 6 / *Anthirrinum pilosum* Lin.

858. *Linaria spuria*, Mill. *Linaria spuria* / Cap.804 / *Antirrinum*. L. / Viz.3 Sbre.

859. *Linaria spuria*, Mill. *Anthirrinum Spurium* L.

860. *Linaria cirrhosa* (L.), Willd. *Anthirrinum* / *Cirrosum*.

861. *Linaria purpurea*, Mill. *Antirrinum Purpureum*.

862. *Linaria amethystea* (Brot.), Heffg. et Lk. *Anthirrinum* / *bipunctatum* / muy bonito / hacia la Ventilla / en las orillas del / Guadalimar / y el Cortijo de Paulez.

863. *Linaria arvensis* (L.), Desf. *Antirrinum sparteum* L. / an? *A. Arvense* Var^a. β L.

864. *Linaria tristis* (L.), Mill. (tachado *Narcisus bulbocodium*) / *Linaria* n^o 39. L. / *Antirrhinum triste?* L. (Otra etiqueta dice) : *Linaria* 41. L. / Amo.11 Jul.

865. *Linaria Tournefortii* (Poir.), Lge. *Anthirrinum* / *Saxatile*.

866. *Linaria Tournefortii* (Poir.), Lge. *Anthirrinum* / *saxatile*.

867. *Chaenorrhinum villosum*, DC. Chav. *Antirrhinum* / *villosum* W. / *Linaria hispanica* / de Tournefort.

868. *Chaenorrhinum origanifolium*, Cav. *Antirrhinum* / *origanifolium* / W.

869. *Antirrhinum*, sp. *Antirrhinum*. [tachado *Origanifolium*]. W.

870. *Linaria hirta* (L.) Mönch, DC. *Antirrhinum* / *hirtum* W.

871. *Linaria hirta* (L.) Mönch, DC. *Antirrhinum* (*hirtum*) *foliis lanceolatis hirtis alter- / nis, floribus spicatis, foliolo calycino supremo maximo.* / *Pract. Bot. de Lin. p^a. Palau t^o. 4^o. pag. 761.* / *Linaria latifolia, villosa, laciniis calycinis inae- / qualibus, flore majore pallido, striato, rictu aureo.* / *Quer Flora Española t^o. 5^o. pag. 356.* / Esta planta la tengo por Variedad de la especie / indicada, por no producir las ojas hirsutas : se usa p^a. / la *Linaria* oficial,

en Cordoba, se cria en los campos / de labor de su circuito, es annua flo. en Abril.

872. *Linaria spartea*, Hoffm. Class. XIV Didinamia ord. Gimnospermia / Anthirrinum junceum / Linn. Tom. 4.º pag. 762. / Antirrinum como Junco.

873. *Linaria spartea*, Hoffm. Tetrandria monoginia / caliz 5 fido / corola bilabiada / labio superior en dos lacinias / inferior en 3, mayores las de los lados / De los estambres 2 mas cortos unidos / todos 4 por las antheras / estigma en cabezuela / caxa redonda / Antirrinum iunce / um.

874. *Linaria spartea*, Hoffm. Anthirrinum iunceum.

875. *Linaria spartea*, Hoffm. Visto 1838 / 3º Didinamia / Anthirrinum / iunceum.

876. *Linaria vulgaris*, Mill? Anthirrinum Linifoli- / um - Mayo 23.

877. *Linaria pedunculata* (L.), Spreng. Anthirrinum / (tachado hirtum) W. / pedunculatum.

878. *Antirrhinum majus*, L. Antirrinum Majus / L.

879. *Antirrhinum majus*, L. Antirrinum maius / Umbria / 16 de Junio de 1812. [Otra etiqueta dice] : Antirrinum / maius. de la / Sierra de Segura.

880. *Antirrhinum majus*, L. Antirrhinum Mayus.

881. *Antirrhinum Orontium*, L. Anthirrinum orontium.

882. *Antirrhinum Orontium*, L. Antirrhinum orontium / Entrena. (Otra etiqueta dice) : Class. XIV Didinamia Ordo / Gimnospermia / Anthirrini species / Linn. Tom. 4.º pag. 743.

883. *Anarrhinum bellidifolium* (L.), Desf. Antirrinum Belideifo / lium. L. / Entrena.

884. *Antirrhinum*, sp. Anthirrinum sp. no. / foliis radicalibus / pinnatis / caulinis linearibus / bifidis. et simplicibus.

885. *Linaria spartea*, Hoffm. Anthirrinum / simplex / W. (tachado haclava).

886. *Antirrhinum*, sp. Antirrinum N. sp. / in maritimis. foliis / carnosis. n.º 38 Lag. / Cabrera / ?Sparteum L.

887. *Linaria micrantha* (Cav.), Spr. Antirrynum / micranthum / W.

888. *Linaria tristis*, Mill. Antirrhinum / [tachado bipunctatum] marginatum W.

889. *Antirrhinum latifolium*, DC. Anthirrinum / Latifolium W.
890. *Linaria heterophylla*, Desf. Anthirrinum / aparinoides / W.
891. *Linaria amethystea* (Brot.), Heffg. Anthirrinum / Amethystinum / W.
892. *Linaria amethystea* (Brot.), Hffg. Anthir. Amestistinum / W.
893. *Linaria latifolia*, Desf. Linaria Latifolia. W.
894. *Linaria*, sp. Linaria? 2 / 17 / Cañada roman / Abril 1812.
895. *Linaria*, sp. Linaria / 9 de Julio / cambron.
896. *Linaria*, sp. Linaria / 40 L / 9 Julio.
897. *Linaria*, sp. Linaria 42 L.
898. *Craniolaria annua*, L. Martinia annua L.
899. *Scrophularia auriculata*, L. Class XIV Didinamia Ord Gimnosper^a. / Scrophularia Aquatica / Linn. Tom. 4^o. pag^a. 782 / Escrofularia Aquatica.
900. *Scrophularia auriculata*, L. Scrofularia auriculata.
901. *Scrophularia frutescens*, L. Scrofularia / Frutescens / Cabrera. [Otra etiqueta dice] : Serofularia canina / Entrena.
902. *Scrophularia canina*, L. Scrofularia Canina L. / Entrena.
903. *Scrophularia*, sp. Scrophulariae Species.
904. *Digitalis purpurea*, L. Digitalis Purpurea L / Entrena.
905. *Digitalis obscura*, L. Digitalis / obscura / W / Crujia usase para / labar las heridas y llagas / á las bestias.
906. *Digitalis*, sp. Digitalis.
907. *Erinus tristis*, L. Erino africano ó triste.
908. *Orobanché major*, L. Orobanche maior.
909. *Phelipaea lavandulacea*, Fr. Schultz. Orobanche ramosa L. / Entrena. [Otra etiqueta dice] : Orobanche species.
910. *Ruellia paniculata*, L. Ruellia Paniculata / Lin / C in R H M.
911. *Vitex Agnus castus*, L. *Vitex* (Agnus-castus) Varietas a. / Pract. B. de Lin. p^a. Palau t^o. 4^o. 898. / *Vitex latiore folio*. T. I. R. / H. 603. F. Española. t^o. 6^o. p^a. 476. / *Vitex*. Lag. 88. C. Bahuin. / comm. Mat. sup. Diosc. p^a. 173. / Agnus Castus Officinarum. / Swert. florileg. lib. 2^o. fol. 43. / Se cria este Arbusto en las / orillas

y en Ysletas del Guadalquivir en Córdoba y se cultiva también por algunos curiosos. Crece á la altura de un Hombre y florece en el Verano.

912. *Vitex Agnus castus*, L. Class. XIV Didinamia Ordo / Angiospermia / *Vitex Agnus Castus* / Linn. Tom. 4.º pag. 898 / *Vitex Agno Casto* (vulgo) Sauzgatillo.

913. *Acanthus mollis*, L. *Acanthus Mollis* L / Entrena.

914. *Acanthus mollis*, L. *Acanthus* / mollis.

915. *Acanthus mollis*, L. *Acanthus mollis*.

Clase XV

916. *Rapistrum rugosum*, All. *Rapistrum Rugosum*. Cavan.

917. *Rapistrum Linnaeanum* Bss, Reut. *Miagramm hispanicum* / vespere lugubri.

918. *Rapistrum Linnaeanum* Bss, Reut. *Myagramm hispanicum* / Cuesta de las hermitas / 14 de Mayo de 1817.

919. *Myagramm perfoliatum*, L. *Miagramm perfoliatum*.

920. *Myagramm perfoliatum*, L. *Myagramm* / perfoliatum.

921. *Neslia paniculata* (L.), Desv. *Rapistrum paniculatum*.

922. *Neslia paniculata* (L.), Desv. *Myagramm panniculatum* / W. / *Rapistrum panniculatum* / Cabanilles.

923. *Arabis vochinensis*, Spreng. Sierra del agua / Subularia / alpina. (tachado *Biscutella apula* / W.). / Convento de S^{ta}. Agustín / al Itm^o. S^{ra}. D^{na}. Fr. José de / Jesus Muñoz, Obispo electo de / Salamanca en / Córdoba.

924. *Arabis vochinensis*, Spreng. Lo mismo q^o la anterior / A la entrada del 27 L. / Encebrico á los Malojares para / bajar á las fabricas 18 de Marzo / *Draba? ciliaris*.

925. *Draba Hispanica*, Bss. *Draba alpina* / *Draba*.

926. *Erophila verna* (L.), Wk. *Draba verna* W. / petalis bifidis stigmatibus sessilibus / foliis oblongis, acuminatis / subserratis subsessilibus scapo nudo / fuente de la loba. / 30 Marzo.

927. *Draba Loiseleurii*, Boiss. *Draba* / cespitosa / apestañosa.

928. *Draba incana*, L. *Draba contorta* / Decandolle.

929. *Hutchinsia petraea* (L.), R.Br. *Lepidium petreum* W. / foliis pinnatis radicalibus / ovato lanceolatis caulinis / linearibus. 29 Marzo.

930. *Lepidium*, sp. *Tetradinamia Siliculosa*. / G. / *Lepidium*.
931. *Lepidium latifolium*, L. *Lepidium Latifolium*.
932. *Lepidium suffruticosum*, L. *Lepidium / suffruticosum / dos variedades ?*
933. *Thlaspi arvense*, L. *Thlaspi (arvense) siliculis orbiculatis, / foliis oblongis dentatis glabris.* Pract.B. / de Lin.p^r.Palau tom.5^o.pag.37. / *Thlaspi arvense, siliquis latis.* / T.Inst.R.H.212. F.Esp.tom.6^o.371. / *Thlaspi latius.* Dod.pempt.712. / *Thlaspi iij.* C.Bauhin.comment. / *Matthiol.sup.Diosc.pag.427.* / Esta planta se cria en España, / y en Cordoba se cultiva en el Jardin de / la Alameda, y tambien yo la he cul- / tivo, y remitido semilla de ella al / Jardin Botanico de Sevilla.Es annua / y florece en Abril y Mayo.
934. *Lepidium campestre* (L.), R.Br. *Thlaspi campestre / Caban.*
935. *Thlaspi perfoliatum*, L. *Thlaspi perfoliatum / W.*
936. *Capsella Bursa-pastoris*, Moench. *Thlaspi -bursa pastoris W.* / *foliis radicalibus pinnati- / fidis.* Siles.28 de Marzo.
937. *Capsella Bursa-pastoris*, Moench. *Thlaspi vursa pastoris.*
938. *Thlaspi*, sp. *Thlaspi de fruto con hastitas.*
939. *Cochlearia officinalis*, L. *Cochlearia (Officinalis) foliis radicalibus cordato-subrotundis, cau- / linis oblongis subsinuatis.* Pract.Bot.de Lin.p^r.Palau t^o 5^o.pag.44 / *Cochlearia folio subrotundo.* T.I.R.H.215.F. Esp. t^o 4^o. 372. / *Casp.Bauhin.com.Math. sup.Diosc.380. = Cochlearia.* Dod.p.594. / Esta planta se cultiva en Cordoba en varias partes ; yo la / he cultivado muchos años ; se cria en España en los montes Py- / reneos de Cataluña, en los de Jaca, y de Vizcaya. Quer. / es annua y algunas vezes se hace perenne, florece en los / meses de Marzo y Abril.
940. *Cochlearia officinalis*, L. *Class. Decima quinta. Tetra / dinamia Ordo Siliculosa / Cochlearia Officinalis / Linn.p^r.Pal. tom.5^o.pag^a. / 44. Cochlearia ofical / Este esqueleto lo obtube / del jardin del Padre Mro, q^o / la cultiva como tambien en / el de Casa ; se usa en la me- / dicina p^a varias enfermedades pero / donde especialm^{te}. se desem- / bren sus propiedades es en / el Alcohol llamado de su nom- / bre, pues q^o. este es el anti-es- / corbutico mas poderoso de los q^o. / [Reverso] : se componen de ella.*

941. *Cochlearia Armoracia*, L. *Cochlearia* (*Armoracia*) *foliis radicalibus lanceo / latis crenatis, caulinis incis. P.B de L.p^o.P. t^o.5^o.47. / Cochlearia folio cubitali. T.Inst.R.H.215. / Quer Flora Española t^o.4^o.pag379. / Raphanus magnus. Dod.pempt 678. / Raphanus rusticanus sive vulgaris. C.B. / comm. Matth. sup. Diosc. 350. / Se cria en varias p^o.de España : vease á Q^r. / se cultiba en Cordoba en mi Jardin y otras p^o.remi- / ti en 1794 una planta viva al Botanico de Sevilla / es perenne su raiz rastrera, y f^o.en Mayo y Junio.*

942. *Cochlearia*, sp. *Tetradinamia Siliculosa* / G. / *Cochlearia*.

943. *Lepidium Draba*, L. *Cochlearia Draba* W / Siles.28 de Marzo.

944. *Lepidium Draba*, L. *Cochlearia* / como *Draba* / Mad^d. y Mayo 5 de 18.

945. *Camelina sylvestris*, Wallr. *Cochlearia sativa* / mayo vespere fonti / Viznagar.

946. *Iberis semperflorens*, L. *Iberis semperflorens*.

947. *Iberis semperflorens*, L. *Classis Decima quinta Tetradinamia Ordo / Siliculose / Yberis Semper-florens / Linneo p^o. Palau t^o.5^o.p^o.49. / Yberide siempre en flor (bulgo) / Carraspique - en Cordoba mi- / rabeles de flor. / Yberis semper-florens / Cabanilles Descriptio plantar. / pag^a 414 plant.937. = Este sabio / y Benemerito Botanico, apre- / ciado no solo de su Nacion si- / no de todas las que lo han / conocido ha colocado toda / esta Clase en su Hexan- / dria sin hacer caso / de la diferencia de Estambres / Se cultiva en Cordova / en muchos jardines p^o. la mul- / tiplicidad de sus flores y su / perpetua verdura.*

948. *Iberis subvelutina*, DC. *Iberis Sempervi- / rens. / Gibraltarica?*

949. *Iberis subvelutina*, DC. *Iberis sempervirens, / W. / Varietas γ.*

950. *Iberidella rotundifolia*, Hook. *Iberis de oja / redonda.*

951. *Iberis saxatilis*, L. *Iberis / saxatilis / W.*

952. *Iberis saxatilis*, L. *Dos Iberis / la 1^a. Saxatilis.*

953. *Iberis umbellata*, L. *Iberis umbellata Cav^a.*

954. *Iberis linifolia*, L. *Iberis (tachado saxatilis) linifolia W.*

955. *Iberis linifolia*, L. *Iberis linifolia / W.*

956. *Iberis pinnata*, Gou. *Iberis Thlapsi.*

957. *Iberis ciliata*, All. *Ibris ciliata* W.
 958. *Iberis ciliata*, All. *Iberis ciliata*.
 959. *Iberis pinnata*, Gou. *Iberis pinnada*.
 960. *Ptilotrichium spinosum* (L.) Bss. *Alisum / spinosum*.
 961. *Alyssum saxatile*, L. *Alyssum Saxatile* W.
 962. *Alysum incanum*, L. *Alisum Incanum*.
 963. *Alysum incanum*, L. *Alisum / incanum*.
 964. *Alyssum calycinum*, L. *Alisum / calycinum / W*.
 965. *Alyssum montanum*, L. *Aliso montano*.
 966. *Alyssum campestre*, L. *Alysum campestris* L.
 967. *Vesicaria sinuata* (L.) Poir. *Alyssum sinuatum / W*.
 968. *Vesicaria sinuata* (L.) Poir. *Alyssum sinuatum / W*.
 969. *Vesicaria utriculata*, DC. *Vesicaria utriculata*, Decand.
 / *Alyssum utriculatum* L / C in R H M.
 970. *Alyssum serpyllifolium*, Desf. *Alisum / serpyllifolium / W*.
 971. *Alyssum Atlanticum*, Desf. *Alysum / Atlanticum* W.
 [tachado maritimum]
 972. *Clypeola Johnthaspi*, L. *Clypeola Jonthaspi*. W / 20
 de Marzo Siles.
 973. *Lobularia maritima* (L.) Desv. *Clypeola (Maritima) perennis*, / *siliculis bilocularibus ovatis dis-* / *permis.P.Bot.de Lin.*
p^r.P.t^o.5^o.66. / *Alysson maritimum.T.Inst. / R.Herv.217.Fl.Esp.*
t^o.2^o.pag.277. / *Thlaspi Cemtunculi angusto fo-* / *lio.Lobel.Icon.*
 215. / *Esta especie se cria en los Mu-* / *ros viejos,y Muralla de la*
Mari- / *na de Barcelona, y en otros lugares / de ambos Mares, y*
tambien en l^a. / *laderas del Piul de Ribas, y en la / Marina de*
Ayamonte, en Andalu- / *cia entre las piedras. Quer. / Coji este*
esqueleto en el J^a. de S^a.
 974. *Lobularia maritima* (L.) Desv. *Clipeola maritima*.
 975. *Biscutella auriculata*, L. *Biscutela auriculata / W*.
 976. *Biscutella auriculata*, L. *Biscutela Auriculata*. [Sin
 etiqueta].
 977. *Biscutella auriculata*, L. *Biscutella (auriculata) calycibus* / *nectario untrinque gibbis,silicu-* / *lis in stylum coeuntibus.*
Pract.B. / de Lin.p^r.Palau t^o.5^o.pag.70 / Thlaspidium hirtum,
calyce / floris auriculato.T.Inst.R.H. / 214.Flora Española t^o.
 6^o.p.374. / *Esta planta se cria en much^a.* / *partes del circuito de*
Cordoba en / tierras de labor, como en las im- / *mediatas al caño*

Bezan, en las / que median entre la Victoria y / la Alameda y otras. Es yerba / anual y florece en Abril

978. *Biscutella microcarpa*, DC. Biscutela / lirata W.
979. *Biscutella laevigata*, L. Biscutela levigata [tachado Thaderiana] / [tachado sp.nova]. W. / nisi sit varietas laevigatae.
980. *Lepidium campestre* (L.) R.Br. Tlaspi. campestre. [Sin etiqueta].
981. *Lunaria biennis*, Munch. Lunaria / annua W. / cultivada.
982. *Cakile maritima* (L.) Scop. Binunias Kakile / Cabrera.
983. *Crambe Hispanica*, L. Crambe hispanica / W.
984. *Cardamine hirsuta*, L. Cardamine hirsuta.
985. *Roripa amphibia* (L.) Bess. Nasturtium / Aquaticum / Vulgo berros / Cabrera. (Otra etiqueta dice) : Merece observarse / esta planta conocida / con el nombre de Berraza / en Cordoba.
986. *Sisymbrium polyceratium*, L. Sisimbrium Polyceratum. Cav.
987. *Diplotaxis catholica* (L.) DC. Sisymbrium catholicum.
988. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. Erisimo / o/cinale.
989. *Barbarea praecox* (Sm.) R.Br. Erisimum praecox / W.
990. *Sisymbrium officinale* (L.). Scop. Class.XV Tetradinamia / Erisimum vulgare.
991. *Erysimum hieracifolium*, L. Erisimum hieracifolium. W. / 15 / tetradinamia.
992. *Erysimum ochroleucum*, DC. Cheiranto / alpino.
993. *Cheiranthus Cheiri*, L. *Cheiranthus* (Cheiri) foliis lanceolatis / acutis glabris, ramis angulatis, caule fru- / ticoso. Pract. B.de Lin.p^o.Palau.t^o.5^o pag.122. / *Leucoium* luteum vulgare. T.Inst. / R.H.221. Flora Española tom.5^o.pag.329. / *Leucoium* luteum.Dod.pempt.160. / *Leucoium*.Lag.in Diosc.352. / *Leucoium* aureum.C.Bauhin.com. / Matthiol.sup.Diosc.632. / vulgo : Aleli pajizo ó amarillo. / Esta planta se cria en las peñas de / la costa del mar, y en los muros de Cata- / luña. Se cultiva en los Jardines, y casas / particulares de Cordoba : es perenne y flo- / rece por Abril y Mayo : crece de tres á qu- / atro pies : suele variar con la flor doble.
994. *Malcomia chia*, DC. Cheiranthus Chius.
995. *Matthiola incana* (L.) R.Br. Class.XV Tetradinamia Ord Siliquosa / Cheyranthus Incanus / Linn.tom.5^o.pag^a.125. / Cheiranto Blanquecino (vulgo) Alheli.

996. *Mathiola tristis* (L.) R.Br. Cheiranthus / tristis.
 997. *Matthiola tristis* (L.) R.Br. Cheiranthus tristis.
 998. *Erysimum linifolium* (P.) J.Gray. (tachado Dentaria?)
 L.2°. / Es un Cheiranthus / Erisimum angustifolium / W. / 9
 de Julio / Cambron.
 999. *Malcomia contortuplicata*, Boiss. Cheirantus contortuplicatus / W.
 1000. *Hesperis aprica*, Poir. Hesperis Cheyrantus Sp.N. /
 Cabrera. [Falta el ejemplar].
 1001. *Stenophragma Thalianum* (L.) Cel. Arabis thaliana
 Cav°. / Apesar de no tener mas / que 4 estambres y no / indicar-
 se la anomalia en Lineo / me parece es esta especie.
 1002. *Arabis bellidifolia*, Jacq. Arabis con oja / de margarita.
 1003. *Turritis glabra*, L. Turritis glabra.
 1004. *Arabis hirsuta*, Scop. Turritis alpina.
 1005. *Turritis*, sp. Turritis / species nova.
 1006. *Moricandia arvensis* (L.), DC. Brassica Arvensis, L.
 1007. *Moricandia arvensis* (L.), DC. Brasica Arvensis.
 1008. *Moricandia arvensis* (L.), DC. 16.H. / Brasica arven-
 sis / Lin. / cheirantus amplexi- / caulis Lag.
 1009. *Conringia alpina*, Link. Brasica alpina.
 1010. *Brassica pinnatifida*, Desf. Brassica Pinatifida W. /
 [tachado] :Eruca Grandiflora Cav° / Brassica Eruca L.
 1011. *Brassica pinnatifida*, Desf. Brasica / pinnatifida / W.
 1012. *Sinapis arvensis*, L. Sinapis Arvensis.L.
 1013. *Sinapis arvensis*, L. *Sinapis* (arvensis) siliquis mul-
 tangulis torroso-turgi / dis rostro ancipite longioribus.P.B.de L.
 p°.P.t°.5°.pag.158. / *Raphanistrum* segetum, flore luteo, vel pali-
 lido.T. / Inst.R.Herb. 230.Flora Española t°.6°.pag.178. / Esta
 especie se cria en las margenes de las tierras de / labor del cir-
 cuito de Cordoba. / Es annua y florece en los meses de Abril y
 Ma- / yo, la llaman vulgarmente como á las demas Xara- / mago.
 1014. *Sinapis alba*, L. Sinapis alba / W.
 1015. *Diplotaxis erucoides* (L.), DC. Sinapis erucoides.
 1016. *Diplotaxis erucoides* (L.), DC. Sina pis erucoides.
 1017. *Erucastrum Baeticum* (Bss.) Lge. Sinapis hispanica.
 1018. *Erucastrum Baeticum* (Bss.) Lge. Sinapis Hispanica.L.
 1019. *Brassica fruticulosa*, Cyr. Sinapis radicata / W. / an
 virgata Cavanilles?

1020. *Brassica oleracea*, L. Raphanus / erucoides.
1021. *Gynandropsis pentaphylla*, DC. Tetradymania. Siliquosa. / G. / Cleome. / *Cleome* (Pentaphylla) floribus gynandris, foliis quinatis, caule intermixto. P. B. de Lin. p. Pal. t.º 5.º. 169. / Habita en las Indias. Pal. loc. cit. / Es planta annua. / Vi esta especie cultivada en el Jardín Botánico de Sevilla en Septiembre de mil setecientos noventa y tres; donde coxi este esqueleto.
1022. *Cleome violacea*, L. Cleome violacea L / Entrena.
1023. *Cleome violacea*, L. Cleome violacea / W.
1024. *Cleome violacea*, L. Cleome Violacea / Lin Cabrera.
1025. *Cleome violacea*, L. Clasis Decima-quarta, Ordo Siliquosa / Cleome Violacea / Linneo p.º. Palau t.º. 5.º. / p.º. 175 Cleome violada se cogio en la Sierra de Cordova / en Ju.º. de 1817 Linneo la circunscribe a Portugal.

Clase XVI

1026. *Pelargonium capitatum*, Soland. Pelargonium Capitatum / Cav. / Entrena.
1027. *Pelargonium odoratissimum*, Soland. Geranium odoratissimum.
1028. *Pelargonium odoratissimum*, Soland, Class XVI Monadelphia Oro / Decandria / Geranium Odoratissimum / Linn Tom. 5.º. Pag.º. 215 / Geranio muy oloroso.
1029. *Erodium cicutarium* (L.) Hérit. Geranium / cicutarium.
1030. *Erodium cicutarium* (L.) Hérit. Erodium / Cicutarium W.
1031. *Erodium malacoides*, Willd. Geranium Malacoides.
1032. *Geranium Pyrenaicum*, L. Geranium Pyrenaicum L. / var.º flore albo. / C in R H M.
1033. *Geranium tuberosum*, L. Geranium (tachado Columbinum) / W. / tuberosum.
1034. *Geranium Robertianum*, L. Geranium robertianum / W.
1035. *Geranium Robertianum*, L. Class. Decima-sexta Monadelphia Ordo / Decandria / Geranium Robertia / num = Linneo p.º. Palau / t.º. V.º. p.º. 235 = Geranio / de Rovertó. / Se cria entre los empedrados y paredes / de Cordova y en toda su campiña;

este / Esqueleto lo cogi en / S^a.Agustin. / Virtudes / Es planta anodina / expelente vulneraria / y q^o. retira la leche &^a.

1036. *Geranium Robertianum*, L. *Geranium* (*Robertianum*) pedunculis bifloris / calycibus pilosis decemangulatis. Pract. Bot. de / Lin. p^r Pal. t^o. 5^o pag. 235. / *Geranium* *Robertianum* primum. T. Inst. / R. H. 268. Quer Flora Esp^a. t^o. 5^o pag. 158. / *Geranium* primum. Lag. 347. = IV. C. B. com. 622, / Se cria en Cordoba en Bosques húmedos de la sierra / y se halla en el arroyo Pedroches : es annua f^o. en Abril.

1037. *Geranium maculatum*, L. Geranio mancha- / do.

1038. *Geranium lucidum*, L. *Geranium* *lucidum*.

1039. *Geranium lucidum*, L. *Geranium* *lucidum* / pulcra varietas / colore purpureo totius plantae.

1040. *Geranium molle*, L. *Geranium* *lucidum* / W.

1041. *Geranium molle*, L. *Geranium* Mole.

1042. *Geranium molle*, L. *Geranium* *molle* / W.

1043. *Geranium Carolinianum*, L. *Geranium* / *Carolinianum* / W.

1044. *Erodium cicutarium*, Hérit. *Erodium* / *praecox*.

1045. *Geranium aconitifolium*, Hérit. *Geranium* / *Aconitifolium* / (tachado silvaticum) / W.

1046. *Geranium*, sp. *Geranium* sp. [Sin etiqueta].

1047. *Geranium*, sp. *Geranii* species. [Sin etiqueta].

1048. *Abutilon Avicennae*, Gaertn. *Sida* (*Abutilon*) foliis subro- / tundo-cordatis indivisis, pedun- / culis folio brevioribus, capsulis / multilocularibus, corniculis bi- / fidis. Lin. Sp. P. p^r. p^a. t^o. 5^o. 264. / *Abutilon*. Dod. pempt. 656. et / Tourn. Inst. R. Herb. 99. Flora España- / la tomo 2^o. p^a. 152. / Esta planta habita en las Indias, / en Suecia y Siberia. L. es annual, flore- / ce por Julio y Agosto. / En Cordoba la he cultivado yo : produ- / ce el tallo sencillo y crece á la altura de / tres ó quatro pies.

1049. *Gaya Calyptrata*, H. B. *Sida* *disticha* Cav. / C in R H M.

1050. *Anoda lavateroides*, Medic. *Sida* *Dilleniana* W. / *Anoda* *Dilleniana* Caban.

1051. *Althaea officinalis*, L. *Althea* *Officinalis*.

1052. *Althaea cannabina*, L. *Althaea* *Cannabina*.

1053. *Althaea cannabina*, L. *Althaeæa* *Cannabina*.

1054. *Althaea hirsuta*, L. *Althea* *hirsuta* / W.

1055. *Althaea hirsuta*, L. *Aalthaea hirsuta* / W.
1056. *Althaea hirsuta*, L. *Althaea* / de oja aspera.
1057. *Althaea rosea*, L. *Alcea* (Rosea) foliis sinuato-an- / gu-
 losis. Pract. B. de L. p. P. t. 5.º. 273. / *Malva rosea*, folio subrotun- /
 do. T. I. R. H. 94. F. E. t. 5.º. p. 395. / *Malva hortensis*. Dod. pempt. /
 652. / *Malva Rosea* flore pleno. C. / B. commet. Mat. sup. Diosc. p.º.
 359. / *Malva Rosea duplex purpurea*. / Swert. et Rosa malvea ejus-
 dem. flo- / rileg. lib. 2.º. fol. 36. / Estas dos que pone por especi- /
 es distintas Swertio, y el Synonimo / precedente pertenecen á las
 Varie- / dades de esta especie, cuyo numero / es mui crecido. En
 Cordoba se cul- / tiban en los Jardines, y casas par- / ticulares
 hasta diez ó doze dellas / por su asombrosa plenitud, y rara /
 belleza de coloridos, pues las hai / de color de fuego, carmesies, blan-
 cas, / color de Rosa, pajizas, Anteadas, / Jaspeadas de carmesi y
 blanco, de / color de cobre sumamente oscuras / que parecen casi
 negras, y de to- / dos estos colores en diversas gradu-aciones. Son
 sus Raices pe- / rennes, florecen por Mayo, Ju- / nio, y Julio, crecen
 hasta tres / varas de alto: las llaman Vulgar- / mente *Malvaslocas*.
1058. *Malvastrum spicatum*, A. Gray. *Malva Spicata* L. /
 C in R H M.
1059. *Malva silvestris*, L. *Malva silvestre*.
1060. *Malva Hispanica*, L. *Malva Hispanica*. C.
1061. *Malva Hispanica*, L. *Malva hispanica*.
1062. *Malva Hispanica*, L. *Malva Hispanica* / Entrena.
1063. *Malva*, sp. *Malvae species*.
1064. *Lavatera arborea*, L. ? *Lavatera Arvorecens* / *Malva*
arborea.
1065. *Lavatera Olbia*, L. *Lavatera olbia* / Cabrera.
1066. *Lavatera trimestris*, L. *Lavatera trimestris*.
1067. *Lavatera trimestris*, L. *Lavatera trimestris*. variet. L.
1068. *Lavatera trimestris*, L. Class. XVI Monadelphia Ord.
 Poliandria / *Lavatera Trimestris* / Linn. Tom. 5.º. pag. 293 /
Lavatera Tremesina.
1069. *Anoda hastata*, Cav. *Anoda acerifolia*. cav.º.
1070. *Hibiscus syriacus*, L. *Hibiscus siriacus* (cavan.º).
1071. *Hibiscus syriacus*, L. *Hibiscus* (Syriacus) foliis cune- /
 iformi-ovatis superne inciso-ser- / ratis, caule arboreo. Pract. Bot- /
 / de Lin. p.º. Palau t.º. 5.º. pag. 309. / *Ketmia Syrorum* quibus- / dam.
 T. I. R. H. 99. F. E. t. 5.º. 291. / Habita en Syria y Carniola. P. / Cre-

ce como arbol, se culti- / ba en varias partes de España : / lo vi en 1793 en el Jardin de S^a. / Francisco casa grande de Sevilla / en donde coxi este esqueleto. / florece en Agosto y Septiembre.

1072. *Hibiscus Trionum*, L. *Hibiscus* (Trionum) foliis tri- / parti- / tis incisus, calycibus inflatis. Pract. / Bot. de Lin. p^o. Palau t^o. 5^o. pag. 318. / *Ketmia vesicaria*, vulgaris. T. / Inst. R. H. 101. Flora Esp. t^o. 5^o. 290. / *Alcea vesicaria*. C. B. P. 317 / Dod. pempt. 657. / *Hypocoum*. Casp. Bauhin. / com. Mat. sup. Diosc. 749. Lag. 416. / Se cria esta planta en España / cerca de Barcelona, en el sitio que / llaman la Granota. Quer. / Crece de pie y medio : florece en / Mayo y Junio. es annua / Traxe este esqueleto de Sevilla / año de 1793

Clase XVII

1073. *Sarcocapnos enneaphylla*, DC. Diadelphia. Hexandria. / G. / Fumaria. / Fumaria. Enneaphylla.

1074. *Fumaria officinalis*, L. Fumaria officinalis. L.

1075. *Fumaria officinalis*, L. Fumaria officinalis.

1076. *Fumaria capreolata*. L. Fumaria Capreolata W.

1077. *Fumaria spicata*, L. (Spicata pericarpis mo- / nospermis spicatis, caule erecto, foliolis / filiformibus. Pract. Bot. de Lin. por / Palau t^o. 5^o. pag. 354. / Fumaria minor, tenuifolia, cauliculis surectis, flore hilari purpu- / ra rubente. T. I. R. H. 422. Flora Es- / pañola t^o. 5^o. pag. 137. / Se cria esta planta en las mar- / genes de los campos de labor del cir- / cuito de Cordoba : es an- / nua y flo- / rece en los meses de Abril y Mayo.

1.078. *Fumaria spicata*, L. Fumaria Spicata. L.

1079. *Fumaria parviflora*, Lam. Fumaria Parviflora. W. / F. spicata varietas L.

1080. *Sarcocapnos crassifolia*, DC. Fumaria / (tachado longifolia) / Grassifolia.

1081. *Sarcocapnos crassifolia*, DC. Fumaria / crassifolia W. / Castillo de Segura / en las rocas 3 de Abril.

1082. *Fumaria*, sp. Fumaria specie Nova?

1083. *Polygala depressa*, Wend. Polygala amara (tachado lupulina) / W. / (varietas flore coeruleo. tachado).

1084. *Polygala depressa*, Wend. Polygala amarga.

1085. *Polygala vulgaris*, L. 3 / Polygala vulgaris / 17. H.

1086. *Polygala vulgaris*, L. *Polygala vulgaris* (tachado monspeliaca) / W.
1087. *Polygala depressa*, Wend. *Polygala* (tachado Senega? *vulgaris*) / Casas de la Noguera / 16 de Junio 1812. / *Polygala amara* / segun la Gasca.
1088. *Polygala vulgaris*, L. *Polygala vulgaris*.L.
1089. *Polygala Monspeliaca*, L. *Polygala monspeliaca* / W.
1090. *Polygala Monspeliaca*, L. *Poligala* de Montpellier.
1091. *Polygala Monspeliaca*, L. *Poligala*? / *Monspelia* / de Lagasca / C. de Amo. 21 de Julio.
1092. *Polygala Boissieri*, Coss. *Polygala maior* / W.
1093. *Polygala Boissieri*, Coss. *Polygala rosea* / W.
1094. *Polygala*, sp. nov. Lag. *Polygala extraxilaris*. / Sp. nova. de Lagasca.
1095. *Polygala*, sp. nov. Lag. *Polygala* / *extraxilaris* / Lagasca.
1096. *Polygala*, sp. *Poligala*.
1097. *Spartium junceum*, L. *Spartium Junceum*.
1098. *Genista Scorpius*, DC. *Spartium* / (tachado horridum) / W / *Scorpius*?
1099. *Genista Broteri*, Poir. *Spartium* / *angulatum*.
1100. *Cytisus patens*, L. *Spartium Patens*.L.
1101. *Sarothamnus scoparius*, Koch. *Spartium* / *Scoparium* / W.
1102. *Sarothamnus scoparius*, Koch. *Spartium* / *Scoparium* / Cabrera.
1103. *Genista Scorpius*, DC. *Spartium spinosum*.
1104. *Spartium*, sp. *Spartium*? (Otra etiqueta dice) : 10 *Spartium*.H.
1105. *Spartium*, sp. 49.C. / *Spartium* / vide.Desf.
1106. *Pterospartum lasianthum*, Spach. *Genista tridentata* L.
1107. *Genista tinctoria*, L. *Genista* / *tinctoria*.
1108. *Genista tinctoria*, L. *Genista tinctoria*.
1109. *Genista tinctoria*, L. *Genista* / *tinctoria* / W.
1110. *Genista tinctoria*, L. *Genista Tinctoria* / Palau t.5.p. 406. [Otra etiqueta dice] : *Genista florida*.L. / Entrena.
1111. *Genista Hispanica*, L. *Atoliaga Genista* / *hispanica*? / cada flor tiene 3 bracteas / que parecen formar un caliz / exterior / antes me parecio / *Spartium spinosum*.

1112. *Genista Lusitanica*, L. *Genista lusitanica*.
1113. *Genista Lusitanica* L. *Genista lusitanica?* / W.
1114. *Genista Lusitanica*, L. *Genista lusitanica* / parvo flore Luteo / T.643. / Clase 22. / Seccion primera.
1115. *Sarothamnus*, sp. *Sarothamnus*.
1116. *Ulex europaeus*, L. *Ulex europaeus* / vulgo Aulaga.
1117. *Amorpha fruticosa*, L. *Amorpha fruticosa*.
1118. *Amorpha fruticosa*, L. Clas.XVII Diadelphia ord Decandria / *Amorpha Fruticosa* / Linneo. Tomo V Pag°.427 / *Amorpha Fruticosa*.
1119. *Ononis repens*, L. *Ononis?* 45.H. / *repens* / Peña del Cambron 9 Julio / en Siles. (Otra etiqueta dice) :*Ononis Repens* L. / Entrena.
1120. *Ononis pubescens*, L. *Ononis Pubescens*.L.
1121. *Ononis pubescens*, L. *Ononis* / *pubescens* / W.
1122. *Ononis pubescens*, L. 49 / L. / *Ononis pubescens?* (Otra etiqueta dice) : *Ononis Cenisia?* / Entrena / La *pubescens* es vellosa.
1123. *Ononis viscosa*, L. *Ononis viscosa* Cabrera.
1124. *Ononis Aragonensis*, Ass. *Ononis aragonensis* / W.
1125. *Ononis Aragonensis*, Ass. *Ononis aragonensis* / W.
1126. *Ononis Columnnae*, All *Ononis Capitata* W? / Como no lo tengo á la Vt°.dudo / si sera esa especie ú otra cercana. / Observe Vmd en un exemplar / q° va en fruto el torcido casi espiral / de la Legumbre : todas las señales / me parecen de *Ononis* : es planta / rarísima y se parece á una determi / nada con este nombre aunque no se la / flor de q° color era.
1127. *Ononis compressa*, Lag. Muy Rara / *Ononis compressa*.Cav°.
1128. *Ononis*, sp. *Ononis*.
1129. *Physanthyllis tetraphylla*, Bess. *Anthyllis* (*Tetraphylla*) herbacea,foliis quaterno-pinna- / tis floribus lateralibus.Pract. Bot. de Lin.p°.Palau t°.5°.458. / *Vulneraria pentaphyllos*.T.Inst. R.Herb.391. / Quer Flora Española t°.6°.pag497. / Esta planta se cria en terrenos aridos e incultos / cerca de Cordoba, en los paredones del arroyo del moro ca- / mino de la Arruzafa, y camino de la Alameda endere- / cho de la Huerta Balladares &c. Es annua, crece ten- / dida, y florece en Abril y Mayo.
1130. *Physanthyllis tetraphylla*, Bss. *Anthyllis tetraphylla*.

1131. *Physanthyllis tetraphylla*, Bss. Anthillis tetrafilia / Cabrera.
1132. *Anthyllis Vulneraria*, L. Anthillis / vulneraria / Cabrera.
1133. *Anthyllis Vulneraria*, L. Anthillis / vulneraria / W.
1134. *Anthyllis montana*, L. Anthillis montana / W.
1135. *Anthyllis montana*, L. Anthillis montana / 43 C. / Cambron / 9 de Julio. (Tachado Hedisarum coronarium).
1136. *Cornicina lotoides*, Bss. Anthyllis Lotoides.
1137. *Anthyllis Barba Jovis*, L. *Anthyllis* (Barba-Jobis) fruticosa, / foliis pinnatis aequalibus tomento- / sis, floribus capitatis. Pract. Bot. / de Lin. p^r. Palau t^o. 5^o. pag. 463. / Habita en las peñas de Italia, de Oriente y de España. Pal. / Es perenne: Arbusto que crece á la altura de un hombre / poco mas ó menos, muy bonito, / como lo vi en el Jardín Botánico de Sevilla, en 1793. de donde / traxo este esqueleto.
1138. *Erinacea pungens*, Bss. Anthillis / erinacea.
1139. *Lupinus angustifolius*, L. Lupinus Angustifolius.
1140. *Dolichos Lablab*, L. Class. Decima septima Diadelphia Ord. Decandria = / ? An Dolichos Lablab / Linn. por Pal. tom. 5^o pag^a 483 / Dolico Lablab o Fasel de exipto p^r. / Tournefort. / Esta planta se cultiva en cordo / va en casi todos los jardines con / el nombre de enredo de Francia y forman con ella vistosos / cenadores; este Esqueleto lo tu- / be del guerto de Casa.
1141. *Pisum sativum*, L. ¿Pisum (tachado Arvense) W. / P. Sativum.
1142. *Pisum arvense*, L. Pisum arvense.
1143. *Lathyrus Aphaca*, L. Lathirus / Aphaca / W / Cistus.
1144. *Lathyrus Cicera*, L. Lathirus cicera.
1145. *Lathyrus Cicera*, L. Lathirus Cicera. W. (Otra etiqueta dice): p^a el herba / rio de Vmd. (Otra etiqueta): Cistus argenteus / W.
1146. *Lathyrus Cicera*, L. Lathirus / Cicera / W.
1147. *Lathyrus angulatus*, L. Lathirus angulatus / W.
1148. *Lathyrus odoratus*, L. Classis Decima septima Diadelphia / Ordo Decandria / Lathirus Odoratus? / Linn. por P. Tom. 5. pag^a. 52. / Lathiro Oloroso / (vulgo) / Guisante doble / o Caracolas. / Se cultiva en casi / todos los jardines p^r. / sus ermosas

flores, / y su tallo voluble pro- / porcionado para for / mar Cenadores.

1149. *Lathyrus odoratus*, L. *Lathyrus* (Odoratus) pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, / foliolis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. Pract. Botanic. / de Lin. p.º Palau tom. 5.º pag. 520. / Esta planta se cultiva en Cordoba en los Jardines / y casas particulares ; con el nombre de *Caracolas* : es / yerba anual, y florece en los meses de Mayo y Ju- / nio.

1150 *Lathyrus Tingitanus*, L. *Lathyrus tingitanus*, L.

1151. *Lathyrus Clymemum*, L. *Lathyrus* / *clymenum* / W.

1152. *Lathyrus pratensis*, L. *Lathyrus pratensis* / *Lathyrus* / 13-I / Cº 17.

1153. *Lathyrus latifolius*, L. *Lathyrus* / *latifolius* / W.

1154. *Lathyrus setifolius*, L. *Lathyrus* (tachado cicera) / *setifolius* / Cº 17.

1155. *Lathyrus*, sp. *Lathyrus*.

1156. *Lathyrus*, sp. *Lathyrus*.

1157 *Vicia Cracca*, L. *Vicia Cracca* / W.

1158. *Vicia Cracca*, L. *Vicia Cracca*.

1159. *Vicia onobrychioides*, L. *Vicia* como *Onobrychis* / o *Lathyrus* de pelo aspero.

1160. *Vicia onobrychioides*, L. *Vicia onobrychioides* [tachado *onobrychioides* W] / an / ¿An [tachado *tenuifolia*?]

1161. *Vicia onobrychioides*, L. *Vicia* como / *onobrychis*.

1162. *Vicia Nissoliana*, L. *Vicia Nissoliana*. L.

1163. *Vicia Nissoliana*, L. *Vicia Biennis* L? / *V. Nissoliana* L. ?

1164. *Vicia sativa*, L. *Vicia Sativa*. L.

1165. *Vicia sativa*, L. *Vicia Sativa* / W.

1166. *Vicia sativa*, L. *Vicia sativa*.

1167. *Vicia lutea*, L. *Vicia Lutea*. L.

1168. *Vicia lutea*. L. *Vicia Lutea* L / Entrena. (Otra etiqueta dice) : [tachado *Orobus vernus*?] 44 / C.. / *Lathyrus* / *Vicia* sp.n.

1169. *Vicia hybrida*, L. *Vicia Híbrida*, L.

1170. *Vicia peregrina*, L. *Vicia Peregrina*. L.

1171. *Vicia Bithynica*, L. *Vicia bithynica* / W.

1172. *Vicia Narbonensis*, L. *Vicia narbonensis*. L.

1173. *Vicia villosa*, Rth. *Vicia* [tachado Pisiforme]. W. / villosa.

1174. *Lens esculenta*, Moench. ¿Ervum Lens. / la he cojido en un pe / dazo de tierra sembrado / todo de esto.

1175. *Cytisus austriacus*, L. *Citisus austriacus* / W.

1176. *Argyrolobium argenteum*, Wk. *Citisus* / argenteus / W.

1177. *Argyrolobium argenteum*, Wk. *Citisus argenteus* / Palau.t.5.pag.554. / 52 L.

1178. *Argyrolobium argenteum*, Wk. *Citisus argenteus*.

1179. *Argyrolobium argenteum*, Wk. *Citisus argenteus*.

1180. *Cytisus*, sp. 13 *Cytisus*? H.

1181. *Colutea arborescens*, L. *Colutea* (*Arborescens*) arborea, foliolis / obcordatis. P. B. de L. p^r. P. tom. 5^o. pag. 564. / *Colutea vesicaria*. T. Inst. R. H. / 649. Flora Española tom. 4^o. pag. 398. / *Colutea*. Dod. pempt. 784. Casp. / Bauhin. com. Mat. sup. Diosc. pag. 572. / Lagun. in Diosc. pag. 419. / vulgo: Espantalobos. / Se cria este Arbolito en Cordoba / en los arroyos de los Lagares de Sierra / morena, y cerca de la Ciudad se halla / en el arroyo de Pedroches, y en el de la / Palomera. Crece mui poblado de ra- / mas de seis á siete pies, se cubre de flo- / res amarillas en la Prima- vera con abund. (Reverso): *No es la Colutea* / *Coronilla Glauca* L. / Entrena. C 17.

1182. *Colutea arborescens*, L. *Colutea arborescens*.

1183. *Colutea arborescens*, L. Class XVII Diadelphia ord. Decandria / *Colutea Arborescens* - / Linn. Tomo V pag^a. 564. / *Colutea Arborescente* / (vulgo) espanta Lobos.

1184. *Coronilla juncea*, L. *Coronilla* (*Juncea*) fruticosa, foliis qui- / natis ternatisque, lineari-lanceolatis / subcarnosis obtusis. P. B. de L. p^r. Palau / tom. 5^o. p^a. 571. / *Coronilla* caule Genistae fungoso. / Tourn. I. R. Herv. 650. Flora Espa- / ñola tom. 5^o. p^a. 5. / Se cria esta especie á una le- / gua de Cordoba, en Sierra-more- na, / en territorio de los Lagares de Caseres / y torre-doria. Crece este Arbusto de / quatro pies de alto, perenne, florece / en los Meses de Abril, y Mayo.

1185. *Coronilla juncea*, L. *Coronilla Juncea*.

1186. *Coronilla juncea*, L. *Coronilla juncea* / Palau t. 5. p. 571.

1187. *Ornithopus perpusillus*, L. *Ornithopus perpusillus* / varie^a. β L.

1188. *Ornithopus perpusillus*, L. Ornithopus Perpusillus / Cabrera / S.Lucar.
1189. *Ornithopus compressus*, L. Ornithopus compresus.
1190. *Ornithopus compressus*, L. Ornithopus Compresus.L.
1191. *Ornithopus*, sp. Ornithopus / Cabrera.
1192. *Lathyrus hirsutus*, L. Lathiro de pelo / aspero.
1193. *Lathyrus latifolius*, L. Lathiro de hoja ancha.
1194. *Lathyrus silvestris*, L. Lathirus / de ojas varias?
1195. *Lathyrus syvestris*, L. Latirus Angustifolius / Cabrera.
1196. *Lathyrus Clymenum*, L. Lathyrus tenuifolio.W. / Este lo mande con otro nombre especifico / y lo he corregido p^r.W.
1197. *Vicia angustifolia*, All. Vicia / amphicarpa / W / vi la fructificacion / subterranea.
1198. *Vicia angustifolia*, All. Vicia angustifolia / W.
1199. *Coronilla glauca*, L. Coronilla de color garzo.
1200. *Coronilla glauca*, I.. Coronilla Balearica / Decandolle / C in R.H M.
1201. *Coronilla scorpioides* (L.), Koch. *Ornithopus* (Scorpioides) foliis ternatis subsessilibus, / impari maximo.Pract.Bot.de Lin.p^r.Palau t^o.5^o.p^a.579. / *Ornithopodium* Portulacae folio.T. Inst.R H.400 / Quer Flora Española t^o.6^o.pag.32. / *Scorpioides*. Lag.500.C.B.com.Matth.895. / *Scorpioides* Matthioli.Dod.pempt. 71. / Se cria en las tierras de labor del circuito de Cordo- / ba,es annua y florece en Abril y Mayo.
1202. *Coronilla scorpioides* (L.), Koch. Ornithopus Scorpioides.L.
1203. *Coronilla scorpioides* (L.), Koch. Ornithopus / Scorpioides / W.
1204. *Coronilla scorpioides* (L.), Koch. Ornithopus scorpioides / Palau.t.5 p.579.
1205. *Hippocrepis comosa*, L. Hippocrepis comosa / Palau t.5 p.582.
1206. *Hippocrepis unisiliquosa*, L. Hippocrepis Unisiliculosa / Palau.t.5. p.581.
1207. *Hippocrepis ciliata*, Willd. Hippocrepis annua.Lag. / (tachado Multisilicuosa).
1208. *Scorpiurus vermiculata*, L. Scorpiurus vermiculata.L.
1209. *Scorpiurus muricata*, L. Class XVII Diadelphia Ord.

Decandria / Scorpiurus Muricata / Linn. Tom. 5.º. pag.ª 584 / Escorpiuro con puntitas.

1210. *Scorpiurus muricata*, L. Scorpiurus Muricata.

1211. *Scorpiurus sulcata*, L. Scorpiurus sulcata.

1212. *Scorpiurus subvillosa*, L. Scorpiurus Faccata / Cabrera. [Otra etiqueta dice] : Scorpioides subvillosis / ó S. Sulcata L / Entrena.

1213. *Scorpiurus subvillosa*, L. Scorpiurus (subvillosa) pedunculis sub- / quadrifloris leguminibus extrorsum / spinis confertis acutis. Palau. t. 5. / p. 585.

1214. *Hedysarum*, sp. *Hedysarum*.

1215. *Hedysarum obscurum*, L. *Hedysarum Alpinum*. (Otra etiqueta dice) : *Hedysarum Alpina*. L.

1216. *Hedysarum coronarium*, L. *Edisarum* / *coronarium* / Sulla / Cabrera.

1217. *Hedysarum coronarium*, L. *Hedysarum* / *coronarium* / W. *Onobrychis crista Galli*? / D.C.

1218. *Onobrychis sativa*, Lam. *Hedysarum* / *onobrychis*.

1219. *Onobrychis Crista-galli*, Lam. *Edisarum* / *Crista Galli*.

1220. *Galega officinalis*, L. *Galega* (officinalis) leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. Pract. B. / de Lin. p.ª. Palau tom. 5.º. p.ª. 633. / *Galega vulgaris*, floribus / coeruleis. T. I. R. H. 398. F. E. t.º. 5.º. 143. / *Ruta capraria*. Lag. in Diosc. / 371. C. B. com. Mat. sup. Diosc. p.ª. 836. / Esta planta se cria ocho leguas / de Cordoba, en el Puerto Calatrabe- / ño, camino del Alcarrazejo, y en / Cordoba la cultiban en la Alameda / y yo. Es perenne, crece de 6 p.ª. f.ª. p.ª. M.º.

1221. *Astragalus Lusitanicus*, Lam. *Phaca Boetica*. L.

1222. *Astragalus Lusitanicus*, Lam. *Phaca Boetica*.

1223. *Astragalus Lusitanicus*, Lam. *Phaca* (Boetica) caulescens erecta / pilosa, leguminibus tereti-cimbi- / formibus, Lin. Sp. P. p.ª. p.ª. t.º. 5.º. 639 / *Astragaloides Lusitanica*. T. I. / R. H. 399. Fl. Esp. t.º. 3.º. p.ª. 157. / vulgo Garbanzera Garbanzuelo y / Garbanzillo. / Esta Planta se cria en la Sie- / rra-morena de Cordoba : en los Ce- / rros montuosos entre el monte mismo / como en el cerro de Pino-gordo, y to- / dos aquellos inmediatos : en el Lagar / de Caseres en el de Torre-doria y sus / contornos, y demas partes de la Sierra / es perenne y florece en Abril y Mayo.

1224. *Astragalus Christianus*, L. *Astragalus Cristianus* (L.) / Phaca species mihi videtur / an betica?

1225. *Astragalus Cicer*, L. Astragalo / como garbanzo.

1226. *Astragalus glycyphyllos*, L. Astragalo / con oja de regalicia.

1227. *Astragalus glycyphyllos*, L. *Astragalus Glicifilus*.

1228. *Astragalus hamosus*, L. Astragalo / ganchoso.

1229. *Astragalus hamosus*, L. *Astragalus hamosus*.

1230. *Astragalus hamosus*, L. *Astragalus :Mamosus.Cav^a*.

1231. *Astragalus hamosus*, L. *Astragalus / hamosus / W.*

1232. *Astragalus hamosus*, L. *Astragalus hamosus*.

1233. *Astragalus Baeticus*, L. *Astragalus Boeticus / Cabrera*.

1234. *Astragalus pentaglottis*, L. *Astragalus Penta / glotis*.

1235. *Astragalus pentaglottis*, L. *Astragalus Pentaglotis / Palau t.5.p.656 / 45.C.*

1236. *Astragalus Epiglottis*, L. *Astragalus epiglottis.46 / C.*

1237. *Astragalus Hypoglottis*, L. *Astragalus Hipoglotis.L.*

1238. *Astragalus Narbonensis*, Gou. *Astragalus narbonensis / W.*

1239. *Astragalus macrorrhizus*, Cav. *Astragalus (tachado incanus) macrorrhizos Cav. / Palau 5. pag.667.*

1240. *Astragalus inflatus*, DC. *Astragalus / fragiformis / W.*

1241. *Biserrula Pelecinus*, L. *Biserrula pelecinus / W.*

1242. *Biserrula Pelecinus*, L. *Biserrula pelicinus / t.5.p.672 47.C.*

1243. *Psoralea bituminosa*, L. *Psoralea (Bituminosa) foliis omnibus terna- / tis,foliolis lanceolatis,petiolis laevibus.flo- / ribus capitatis,P.B.de L.p^a.P.t^o.5^o.p^a.676. / Trifolium betumen redolens.T. / Inst.R.H.405.Flora Esp.t^o.6^o.pag.415. / Trifolium bituminosum.Dodon. / pempt.566. / Trifolium Alphastites.Lag. 341. / Casp.Bauhin.com.Mat.sup.Diosc.608. / Esta planta se cria con mucha / abundancia en las inmediaciones de / Cordoba,como en el caño Bazan,y / en toda aquella parte de la Arrizafa / y tambien en la Sierra en todas par- / tes.Es p^o.fle.en Julio,Crece de 5,á 6 p^a.*

1244. *Psoralea bituminosa*, L. *Psoralea Bituminosa / (Cavan^a.)*

1245. *Psoralea bituminosa*, L. *Psoralea bituminosa / L / 50.*

1246. *Psoralea bituminosa*, L. *Psoralea Bituminosa* / Mayo 22.

1247. *Psoralea glandulosa*, L. *Psoralea* (Glandulosa) foliis / omnibus ternatis, foliolis lan- / ceolatis, petiolis scabris, flori- / bus spicatis. P.B. de L. p. t.º. 5º. 677. / Barbajovis triphylla, flo- / re ex coeruleo vario, vulgo / culén. Fevill. peru. 7. t. 3. F. / Española t.º. 3º. p.ª. 201. y 6º. 509. / Esta planta se cria en / el Peru y se ha conaturali- / zado en nuestra España, se / cultiva en Cordoba p.º. varios / curiosos : crece de ocho á diez / pies en alto, flor.º. en Mayo, es p.º. (Reverso) : *Psoralea* (Glandulosa) foliis om- / nibus tematis : foliolis ovato- / lanceolatis, spicis pedunculatis.

1248. *Psoralea glandulosa*, L. Class. XVII Diadelphia Ord. Decandria / *Psoralea Glandulosa*? / Linn. Tom. Vº. pag.ª. 677.

1249. *Melilotus parviflora*, Desf. *Trifolium Melilotindicum* L. / Posee la legumbre de una sola se- / milla, lo cual separa esta especie / de las otras de la 1ª. Division.

1250. *Melilotus officinalis*, Lam. *Trifolium* (*Melilotus officinalis*) / leguminibus racemosis nudis disper- / mis rugosis acutis, caule erecto. Pract. / Bot. de Lin. p.º. Palau t.º. 5º. pag. 686. / *Melilotus Officinarum* Ger- / maniae. T. Inst. R. H. 407. Flora / Española t.º. 5º. pag. 415. / *Trifolium odoratum*, seu *Me- / lilotus*. Dod. p. emt. 567. / Esta especie es mui comun en / las campiñas de Cordoba, y se halla / cerca de la ciudad á orillas del Río. / la llaman vul- garmente *trebol* : es / annua y florece en la primavera.

1251. *Trifolium repens*, L. *Trifolium repens* / Entrena.

1252. *Trifolium Cherleri*, L. *Trifolium cherleri*. [Sin eti- queta].

1253. *Trifolium Cherleri*, I. *Trifolium* (*tachado pratense*) *cherleri*. L.

1254. *Trifolium Cherleri*, L. *Trifolium* / *cherlerii* / W.

1255. *Trifolium lappaceum*, L. *Trifolium Lappaceum* L.

1256. *Trifolium angustifolium*, L. *Trifolium angustifolium*.

1257. *Trifolium angustifolium*, L. *Trifolium* / *angustifo- lium*.

1258. *Trifolium stellatum*, L. *Trifolium* (*stellatum*) spicis pi- losis ovatis, calycibus paten- / tibus, caule diffuso, foliolis obcorda- tis. Pract. Bot. de Lin. / por Palau t.º. 5º. pag. 702. / *Trifolium stel- latum*. T. Inst. R. Herb. 405 / Flora Española t.º. 6º. pag. 419. / Esta especie se cria en sitios algo humedos de / los campos de Cordoba,

como el callejón de la Huerta de / la Reyna &tc. es annua y florece en Abril y Mayo.

1259. *Trifolium scabrum*, L. *Trifolium scabrum*.

1260. *Trifolium spumosum*, L. *Trifolii Species.* / *spumosum*.

1261. *Trifolium resupinatum*, L. *Trifolium species* / *trif resupinatum* L.

1262. *Trifolium fragiferum*, L. *Trifolium fragiferum*.

1263. *Trifolium agrarium*, L. *Trifolii species.* / *trif. agrarium* L vel / *filiforme.* (Otra etiqueta) : *T. Agrarium* / *Entrena*.

1264. *Trifolium agrarium*, L. *Trifolium agrarium*.

1265. *Trifolium Baeticum*, Bss. *Trifolii especies* / *trifol. boeticum* Lag.

1266. *Trifolium*, sp. *Class. XVII Diadelphia* Ord. *Decandria* / *Trifolii Species?* / *Linn. Tom. 5.º pag. 683.*

1267. *Medicago lupulina*, L. 3º *Emparedada* / 1 de 8bº. de 815.

1268. *Tetragonolobus siliquosus*, Rth. *Lotus siliquosus*.

1269. *Tetragonolobus purpureus*, Mnch. *Lotus (tetragonolobus) leguminibus soli-* / *tariis membranaceo-quadrangulis, bracteis ovatis.* P.B. de L. p. P. tom. 5.º. p. 715. / *Lotus ruber, siliqua angulosa.* T. / *Inst. R. H. 403.* no le trae *Quer F. E.* / *Esta planta se cria en las cam-* / *piñas de Cordoba: la vi la primera / vez en la Alameda donde coji semil-* / *la, y la he cultivado. Es annua, y flo-* / *rece por Mayo y Junio. / Produce los tallos de poco mas de un* / *pie, numerosos, y echados en tierra.*

1270. *Tetragonolobus purpureus*, Mnch. *Lotus tetragonolobus.* L. / *Cabrera.*

1271. *Lotus angustissimus*, L. *Lotus Angustissimus* L.

1272. *Lotus corniculatus*, L. *Lotus corniculatus var. α* / L.

1273. *Lotus corniculatus*, L. *Lotus corniculata* / *Emparedada* / 1 de 8bº. de 1815. / 22 H.

1274. *Lotus corniculatus*, L. ¿*Lotus corniculatus* L. / *Entrena.*

1275. *Lotus corniculatus*, L. *Lotus corniculatus. Variet. α*

1276. *Lotus corniculatus*, L. *Lotus [tachado Dorycnium]* *corniculatus* L. / 55 L.

1277. *Lotus*, sp. *Lotus.*

1278. *Lotus cytisoides*, L. *Loto como Citiso.*

1279. *Dorycnium suffruticosum*, Vill. *Lotus dorycnium.*

1280. *Dorycnium suffruticosum*, Vill. Lotus Dorycnium / Lin.
1281. *Dorycnium suffruticosum*, Vill. Lotus Dorycnium Lin / 54 / L.
1282. *Lotus arenarius*, Brot. Lotus arenarius. Brotero / Cabrera.
1283. *Lotus corniculatus*, L. Lotus / pedunculatus.
1284. *Lotus corniculatus*, L. Lotus [tachado corniculatus] peduncularis Cav.
1285. *Tetragonolobus siliquosus*, Rth. Lotus siliculosus / W.
1286. *Lotus cytisoides*, L. ¿Lotus Cytisoides? / Entrena. [Otra etiqueta dice] : Lotus Sp.N / Cabrera / 53.C.
1287. *Trigonella Monspeliaca*, L. Trigonella Monspeliaca. / 51.L.
1288. *Medicago sativa*, L. *Medicago* (Sativa) pedunculis racemo- / sis, leguminibus contortis, caule erecto / glabro. Pract. B. de L.p.º. Palau tº. 5º. 734. / *Medica major*, erectior, floribus / purpurascens. T.I.R.H. 410. Flora / Española tom. 5º. 409. / *Medica*. Lag. in Diosc. 228. / *Medica Dioscoridis*. Casp. Ba- / uhin. comm. Mat. sup. Diosc. 415. / vulgo : Alfalfa, ó Mielga. / Esta planta se cria cerca de / Cordoba en los Palacios de la Galiana, y / tierra de las Canteras : crece de dos / pies de alto, su raiz parece que es / perenne, florece en los Meses de / Junio y Julio.
1289. *Medicago marina*, L. *Medicago* / maritima L. / H. Mauricio.
1290. *Medicago marina*, L. *Medicago* Maritima / Cabrera.
1291. *Medicago coronata*, Desv. *Medicago* polymorpha / v. coronata.
1292. *Medicago ciliaris*, W. *Medicago* polymorpha / v. ciliaris.
1293. *Medicago minima*, Lam. *Medicago* polymorpha / v. minima.
1294. *Medicago orbicularis*, All. *Medicago* Polimorpha, v.º Orbicularis.

Clasis / XVIII / Polyadelphia / Ordo / Pentan / *dris*

1295. *Citrus Auratium*, Riss *Citrus* (Auratium) petiolis alatis, foliis acuminatis. / Pract. Bot. de Lin. p^r. Palau t^o. 5^o. pag. 758. / *Aurantium* aeri (seu dulci) medulla, vulgare. Tourn. / Inst. R. H. 620. Flora Española t^o. 3^o. pag. 180. / *Aurantia* Mala. Lag. 105. C. B. com. Mat. 206. / vulgo : Naranja. = y su fruto naranjas. / Este hermoso arbol se cultiva en Cordoba, en todas / partes generalmente ; donde vegeta con la mayor lozania / produciendo tan exquisitas naranjas que nada le envidian / (reverso) : á las mejores : florece en Abril, y su fruto esta sazona- / do en Diciembre.

1296. *Hypericum perforatum*, L. *Hypericum perforatum* Linn.

1297. *Hypericum hirsutum*, L. *Hipericum* / *hirsutum*? / Lag. n^o. 36. / V. 3 de Julio.

1298. *Hypericum tomentosum*, L. *Hipericum tomentosum* / Vzgr.

1299. *Hypericum tomentosum*, L. *Hypericum tomentosum*.

1300. *Hypericum pulchrum*, L. *Hypericum Pulchrum*. L.

Clase XIX

301. *Urospermum Dalechampii*, Desf. *Geropogon* / de pelo aspero.

1302. *Tragopogon pratensis*, L. *Tragopogon* / *pratense*.

1303. *Tragopogon porrifolius*, L. *Tragopogon porrifolium* / vulgo salsifi. 21. H.

1304. *Tragopogon australis*, Jord. *Urospermum* / *ventenat*.

1305. *Scorzonera humilis*, L. *Scorzonera Humilis*. [Otra etiqueta dice] : *Scorzoneræ* / *species*.

1306. *Scorzonera Hispanica*, L. *Scorzonera* (Hispanica) caule ramoso, foliis amplexi- / caulibus integris serrulatis. Pract. B. de L. p^r. P. t^o. 6^o. 30. / *Scorzonera latifolia*, sinuata. T. Inst. R. H. 476. / Quer Flora Española t^o. 6^o. pag. 270 / Esta planta se cria en las tierras de labor, y / haun en las que no lo son de las Campiñas de

Cor- / doba, su raiz es perenne, y florece en los meses / de Abril y Mayo, la raiz se usa en la Medicina.

1307. *Scorzonera graminifolia*, L. Scorzonera graminifolia / folia.

1308. *Scorzonera graminifolia*. L. *Scorzonera* (Graminifolia) foliis / lineari-ensiformibus integris ca- / rinatis. P.B. de L. p. P. t.º 6.º. p.º 31. / *Scorzonera Lusitanica*, Gra- / mineo folio, flore pallide luteo. T. I. R. H. 477. / Esta planta se cria en Cor- / doba, entre el monte, de Sierra- / morena, en las inmediaciones del / convento de Santo Domingo de / Scala-Coeli, del Santuario de Ntra. / Señora de Linares y otras partes. / parece ser perenne su Raiz, fl.º en / Junio y Julio.

1309. *Podospermum laciniatum*, DC. Scorzonera / Resedifolia

1310. *Podospermum laciniatum*, DC. *Scorzonera laciniata* / W.

1311. *Scorzonera*, sp. *Scorzonera*?

1312. *Sonchus maritimus*, L. *Sonchus Maritimus*, L.

1313. *Sonchus oleraceus*, L. *Sonchus* (oleraceus) V. asper. Pract. Bot. Pract. Bot. de Lin. / p.º Palau t.º 6.º. pag. 41. = / *Sonchus asper*, laciniatus, folio Dentis-Leonis. T. / Inst. R. H. 474. Flora Española t.º 6.º. pag. 321. = / *Sonchus asper*. Lag. 213. C. B. coment. Matth. / sup. Diosc. pag. 384. = Dod. pemp. 643 = / Esta planta se cria en los campos de Cordoba, en / varios sitios, como en el arroyo Pedroches, la Alameda &c. / annua y florece en los meses de Abril y Mayo.

1314. *Sonchus oleraceus*, L. *Sonchus* / oleraceus / W.

1315. *Sonchus tenerrimus*, L. *Sonchus* / tenerrimus / W.

1316. *Picridium vulgare*, Desf. Class. XIX Singenesia Ordo Poligamia / AEqualis / *Sonchus Picrioides* / Cabanilles Descripc. de las Plant / pag.º 538 Plant. 1142 / *Scorzonera Picrioyde* (vulgo) Cerraja.

1317. *Sonchus angustifolius*, Desf. *Sonchus angustifolius* / W

1318. *Picridium vulgare*, Desf. *Sonchus pycroides* / W.

1319. *Picridium tingitanum*, Desf. *Sonchus tingitanus* pedunculis squa / mosis foliis omnibus runcinatis amplexi / caulibus. Cabanilles p. 537. / *Sonchus* / picrioides / Lam. Lag. / 29. L.

1320. *Lactuca quercina*, L. *Lactuca Quercina* L. / Entrena. [Otra etiqueta dice] : *Lactuca Quercifolis* / Cabrera.

1321. *Lactuca virosa*, L. *Lactuca* / virosa.

1322. *Lactuca perennis*, L. *Lactuca perennis* / *Hieracium* / *glutinosum*
1323. *Chondrilla juncea*, L. *Chondrilla Juncea* L.
1324. *Crepis barbata*, Cav. *Crepis Barbata*.
1325. *Crepis rubra*, L. *Crepis rubra* / W.
1326. *Crepis rubra*, L. *Crepis Rubra* Lin.
1327. *Picris aspera*, Poir. *Crepis aspera*.
1328. *Andryala integrifolia*, L. *Andryala integrifolia* L.
1329. *Andryala integrifolia*, L. ¿*Andryala integrifolia* / Entrena.
1330. *Andryala integrifolia*, L. *Andryala* / *cheiranti* / *folia* / 61 / H. [Otra etiqueta dice] :Si es *Andryala sera* / *Andryala integrifolia* var^a / Entrena.
1331. *Andryala integrifolia*, L. *Andryala integrifolia* / Lin.
1332. *Andryala integrifolia*, L. *Andryala Lanata* / Cabrera.
1333. *Andryala integrifolia*, L. *Andryala Lanata* Lin.
1334. *Andryala*, sp: *Andryala*.
1335. *Hypochaeris glabra*, L. *Hypochaeris* / *Lampifia*.
1336. *Hypochaeris radicata*, L. *Hypochaeris Radicata* / L / Entrena. [Otra etiqueta dice] :*Lapsana Sacinta*.
1337. *Rhagadiolus stellatus*, DC. *Lapsana* (*Rhagadiolus*) *calycibus fructus undique paten-* / *tibus,radiis subulatis,foliis lyratis*.Pract.Bot.de Lin. / por Palau t°.6°.pag.119. / *Rhagadiolus Lapsanae foliis*.T.Inst.R.H.cor. / 36.Flora Española t°.6°.pag. 195. / Esta especie se cria entre los sembrados del circüi- / to de Cordoba :es annua y florece en los meses de / Marzo y Abril.
1338. *Lapsana*, sp. *Lapsana*?
1339. *Scolymus maculatus*, L. *Scolymus Maculatus*. / W.
1340. *Scolymus grandiflorus*, Desf. *Scolymus Grandiflorus* / W.
1341. *Scolymus Hispanicus*, L. **Scolymus* (*Hispanicus*) *flóritus congestis*.Pract. / Bot.de Lin.p°.Palau.t°.6°.pag.227. / *Carduus chrysanthemus*.Dod.pempt.725 / vulgo :*Tagardina* / Esta planta se cria con mucha abundancia / en las campiñas de Cordoba,se hace mucho con- / sumo de ella para comer.vive dos a°.f°.en el Estio. [Otra etiqueta dice] :Dudo q°.sea esta planta / la q° cita.
1342. *Arctium Lapp*, L. *Arctium Lappa* L.
1343. *Saussurea amara*, DC. *Serratula amarga*.

1344. *Serratula centauroides*, L. *Serratula* / como *centaurea*.
 1345. *Cnicus palustris*, Willd. *Cnicus Palustris*.W. / *Cardus Palustris* (Lin).
 1346. *Carduus pycnocephalus*, L. *Cardus Pycnocephalus*. L. ? / *C.Palustris* L. ?
 1347. *Notobasis syriaca*, Cass. *Carduus,Ciriacus* / *Cabrera*.
 1348. *Silybum Marianum*, Gärt. *Cardus Marianus*.W.
 1349. *Notobasis syriaca*, Cass. *Cardus Siriacus*.L.
 1350. *Notobasis syriaca*, Cass. *Cardus Siriacus*.L. / var.^o.
 Purpurea.
 1351. *Cirsium eriophorum*, Scop. *Cardus Eriophorus* / L.
 1352. *Carduus*, sp. *Carduus*.
 1353. *Carduus*, sp. *Carduus*.
 1354. *Picnomon Acarna*, Cass. *Cnicus Acarna* Lin.
 1355. *Onopordon*, sp. *Onopordum* sp.nov. ? / W / Es especie nueva.
 1356. *Atractylis macrophylla*, Desf. (*Acarna Macrophylla* ? / *Onopordum* S.N?)
 1357. *Carlina acaulis*, L. *Carlina Acaulis* / W.
 1358. *Carlina vulgaris*, L. *Carlina vulgaris* L. [Otra etiqueta dice] :*Carlina vulgaris* / remito este exemplar con / flor y la *Acarna Gumifera* / W. / *Atractylis Gumifera* de L.
 1359. *Carlina racemosa*, L. *Carlina* (tachado corimbosa) L. / *suphurea* W. / *Cardillo de la Ubas*.
 1360. *Atractylis cancellata*, L. *Atractylis cancelata*.L.
 1361. *Atractylis cancellata*, L. *Atractilis* / *cancelata*.
 1362. *Kentrophyllum lanatum*, DC. *Carthamus Lanatus* / W.
 1363. *Carduncellus coeruleus*, DC. *Carthamus Coeruleus*.L.
 1364. *Carduncellus coeruleus*, DC. *Carthamus Coeruleus*.
 1365. *Bidens frondosa*, L. *Bidens* (*Frondosa*) *foliis pinnatis serratis lineatis glabris,se-* / *minibus erectis,calycibus frondosis,caule laevi*.Pract.Bot.de / Lin p^o.Palau t^o.6^o.pag.203. / *Varietas calycibus non foliosis*. / Esta planta vi cultivada en / el Jardín Botánico de Sevilla / en septiembre de 1793.en don- / de cogi este esqueleto. / Es annua,y parece que / es estrangera, Americana.
 1366. *Bidens frondosa*, L. *Bidens Frondosa*. L. / No he podido encontrar las ojas mas / bajas de la Planta q^o.creo recordar son / de tres hojuelas ;las tengo encargadas.

1367. *Dahlia variabilis*, Desf. *Dahlia pinnata* / W.
1368. *Emilia sonchifolia*, DC. *Cacalia sonchifolia*.L. / *Cacalia Coccinea*.curt.
1369. *Eupatorium cannabinum*. L. Me parece Eupatorio / Eupatorio Canabinum. / lo cogi en Guadalimar / en una vega amena / de sus orillas.
1370. *Eupatorium micrantum*, Less. *Eupatorium Micranthum* Lag^a. / *Regali Hortu Matrit.* / C in R.H.M.
1371. *Brickellia secundiflora*, A. Gray. *Eupatorium secundiflorum* Lag^a. / C in R H M.
1372. *Santolina Chamaecyparissus*, L. *Santolina* (*Chamaecyparissus*) *pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis.* *Pract.Bot.de / Lin.p^r.Palau t^o.6^o.pag.257.* = / *Santolina foliis teretibus.T.Inst.R.H.460.* / *Quer Flora Española t^o.6^o.pag.251.* = / *Abrotnum femina.Lag.282.* = / Esta planta se cria en España, y se cultiva en Cor- / doba formando dibuxos en los Jardines :es p^o. f^o. en A^o.
1373. *Santolina Chamaecyparissus*, L. *Santolina Chameciparissus*.
1374. *Lyonetia anthemoides*, Wk. *Santolina Anthemoides* / *Lin.* / C in R H M.
1375. *Diotis maritima*, Coss. *Cabrera* / *Atanasia Maritima* / la cogi en las playas / de Regla 1813.
1376. *Tanacetum annuum*, L. *Balsamita Multifida* / *Clemente* / *Cabrera.* [Otra etiqueta dice] :*Balsamita multifida* / de *Clemente* / Asi la nombra / *Hemeler.*
1377. *Tanacetum Balsamita*, L. *Tanacetum* (*Balsamita*) *foliis ovatis integris serratis.* *Pract.* / *Bot.de Lin.p^r.Palau t^o.6^o.273.* / *Tanacetum hortense,foliis et odore Menthae.T.I.R.H.461.* / *Flora Española t^o.6^o.p^a.356.* / *Balsamita major.Dod.com. / 299.* = *Farm.Costus hortensis.* / *Mentha Romana.Lag.24.* / Se cria esta planta en Es- / paña en las calles de Canencia, / y en las orillas de los prados junto / á Linares, y Alcalá de la Selva / en Aragon. *Quer.*
1378. *Artemisia Herba-alba*, Asso. 22.L. / [tachado thimus] / *Arthemisia contra* / *Elchecia ambigua* / W.
1379. *Artemisia vulgaris* L. *Arthemisia officinalis.*
1380. *Helichrysum Stoechas*, DC. *Gnaphalium* / *sthechas* W.
1381. *Helichrysum Stoechas*, DC. *Class XIX Singenesia* Ord.

Poligamia Superflua / Gnaphalium Stoechas / Linn. Tom. 6.º pag. 297. / Gnaphalio Estacado (vulgo) Perpetuas aramillas silvestres.

1382. *Helichrysum Stoechas*, DC. Gnaphalium sthecas / (tachado Centaura) / No me acuerdo donde cogi / esta variedad o nueva / especie.

1383. *Helichrysum orientale*, Gaertn. Class XIX Singenesia Ord Poligam. superflua / Gnaphalium Orientale / Linn Tom. 6.º pag. 301. Gnaphalio Oriental (vulgo) Perpetuas amarillas de / Jardineria.

1384. *Helichrysum Stoechas*, DC. Gnaphalium sthecas / vulgo : Siemprevivas.

1385. *Helichrysum orientale*, Gaertn. *Gnaphalium* (Orientalé) subherbaceum, foliis linearilanceolatis sessilibus, corymbo composito, / pedunculis elongatis. Pract. Bot. / de Lin. p.º. Palaut. 6.º. p.º. 301. / *Helichrysum Orientale*. T. / Inst. R. H. 453. F. E. t.º. 5.º. p.º. 67. / vulgo siemprevivas pajizas. / Habita en Africa. Lin. / Se cultiva esta planta en / Córdoba en muchas partes : es perenne, y se propaga muy bien / es de planta : florece por Mayo y Junio.

1386. *Helichrysum arenarium*, Moench. Gnaphalium / arenarium / W.

1387. *Gnaphalium luteo-album*, L. Gnaphalii species / Luteoalbum. / Es comun en Calanda y otras / partes de Aragon. [Otra etiqueta dice] : Gnaphalium Luteoalbum / L. / Entrena / Criase en la falda de / la Sierra de Cordoba.

1388. *Gnaphalium luteo-album*, L. Gnaphalium / Luteoalbum / W.

1389. *Gnaphalium luteo-album*, L. Gnaphalium Luteoalbum / L / Entrena.

1390. *Gnaphalium luteo-album*, L. Gnaphalium Luteoalbum / Entrena.

1391. *Helichrysum Stoechas*, DC. Gnaphalium sthecados.

1392. *Gnaphalium*, sp. Gnaphalium.

1393. *Xeranthemum inapertum*, DC. Xeranthemum / inapertum Webb : / mi amigo / antes Centaurea.

1394. *Inula conyza*, DC. Coniza squarrosa / Emparedada / l de 8bº de 1815 / 20 H.

1395. *Sericocarpus solidagineus*, Nees. Class. XIX Singen.

Ord. Poligamia / Superflua / an Coniza Linifolia / Nescio Linn. Tom. 6º. pagª. / 338. [Otra etiqueta dice] : Inula Pulicaria / Entrena.

1396. *Phagnalon saxatile*, Cass. Coniza saxatilis / Cabrera.
1397. *Inula viscosa*, Dryand. *Cryssocoma verticalis* / 61 / L.
1398. *Inula viscosa*, Ait. Coniza? carecen los floscu- / los de la periferia de los 3 dientes / Erigeron / V.5 de Julio. [Otra etiqueta dice] : Inula Viscosa / Entrena.
1399. *Inula viscosa*, Ait. *Erigeron viscosum* L.
1400. *Inula viscosa*, Ait. *Inula viscosa* Lag. / 57 / L. / *erigeron viscosum* Linn.
1401. *Inula viscosa*, Ait. *Erigeron viscosum* L. / Entrena.
1402. *Inula graveolens*, Desf. *Erigeron Graveolens* (Lin).
1403. *Conyza ambigua*, DC. *Erigeron Linifolium* / 6 / E. Canadensis.
1404. *Erigeron acris*, L. *Erigeron* / acre / W.
1405. *Conyza ambigua*, DC. *Erigeron crispum* / Pourr. Lag.
1406. *Pulicaria crispa*, Sch. Class. XIX Singenesia Ordo / Poligamia Superflua / *Erigeron Hisopifolium* / Esta determinada por / Henseler el de Malaga aficiona / do a la Ciencia. No la trae / Linneo. ni Cabanilles en su descrip / cion de las plantas.
1407. *Pulicaria crispa*, Sch. *Erigeron hisopifolium inula...* / 48 / H. / *Inula crispa* Entrena.
1408. *Tussilago Farfara*, L. *Tusilago Fasfara* / vulgo - una de caballo.
1409. *Tussilago Farfara*, L. *Tusilago* / Fasfara.
1410. *Petasites officinalis*, Mönch. Class. 19 Singenesia Ordo / Poligamia superflua / *Tusilago petasites* / Linn. Tomo 6º. pag 368 / *Tusilago petastes* (vulgo) / sombrerera.
1411. *Senecio vulgaris*, L. *Senecii species*. [Otra etiqueta dice] : *Senecio vulgaris* / Entrena.
1412. *Senecio aegyptius*, L. *Senecio aegyptius* / W..
1413. *Senecio silvaticus*, L. *Senecio silvaticus* Lin.
1414. *Senecio erucaefolius*, L. *Senecio Erucifolius* W.
1415. *Senecio Jacobaea*, L. *Senecium Jacobaea* L.
1416. *Senecio Jacobaea*, L. *Senecio Jacobaea* L.
1417. *Senecio linifolius*, L. *Senecio Linifolius*. L.
1418. *Senecio linifolius*, L. Class. XIX Singenesia Ord. Pol-

ligamia super^a / Senecii Species ¿Linifolium? / Linn Tom.6^o pag^a.669.

1419. *Senecio linifolius*, L. Senecium / linifolium / 40 H.

1420. *Senecio*, sp. Senecium L. / 62.

1421. *Aster alpinus*, L. ¿Aster Alpinus L? / Entrena. [Otra etiqueta dice] : Aster? 46 / H / Inula? / V. 8 Julio.

1422. *Aster Chinensis*, L. *Aster* (chinensis) foliis ovatis angu- / latis dentatis petiolatis, calycibus ter- / minalibus patentibus foliosis. Pract. / Bot. de Lin. p^r. Palau t^o.6^o.p^a.419. / Aster Chenopodii folio, annu- / us, flore ingenti, specioso. Dill. elth. / 38. Flora Esp. tom.3^o.p^a.149. / vulgo Estrañas. / Havita en la China? Lin. / Esta planta se cultiva en Espa- / ña : en Cordoba en todos los Jardines, y / Casas particulares, por la belleza de sus / flores, pues las produce de color de Rosa / blancas, Carmesis, Azules, Moradas, y / Jaspeadas de estos colores, otras vezes los / flosculos del disco que son dorados, se ha- / cen del color del radio, se ensanchan y / se alargan gradualmente formando un / copete agraciado. crece de pie y medio á / dos de alto, es annua, y florece en los / Meses Agosto y Septiembre.

1423. *Aster Chinensis*, L. Class. XIX Singenesia Polligamia superfl^a / Aster Chinensis / Linn. Tom.6^o. Pagina 419 / Aster de la China (vulgo) / Estrañas.

1424. *Solidago Virga aurea*, L. Solidago Virga aurea.

1425. *Senecio minutus*, DC. Cineraria / minuta W. / foribus luteis.

1426. *Inula Oculus-Christi*, L. 57 / H. / Inula / oculus cristi.

1427. *Inula Oculus - Christi*. L. Inula Oculus / Christi

1428. *Inula Britanica*, L. Inula Oculus Cristi / Cabrera. (Otra etiqueta dice) : *Me parece mas bien* ; Inula Britanica L. / Entrena.

1429. *Pulicaria dyssenterica*, Gärtn. Inula Disenterica. L.

1430. *Pulicaria dyssenterica*, Gärtn. Inula disenterica / Cabrera. (Otra etiqueta dice) : ¿Sera acaso? / Inula Pulicaria var^a α / Entrena.

1431. *Pulicaria arabica*, Cass. Inula Pulicaria.

1432. *Pulicaria arabica*, Cass. Inula pulicaria W. / 9b^{re}. junto a Cordoba.

1433. *Inula hirta*, L. Inula Hirta. L.

1434. *Inula hirta*, L. Inula Hirta?

1435. *Inula crithmoides*, L. *Inula* (crithmifolia) foliis lineari- / ribus carnosis tricuspidatis. Pract. / Bot. de Lin. p^r. Pal. tom. 6^o. pag. 452. / *Aster maritimus*, folio tere- / ti, craso, tridantato. T. Inst. R. H. / 483. Flora Española. t^o. 3^o. pag. 144. / *Crithmum*. III. Casp. Bauhin. / comm. Mat. sup. Diosc. 382 / *Crithmum* *Chrisanthemum*. Dodon. pempt. 706. / Habita en los arenales del Mar / de Barcelona y otras partes de Es- / paña. Quer. Coji este esqueleto / en el Jardin-Botanico de Sevilla.

1436. *Inula*, sp. *Inula*

1437. *Bellis perennis*, L. *Bellis perennis*.

1438. *Bellis perennis*, L. *Bellis perennis*.

1439. *Bellis perennis*, L. Class. 19 Singenesia Ordo / poli- / gamia superflua / ¿*Bellis perennis*? / Linn. Tom. 6^o. pag^a. 473 / *Belis* o *Margarita Perenne*.

1440. *Bellis perennis*, L. *Bellis perennis minor* / W.

1441. *Bellis annua*, L. *Bellis annua* / W. / 19 de D^o. sobre la / huerta del Naranjo.

1442. *Bellis annua*, L. *Bela* (tachado *annua*) / pseudo-citius.

1443. *Tagetes patula*, L. *Tagetes* (*Patula*) caule subdiviso patu- / lo. Pract. de Bot. de Lin. p^r. P. t^o. 6^o. 477. / *Tagetes Indicus*, minor, simplici / flore, sive *Caryophyllus indicus*, seve / flos *Africanus*. T. Inst. R. Herv. 488. / Flora Española tom. 6^o. p^a. 346. / Flos *Africanus*. Dod. pempt. 255. / *Othonna*. Lag. in Diosc. 257. / *Caryophyllus Indicus minor* flore sim- / lici. C. B. com. Mat. in Diosc. 469. / *Africanus flos simplex*. Swert. flo- / rileg. lib. 2^o. fol. 26. / vulgo *copetes*. / Havita en Mexico. Lin. / Se cultiva en Cordoba : crece de / tres pies mui ramosa, es *annua* y flo- / rece en los Meses de Junio Julio &c.

1444. *Tagetes patula*, L. Class. XIX Singenesia Ord. Poligamia Su- / perflua / *Tagetes patula* / Linn. Tom. 6^o. pag^a. 477 / *Tagetes* Extendida.

1445. *Tagetes erecta*, L. Class. XIX Singenesia Ord. Poligamia Superfl^a. / *Tagetes Erecta* Linn Tom. 6^o. pag^a. / 478 *Tagetes* derecha.

1446. *Tagetes erecta*, L. *Tagetes* (*erecta*) Varietas *a* / Lin. Spec. Plant. p^r. pⁿ. t^o. 6^o. fol. 478. / *Tagetes maximus, rectus*. flore ma- / ximo / multiplicato. Tourn. Inst. R. H. 488. / *Africanus flos masi- / mus pleno flore* / aurantio colore. Swert. florileg. lib. 2^o. f^o. 26. -

1447. *Zinnia pauciflora*, L. *Zinnia* (*pauciflora*) floribus / ses-

silibus. Pract. Bot. de Lin. p. P. / tom. 6.º. p. 482. / *Chrysogonum* foliis sessilibus / amplexicaulibus, calycibus sessilibus / squamosis. L. Sp. Pl. 320. / Habita en el Peru. L. / Esta planta haunque no es / propia de Jardines de recreo ; se / suele cultivar en algunos de / Cordoba, y algunas casas par- / ticulares. Es annua, y florece / en Julio y Agosto.

1448. *Zinnia pauciflora*, L. *Zinnia pauciflora* / W.

1449. *Schkuria abrotanoides*, Roth. *Pectis pinnata* Lamark / P. Multifida Ortega / C in R H M.

1450. *Zinnia pauciflora*, L. Class. XIX Singenesia Ord. Polig.ª. Superfl.ª. / *Zinnia pauciflora* / Linn. Tom. 6.º. pag.ª. 482. / *Zinnia* de pocas Flores.

1451. *Leucanthemum vulgare*, Lamk. *Chrysanthemum* *Leucanthemum* / L. / an C. Montanum.

1452. *Chamaemelum inodorum*, Vis. *Chrysanthemum* / inodorum?

1453. *Chrysanthemum indicum*, L. Class. XIX Singenesia Ordo Poligamia / Superflua. / An *Artemisiae* species. (Otra etiqueta dice) : *Crisantemum indicum* / Entrena.

1454. *Chrysanthemum indicum*, L. *Crisantemum Indicum* L. / Entrena.

1455. *Prolongoa pectinata*, Bss. *Chrysantemum* / pectinatum. W.

1456. *Chrysanthemum segetum*, L. *Chrysanthemum* (segetum) foliis amplexicaulibus, su / perne laciniatis, inferne dentato-serratis. Pract. Bot. / de Lin. p. Palau. t.º. 6.º. pag. 495. / Se cria esta planta en grande abundancia en / los sembrados del circuito de Cordoba, y la llaman / *Pericones*, igualmente que á otras especies de este Ge- / nero. Es annua, y florece en Abril y Mayo.

1457. *Chrysanthemum segetum*, L. *Chrysanthemum* / segetum.

1458. *Coleostephus Myconis*, Cass. *Chrysanthemum* (*Myconi*) foliis ligulatis obtusis / serratis, calycinis squamis aequalibus. Pract. Bot. de Lin. / por Palau t.º. 6.º. pag. 496. / *Chrysanthemum mu- latifolium*. T. p. 492. no la / trae Quer en su Flora Española. / Esta especie no es mui comun y se cria en algu- / nos parages del circuito de Cordoba en tierras de labor / la tengo obserbada hacia el arroyo del Moro : es annua / y florece en Abril y Mayo.

1459. *Coleostephus Myconis*, Cass. *Chrysanthemum* / *miconii*.

1460. *Coleostephus Myconis*, Cass. *Crisanthemum Myconis* / Lin.

1461. *Coleostephus multicaulis*, Dur. *Pyrethrum Multi* / caule.W.

1462. *Chrysanthemum Bocconi*, Pourr. *Pyrethrum* [tachado multicalue / varietas foliis villosis W.] / Bocconi.

1463. *Pyrethrum Parthenium*, Sm. *Matricaria Parthenium* / vulgo- Yerva de Sta.Maria.

1464. *Pyrethrum Parthenium*, Sm. Class XIX Singenesia Ordo / Poligamia Superflua / *Matricaria Parthenium* / Linn. Tom.6º.pagº.501 / *Matricaria partenio*.

1465. *Cotula aurea*, Loeft. *Cotula Aurea* / Cabrera.

1466. *Cotula aurea*, Loeft. *Cotula* / aurea / 60 / H.

1467. *Cotula aurea*, Loeft. *Cotula Aurea* L / Entrena. [Otra etiqueta dice] : *Cotula Anthemis* / Cabrera.

1468. *Myriogyne elatinoides*, Less. *Cotula foetida*. [Otra etiqueta dice] : Dudo qº. lo sea.

1469. *Ormenis mixta*, DC. *Anthemis Mixta* L. / En las calles.

1470 *Ormenis mixta*, DC. *Anthemis* (nobilis) foliis pinna- to-compositis linearibus / acutis subvillosis. Pract. Bot. de Lin. pº.Palau tº.6º.pag.521 / *Chamaemelum nobile*, sive *Leucanthemum odoratius*. / T.Inst.R.H. 494. Quer Flora Española tº.4º.pag.177 / *Chamaemelum odoratum*. Dod.pemt.259. = / *Anthemis* sive *Chamaemelum*. C.B.Mat.649. / Esta planta es mui comun en Cordoba en los patios de muchi- / simas casas, y en los Jardines la llaman vulgarmente *Manzanilla fina*. es annua y florece en Abril y Mayo.

1471. *Anthemis Cotula*, L. *Anthemis* (Cotula) receptaculis concis, paleis setaceis, se- / minibus nudis. Pract. Bot. de Lin. pº. Palau tº.6º.pag.523. / *Chamaemelum foetidum*. T.I.R.H.494.F.E. tº.4º. / pagina 179. / *Cotula alba*. Dod. pempt. 258. / Esta planta se cria en Cordoba con mucha abundancia / en los llanos de la Albayda, en la piedra de la buena vis- / ta y otros sitios, es annua y florece en febrero y Marzo.

1472. *Anthemis Cotula*, L. *Anthemis cotula*.

1473. *Anacyclus Pyrethrum*, DC. *Anthemis Pyrethrum* / Lin. / C in R.H.M.

1474. *Anacyclus radiatus*, Lois. *Anthemis valentina*.

1475. *Anthemis arvensis*, L. *Anthemis australis* / W.
1476. *Achillea Ageratum*, L. *Achilea* (*Ageratum*) *foliis lanceolatis / obtusis. acute serratis.* Pract. bot. de / Lin. p^r. Palau t^o. p^a. 531. / *Parnica lutea, suaveolens.* T.I. / R.H. 497. Flo. Esp. t^o. 6^o. p^a. 144. / *Balsamita minor.* Dod. pempt. 295. / Esta planta se cria en sierra / morena á una legua de distancia / de Cordoba, en el Lugar de San / Josef y todos aquellos contornos, y / en torrebermeja, y otros sitios. Es / sumat^o. olorosa, p^{no}. y f^o. en Junio y J^o.
1477. *Achillea Millefolium*, L. *Achilea Milefolium*.
1478. *Achillea Millefolium*, L. *Achilea* / *millefolium*.
1479. *Achillea odorata*, L. *Achilea odorosa*.
1480. *Achillea odorata*, L. *Aquilla* / *microphila* / 53.H. / C. de Amo. 20 Julio.
1481. *Achillea odorata*, L. *Achilea Microphilla*. W.
1482. *Achillea*. 31. *Achilea*? H.
1483. *Verbesina alata*, L. *Verbesina* (*alata*) *foliis alternis decurrentibus / undulatis obtusis.* Pract. Bot. de L. p^r. P. t^o. 6^o. p^a. 550. / Se cria en Curasao y en Suriman. Pal. loc. cit. / La he cultivado en Cordoba en mi Jardin; / Es perenne y florece en Agosto y Septiembre / crece de dos á tres pies de alto.
1484. *Asteriscus spinosus*, Godr. Gren. *Buphthalmum* / *Spinosum* / Cabrera.
1485. *Asteriscus spinosus*, Godr. Gren. *Buphthalmum spinosum* / (Cavan^a.).
1486. *Asteriscus spinosus*, Godr. Gren. *Buphthalmum Spinosum*.
1487. *Asteriscus maritimus*, Mönch. *Buphthalmum* / *maritimum*?
1488. *Helianthus tuberosus*, L. Class XIX Singenesia Ord. Polligamia / Frustranea / *Helianthi tuberosi* varietas? / Linn. Tom. 6^o. pag^a. 570 / (vulgo) Patacas. [Otra etiqueta dice]: No es *Heliantus*.
1489. *Crupina vulgaris*, Cass. *Centaurea* / *Crupina* / W.
1490. *Crupina vulgaris*, Cass. *Centaurea* / *crupina* / 28 H. de la 2^a. remesa.
1491. *Centaurea saxatilis*, Lag. *Centaurea* / *saxatilis* / et *crupina* W.
1492. *Crupina vulgaris*, Cass. *Centaurea crupina*.

1493. *Centaurea Moschata*, L. *Centaurea Moschata* / Entrena.

1494. *Centaurea alpina*, L. *Centaurea Alpina* L. / Entrena.

1495. *Centaurea linifolia*, Vahl. *Centauria Linifolia* / Cabrera. [Otra etiqueta dice]: *Centaurea Solstitia* / lis.Cav^s. / Entrena.

1496. *Centaurea nigra*, L. *Centaurea Nigra* L. / no es la C. Montana / pues no tiene el tallo / Alado.Entrena. (Otra etiqueta dice): *Nigra?* mihi 51. / H. / *Centaurea* / Montana?

1497. *Centaurea pullata*, L. Mayo 21. / *Centaurea Pullata* / I.in.T.6.f.605.

1498. *Centaurea semidecurrens*, Jord. *Centaurea montana* / Sierra de Segura- Junio-29.

1499. *Centaurea paniculata*, L. 50.H. / *Centaurea* / paniculata.

1500. *Centaurea Scabiosa*, L. *Centaurea* / escabiosa.

1501. *Centaurea amara*, L. *Centaurea amara* ./ varietas β W.

1502. *Centaurea alba*, L. *Centaurea* / alba W.

1503. *Centaurea alba*, L. *Centaurea alba* / W.

1504. *Centaurea alba*, L. *Centaurea Alba*.L. / Entrena. (Otra etiqueta dice): 5 C. 59.H. / (tachado centaurea) / coniza / rupestris.

1505. *Centaurea babylonica*, L. *Centaurea* / babilonica.

1506. *Leuzea conifera*, DC. *Arzolla* / *Centaurea*. / *Leuzea conifera*.

1507. *Leuzea conifera*, DC. *Centaurea* (Conifera) calycibus scariosis, foliis tomentosis, / radicalibus lanceolatis, caulinis / pinnatifidis, caule simplici. Pr^a. / Bot.de Lin.p^r.Palau.t^o.6^o.p^a. 620. / *Centaurium majus*, incan- / um, humile, capite pini. T.I. / R.H.449.F.E.t^o.4^o.p^a.112. / Esta planta se cria en Cordo- / ba en terrenos montuosos: en las / inmediaciones del Santuario de / nuestra S^{ra}. de Linares, y en los / demas parajes de la Sierra. Su- / ra- / iz es perenne, florece en Junio. / á esta *Centaurea* la dan tambien el nombre / de Arzolla.

1508. *Cnicus benedictus*, L. *Centaurea* / benedicta / calices con espinas dupli- / cadas lanudos y con involucros.

1509. *Cnicus benedictus*, L. *Centaurea* (Benedicta) calicybus dupli- / cato-spinosis lanatis involucratibus, fo- / lio semidecurrentibus denticulato-spi- / nosis. Lin Sp.Plant.p^r.p^a.t^o.6^o. 624. / Cni-

cus sylvestris, hirsutior, sive / *Cardus Benedictus*. T. p. 450. Flora / Española tomo 4.º p. 358. / *Cardus Benedictus*. Lag. in Diosc. / 333. Dod. pempt. 725. Casp. Bauhin. / comment. Matthiol sup. Diosc. 594. / Farm. *Cardus benedictus*. vulgo / *Cardo santo*. / Se cria y es comun en los mas ter / renos de España, en Cordoba se siem- / bra, y hace mucho uso de ella en la far- / macia. de su raiz / leñosa salen muchos / tallos ramosos de dos á tres pies de largo / reclinados é incorporados p.º lo regular, / es annua y florece p.º Junio y Julio. (Reverso) : La tengo observada en la Sagra / de Toledo, en el año de 1795.

1510. *Centaurea eriophora*, L. Centaura Eriophora / o / La- / nuda / Palau.º.6 pag.625 / 29.H.26.C.

1511. *Centaurea Calcitrapa*, L. Centaurea Calcitrapa L. / esta es la q.º no pudimos / determinar el año pasado.

1512. *Centaurea Solstitialis*, L. Centaurea Solticialis Cav.º.

1513. *Centaurea Solstitialis*, L. Centaurea Solticialis Cav.

1514. *Centaurea Melitensis*, L. Centaurea Species. (Otra eti- / queta dice) : Centaurea Melitensis / L. / Entrena.

1515. *Microlonchus Clusii*, Spach. Centaurea Salmantica / Lin.

1516. *Microlonchus Clusii*, Spach. Centaura / Salmantica.

1517. *Microlonchus Clusii*, Spach. Class. XIX Singenesia Or- / do / Poligamia Frustranea / Centaurea Saimantica / Linn. Tom. 6.º. pag.º.631 / Centaurea de Salamanca / (vulgo) Escobilla.

1518. *Galactites tomentosa*, Mneh. Centaurea Galactites L.

1519. *Galactites tomentosa*, Mneh. Centaurea Galactites. L.

1520. *Centaurea coerulescens*, W. Centaurea coerulescens / W. / virgata Cab.

1521. *Centaurea incana*, Lag. Centaurea / 52.H. / incana / de la Gasca / segun / les / Herse.

1522. *Centaurea*, sp. Centaurea.

1523. *Calendula officinalis*, L. Clas. «19» Singenesia ordo Poliga- / mia necesaria / Calendula oficinalis. / Lin. Tomo 6.º. pag.º. 653 / (vulgo) Micaelas o Doblones.

1524. *Filago Germanica*, L. Filago Germanica L. / en las in- / med.º. de Madrid.

1525. *Filago Duriuei*, Coss. Filago Pyramidata Lin / me pa- / rece / Gnafalium.

1526. *Filago Gallica*, L. *Filago Gallica* L. / Rl. Casa de Campo.
1527. *Filago arvensis*, L. *Filago Arvensis*.L. / tengo un esqueleto del / F.Gallica del Jardín Botánico / mui parecido á este, pero no es tan / tomentoso y las ojas mas estrechas.
1528. *Filago arvensis*, L. *Filago arvensis*.
1529. *Filago arvensis*, L. *Filago Arvensis* L ? / F. Montaña. / Entrena / No es el F Germanica. [Otra etiqueta dice] :54. H *Filago ger* / manica / arvensis / 59.L. / Gn. arenarium?
1530. *Evax pygmaea*, P. *Filago pygmaea* / W / Rabanales / a los lados de Arrecifes.
1531. *Micropus*, sp. 5 / *Micropus* sp. nova? / L. / 14.H.
1532. *Echinops Ritro*, L. *Echinops Rhitro*.
1533. *Jasione montana*, L. *Jasione Montana* L / Entrena.
1534. *Viola canina* L. *Viola canina* / W.
1535. *Viola cornuta*, L. *Viola cornuta* W. / La cogi junto al arroyo de D.Lucar. / Dia 10 de Abril de 1833.
1536. Sp. nova / *stipulis brevissimis ciliatis*.
1537. *Impatiens Balsamina*, L. *Balsamina impatiens* L. / Entrena / *Balsamina Nolintangere*.
1538. *Tanacetum annuum*, L. *Balsamita* / *multifida* L / 58 / de Clemente.
1539. *Achillea Ptarmica*, L. *Ptarmica*.

Clase XX

1540. *Orchis albida*, Scop. *Orchis albida* / W. / *Satirum Albidum* L? / Esta plantita recuerdo que / Vmd trabajó en ella, pero / no del resultado.
1541. *Aristolochia Baetica*, L. *Aristolochia* (Boetica) *foliis corda-* / *tis acutiusculis, caule volubili,pe-* / *duculis subtermis petiolo longioribus.* Pract.B.de Lin.p^r.P. t^o6^o.888. / *Aristolochia Clematidis* ser / pens.T.I.R.H.162.F^a.E^a.t^o.3^o 91. / Esta especie se cria con abun- / dancia en los campos de Cordoba en- / rredada: en los Olibos: señaladamente / hacia la Arrizafa y por toda la fal- / de de la sierra. / Es verba pérenne y florece / en los meses de Abril y Mayo,y ca- / si en todas las estaciones del año la / he observado con flor.
- 1542 *Aristolochia Pistolochia*, I.. *Aristolochia* (*Pistolochia*)

foliis cordatis crenulatis subtus re- / ticulatis petiolatis, floribus solitariis. Pract. Bot. de Lin. / por Palau tom 6°. pag. 890. / Aristolochia Pistolochia dicta. T. Inst. R. H. 162. / Quer Flora Española t°. 3°. pag. 92. = Casp. Bauhin. / com. Mat. sup. Diosc. pag. 483. = Farm. Aristoloc. tenuis. / Esta especie se cria cerca de Cordoba en los llanos / de la Albayda, en la Palomera entre el monte baxo, y o- / tros sitios: es perenne y florece en los meses de Marzo y Abril.

1543. *Aristolochia longa*, Clus. Aristoloquia longa / W.
 1544. *Aristolochia longa*, Clus. Aristolochia / longa. W.
 1545. *Cytinus Hypocistis*, L. Cytinus hippocistis / W.
 1546. *Cytinus Hypocistis*, L. Cytinus hypocistis / Lin. t. 6. p. 901.
 1547. *Dracunculus vulgaris*. Schott. Ari, Dracunculi / Filius parvulus.
 1548. *Arum maculatum*, L. Arum Maculatum L. / Entrena.
 1549. *Arum maculatum*, L. Arum Maculatum. [Otra etiqueta dice] : hisopifolium.
 1550. *Arisarum vulgare*, Kth. Arum Arisarum.
 1551. *Arisarum vulgare*, Kth Arum Arisarum.

Clase XXI

1552. *Chara vulgaris*, L. Chara Vulgaris.
 1553. *Chara*, sp. 9. H. Chara.
 1554. *Chara*, sp. 8. H. Chara?
 1555. *Chara*, sp. 5. H. Chara.
 1556. *Carex arenaria*, L. Carex / arenaria / W.
 1557. *Carex flava*, L. Carex flava L. / ó / C. cespitosa L. / Entrena.
 1558. *Carex distans*, L. Carex Distans. L.
 1559. *Carex vesicaria*, L. Carex vesicaria. L. / Es la especie q°. mas se acer / ca ; pero tal vez en W / habra otra q°. mas le / / combenga.
 1560. *Carex*, sp. Carex.
 1561. *Carex*, sp. Carex?
 1562. *Alnus glutinosa*, Gärtn. Betula Alnus. L. / Alnus Glutinosa W.

1563. *Urtica urens*, L. *Urtica Urens*.
1564. *Urtica dioica*, L. *Urtica dioica* / W.
1565. *Urtica dioica*, L. *Urtica* / Dioica.
1566. *Arctium minus*, Bernh Bardana menor.
1567. *Amarantus Blitum*, L. *Amarantus Melancolicus*.
1568. *Amarantus Blitum*, L. *Amarantus...* / *Melancolicus*
- foliis ovato lanceolatis / macula nigra in medio foliorum infectus.
1569. *Amarantus Blitum*, L. Class.XXI Monoecia Ord. Pentandria. / *Amaranthus tricolor* / Linn.Tom.7°.pag°.134 / *Amaranto de tres colores* / (vulgo) papagayo.
1570. *Amarantus viridis*, L. *Amaranthus viridis*.L.
1571. *Amarantus viridis*, L. *Amaranthus viridis* W.
1572. *Amarantus deflexus*, L. *Glomeraria deflexa* (Cavan^a.)
/ ó / *Amarantus Deflexus* Lin.
1573. *Amarantus deflexus*, L. *Amarantus deflexus*.
1574. *Amarantus deflexus*, L. *Amaranthus Deflexus*. / L. / Entrena.
1575. *Amarantus deflexus*, L. *Amaranthus deflexus*.
1576. *Amarantus caudatus*, L. *Amaranthus* (caudatus) racemis pentandria decompositis cylindricis pendulis / longissimis. Lin.Spec.P.p°.t°.7°.p°.143. / *Amaranthus maximus*. Tourn. Inst.R / Herb.224.Flora Española 2°.fol.283. / vulgo :Moco de Pabo. / Habita en el Peru,en Persia,Zeylan / y Rusia.L.se cultivada en Cordoba en los Jardines de la Alamea,y otros. / Crece á la altura de cinco pies ó mas, / y sus racimos cuelgan hasta cerca del suelo. / Es annua y florece por Agosto y Septiembre.
1577. *Amarantus caudatus*, L. Class.XXI Monoecia ordo / Pentandria / *Amaranthus Caudatus* / Linn.Tom.7°.pag°.103. / *Amaranto de Gola* / (vulgo Moco de pavo.)
1578. *Poterium dictyocarpum*, Spach. *Poterium Sanguisorba* Lin.
1579. *Poterium dictyocarpum*, Spach *Poterium Sanguisorba* / Cabrera.
- 1580 *Quercus Ilex*, L. *Quercus* (*Ilex*) foliis ovato-oblongis / indivisis serratisque subtus incanis, / cortice integro.Pract.Bot. de Lin. / p°.Palau t°.7° pag.167 / *Ilex oblongo,serrato folio*. T. Inst. R.H.583.Flora Esp°.t°.5°.262. / vulgo :*Encina*. / Se cria con tanta abundancia este arbol en toda la Sierra de Cordoba,que hai bosques formados de el de muchisima extensión. / se halla

generalmente en toda la / Sierra y muchas partes de la Cam- / piña. Vibe muchos siglos, crece de / una magnitud mui grande, y flo- / re- / ce en Abril y Mayo.

1581. *Quercus Ilex*, L. *Quercus illex* / v. *smilax* β / Mesto.

1582. *Quercus Cerris*, L. *Quercus Aegilops* / W. / Mesto en España. [Otra etiqueta dice] :El Fruto del Mexto, aun / que no enteram^o. maduro.

1583. *Quercus Cerris*, L. *Quercus* / *Cerris*.

1584. *Quercus Cerris*, L. *Quercus Cerris* / Malojo. / W. / Sierra del agua / Es acaso el *Q. pubescens* / ó el pirenaica de W. ?

1585. *Corylus avellana*, L. *Corillus* / *avellana*.

1586. *Mimosa pudica*, L. *Mimosa* (*Pudica*) *aculeata*, *foliis* / *subdigitatis pinnatis*, *caule hispido*. / *Lin. Spec. Plant. p. p. t. 7. p. 193.* / vulgo :en Cordoba Sensitiva. / havita en el Brasil. / Esta Planta se cultiva en Cordoba p^r. / los curiosos, en donde la dan aquel nombre / por el prodigioso sentimiento que hace al / tocarla :pues si sus ojas quando estan abi- / ertas se tocan ligeramente se cierran al / instante las ojuelas parciales de las pinnas. / aproximandose estas entresi ;y graduando el / toque se dobla el pezon por su base quedan- / do la Oja colgando :lo que se hace con gran- / de admiracion, y gusto del curioso especta- / dor. Crecen sus tallos del largo de un pie ó mas, / declinados. Florece en Agosto y Septiembre, y / se hiela en el invierno comunt^o. ;haunque al- / guna vez se ha hecho perenne reserbandola / del rigor de aque- lla estación.

1587. *Desmanthus depressus*, Humb. *Mimosa* / *Pernanbu- cana*.

1588. *Thuja orientalis*, L. *Thuja* (*Orientalis*) *strobilis squarrosis*, *squamis acutis*. / *Pract. Bot. de Lin por Palau t. 7. pag. 231.* / Este Arbolito es procedente de la China y se cul- / tiva en España :en el año de 1789 por acaso hube á las / manos unas semillas de el, sin nombre, las sembré y / nacieron quatro que, en breve se criaron, y existen / todos en Cordoba, uno en la Alameda del Obispo, / otro en el Real convento de San Pablo, otro en el / Real Colegio de la Asuncion, y otro en mi poder. [Reverso] :flo- reece en Cordoba por Enero y grana perfectamente / sus semillas que estan maduras en el Estio.

1589. *Crotophora tinctoria*, Adr. Juss *Croton tinctorium* / an sp. nova seu varietas / *Lin. t. 7. p. 246.*

1590. *Crozophora tintoria*, Adr. Juss. *Croton* (Tinctorium) foliis rhombeis / repartidis, capsulis pendulis, caule herba- / ceo. Lin. Spec. Plant. p^r. t^o. 7^o. p^a. 245. / *Ricinoides*, ex qua paratur Tourne- / sol Gallorum. T. I. R. H. 655. F. E. t^o. 6^o. 202. / *Heliotropium minus*. Diosc. p^r. Lag. 500. / *Heliotropium minus*, Dod. pemp. 71. / Habita en las inmediaciones de la / Ciudad de Cordoba : don se cria con a- / bundancia, en los campos de labor y ha- / un en los que no lo son, como en las hazas / del Marrubial, y en todos aquellos suelos. / La he visto tambien en la Villa de Posadas / seis leguas de esta Ciudad. Es annua y flore- / ce en Julio y Agosto.

1591. *Ricinus communis*, L. *Ricinus communis*.

Clase XXII

1592. *Salix repens*, L. *Salix rorismarinifolia* / W. [Otra etiqueta dice] : *Salix riparia* / W. / eadem / quae ante / [ilegible] : le Vmd? /.

1593. *Salix viminalis*, L. *Salix viminalis* / Sauce ó Mimbrera.

1594. *Salix*, sp. *Salix*.

1595. *Corema album*, D. Don. *Empetrum* (Album) erectum. / Pract. Bot. de L. p^r. Palau t^o. 7^o. p^a. 344. / *Empetrum Lusitanicum*, fruc- / tu albo. T. I. R. H. 579. Fl. Esp. t^o. 5^o. 69. / Este Arbustico se cria en Espa- / ña en las costas maritimas de Gali- / cia : donde la llaman aquellas gentes / *Caramiñas*. vease á Quer. loco citado. / Me dio este esquefeto en Sevil- / la Don Anastasio Guzman : con / dicho nombre generico y especifico. / en Septiembre del año de 1790.

1596. *Osyris alba*, L. *Osyris Alba*.

1597. *Viscum album*, L. *Viscum album* / en los pinos junto al Hornillo

1598. *Pistacia Lentiscus*, L. *Pistacia* (*Lentiscus*) foliis abrupte- / pinnatis, foliolis lanceolatis. Pract. / Bot. de Lin. p^r. Palau t^o. 7^o. p^a. 372. / *Lentiscus vulgaris*. T. Inst. / R. H. 580. Flora Esp^a. t^o. 5^o. pag. 323. / *Lentiscus*. Lag. 55. Dod. pempt. / 281. C. B. Comm. Mat. in Diosc. 105. / Este arbusto es mui comun en / la sierra de Cordoba por todas p^a. / no obstante ser arbusto se ha-

llan / algunos de tronco tan grueso, y esta- / tura tan corpulenta,
que puedⁿ. / equivocarse con los mas frondo- / sos Freznos. florece
en Abril.

1599. *Tamus communis*, L. *Thamnus comunis*.

1600. *Tamus communis*, L. *Tamus communis*. L. / No he en-
contrado la flor / femenina ahora, pero se la / mando, pues creo es
la q^o tiene / Vmd determinada con otro nombre. / es de la
C^o 22 or 6^o.

1601. *Tamus communis*, L. *Tamus communis* L.

1602. *Smilax mauritanica*, Desf. *Smilax* / *nigra* W.

1603. *Mercurialis annua*, L. *Mercurialis* / *Ambigua* / Ca-
brera.

1604. *Mercurialis annua*, L. Planta ♂ *Mercurialis* (annua)
caule bra- / chiato, foliis glabris, floribus spica- / tis. Pract. B. de
Lin. p^o. Pal. t^o. 7^o. p^o. 412. / *Mercurialis* spicata, sive foe- / mina Dios-
coridis et Plinii. T. Inst. / R. Herv. 534. Flora Esp^a. t^o. 5^o. pag. 432. /
Mercurialis foemina. Lagun. / 498. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 890. /
Mercurialis spicata seu foemi- / na. Dod. pempt. 685. / Esta planta
es demasiado co- / mun en las Huertas, Jardines y / qualquier si-
tio humedo. Es annua / y florece en Marzo y Abril.

1605. *Mercurialis annua*, L. *Mercurialis annuae*, planta / fo-
emina ♀.

1606. *Mercurialis tomentosa*, L. *Mercurialis* (tomentosa)
caule suffruticoso. foliis to- / mentosis. Pract. Bot. de Lin. p^o. Pa-
lau t^o. 7^o. pag. 412. / *Mercurialis fruticosa*, incana, spica (seu testi- /
culata). T. Ins. R. H. 534. Fl^a. Esp^a. t^o. 5^o. pag. 433. / *Phylum*. Lag.
353. C. B. com. Mat. 634. / Esta especie se cria en Cordoba, en las
tierras de la / isla que, formo el Rio mas arriba de Lope-garcia,
qu- / ando dexo aquel molino en seco : Es perenne y flore / ce en
los meses de febrero y Marzo.

1607. *Mercurialis tomentosa*, L. *Mercurialis* / *tomentosa*.

1608. *Mercurialis tomentosa*, L. *Mercurialis* / *tomentosa* W.

1609. *Schinus molle*, L. *Schinus Molle* L. / C in H R M
(Otra etiqueta dice) : *Schinus Areira* L. *Schinus Molle* variet^s β.
W. / Siento q^o el tiempo no le permita / herborizar despacio, yo
tampoco hago nada, / y la prueba es q^o. he tenido q^o. entretener
/ me con las plantas de las cercanias. como la / sigt^o. q^o. es de
su huerto y he aprobechado su / estado de fructificación. Entrena.

1610. *Schinus molle*, L. *Schinus* (Areira) foliis pinnatis /

foliolis mintegerrimis aequalibus, petio- / lis aequalibus. Lin. Sp. P. / p^r. p^u. t^o. 7. 420. / *Lentiscus Peruviana*. Caspar Bahu- / hinus in / comentar. Mathiol. super Di- / oscorid. 107. / Este Arbol habita en / el Brasil y en / el Peru. Se cultiva en Cordoba en la Ala- / mea, y / en el Ospital del Cardenal, se conoce / vulgarmente con el nombre / de falsa-pimi- / enta, aunque no es, el *molle*, á quien se da es / te nombre. / Es de un aspecto agradable. Cortandole al- / guna / rama ó hiriendole suda inmediateam^o. / un licor lacteo pegajoso, / que se condensa en / resina mui blanca de la figura y color de / los / mocos de cera, la que pasado algun tiempo se po- / ne azu- / lada, quemada huele al modo del In- / cienso. / Florece en el / Otoño.

1611. *Coriaria myrtifolia*, L. *Coriaria* / *mirthifolia* W. / Redor / para tenir negro.

1612. *Juniperus Sabina*, L. *Sabina* / *Juniperus* / *Sabina* W. / (Otra etiqueta dice): *Juniperus* (*Sabina*) *foliis oppositis* / *erectis* / *decurrentibus, oppositionibus* / *pyxidatis*. P. B. de L. p^r. Palau t^o. 7^o. / 439. / *Sabina folio Tamarisci, Dioscori-* / *dis*. Quer Flora Española / t^o. 6^o. 229. / *Sabina baccifera*. Casp. Bauh / *comment. Mat. sup.* / *Diosc.* 120. / *Sabina*. Lagun. in *Diosc.* 63. Do- / don. *pempt.* 854. / Se cria este Arbol en varias par- / tes de España, como en los ce- / rros. del / pinar de la Cartuxa del Paular de / Segovia, en Bus- / tarviejo. &tc. Quer. / Traje este esqueleto de Sevi- / lla en el mes / de Septiembre del / año de 1793. me lo dio Guzman.

1613. *Juniperus communis*, L. *Juniperus* / *communis* W.

1614. *Juniperus communis*, L. *Juniperus* (*communis*) *foliis* / *ter-* / *nis patentibus mucronatis bacca* / *longioribus*. *Pract. Botan.* / de Lin. / p^r. Palau t^o. 7^o. p^a. 441. / *Juniperus vulgaris, fruticosa.* / *T. Inst. R. H. 588. F. E. t^o. 5^o. p^a. 284.* / *Juniperus*. Lag. in *Diosc.* 62. / *Dodon. pempt.* 852. C. B. *commet.* / *Matthiol. sup. Diosc.* 118. / Se / cria esta especie de Enebro / en Cordoba en Sierra-morena, en / aquel paraje que llaman los Arena- / les camino de Villaviciosa. / Crece / no mui alto este Arbusto; pero mui / ramoso-florece en / Mayo y Junio. / Se hace mucho uso de su madera / en Cordoba / para cucharas.

1615. *Juniperus phoenicea*, L. *Juniperus* / *phoenicea* L.

1616. *Taxus baccata*, L. *Andrinales* - Alcaraz 16 de Marzo / tejo - Arbol robusto = hoja mui / preciosa flor como la del Ene-

bro / madera apreciable / planta dañosa á animales y plantas /
Taxus baccata.

1617. *Cheilanthes odora*, Sw. Cheilantes / odora W. (Otra etiqueta dice) : 19 H. / 4 / *Pteris fragans*. / An. de Ciencias Nat. / n°.14. (Una nota dice) : Tengo el honor de presentar a V. unas hojitas secas del Cheilantes / odora de W. Genero formado por el Swartz con algunas especies del / Adianto del q°. se distingue por la escamita q°. con el reborde de la hoja / concurre á cubrir la fructificación. Va tambien un exemplar fresco / sobre el qual no estoi tan seguro : aunque quiza V. observando / con mejores lentes uno y otro me enmendara la plana. Del / fresco si V. lo determina se servira ponerme dos ó tres frondes / para mi herbario porque no me he quedado con ninguno.

1618. *Polypodium vulgare*, L. [Sin etiqueta].

BIBLIOGRAFÍA

- GONZÁLEZ ROMÁN, GONZALO. [Saravia, 3. Córdoba.] 1943 : *Biografía del Padre Muñoz Capilla*. Premiado en el Concurso del Centenario del Círculo de la Amistad. (Inédito.)
- GONZÁLEZ SORIANO, ANTONIO. 1923 : Flora de Córdoba. *Bol. R. Acad. Córdoba* 2 (3) : 93-95 ; (4) : 93-99 ; (5) : 49-59 ; y (6) : 77-83.
- LAZA PALACIOS, MODESTO. 1943-1944 : Estudios sobre la Flora Andaluza. *An. R. Acad. Farmacia* (Madrid) 10 (2) : 157-199 ; 367-411 ; y 497. En las páginas 157-162 incluye datos de gran interés sobre Muñoz Capilla y sus amigos botánicos. En las páginas 167-188 publica varias de sus cartas.
- LINNEO, CARLOS. 1784. *Práctica de Botánica del Caballero Carlos Linneo*. Traducida por A. Palau. Imprenta Real. Madrid.
- RAMÍREZ DE ARELLANO, R. 1923 : *Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba, con descripción de sus obras*. Tomo I : 416-420. Tipografía de la «Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos». Madrid