

# Adiciones a la flora gallega

por

FRANCISCO BELLOT (\*)

*Polygala depressa* Wender.—En el Monte Faro en la Sierra Faro, a 1.187 metros de altitud. No indicada expresamente para Pontevedra. Bellot et Casaseca el 7 de mayo de 1950.

*Euphorbia angulata* Jacq. Col. II p. 309; DC. Prodr. Syst. T. 15 pars. 2.<sup>a</sup> pág. 127. Recogida cerca de Puente Ulla en la provincia de Pontevedra el día 2 de mayo de 1950 por Bellot y Casaseca. No la sabemos citada en Pontevedra.

*Silene macrorrhiza* Gay = *S. foetida* Link in Sprengel. *S. foetida* Link (Wk. Illustrationes, pág. 95 tab. LXI). El ilustre prof. Losa (Anal. Jardín Botánico Madrid, T. IX, p. 497) sospecha que esta curiosa especie no se encuentra en España, pues dice que la cita del Prodrômus para la región Asturiana no ha sido comprobada.

A este respecto hemos de indicar que la planta dada por Gay como *Silene macrorrhiza* y recogida por Duriéu en el Pico de Arvás fué comprobada y recogida posteriormente por Bourgaeau y después por Leresche y Levier (Deux excursions Botaniques dans le Nord de l'Espagne et le Portugal en 1878 et 1879 p. 81). Estos discípulos de Boissier dicen: ... *Puis le rare et beau Silene macrorrhiza* Gay (*Willkomm, dans Flor. Hisp. p. 657 lui donne por*

---

(\*) Véase: *Contribución a la flora gallega*, «Anal. Inst. J. C. Mutis», vol. IV, núm. 7, pág. 77, y *Mantissa stirpium galloeciae*, «Trabaj. J. Bot. Fac. Farmacia de Santiago», núm. 1

*synonime Silene foetida Link in Spreng. Syst. Veg. II p. 406*). Más recientemente fué herborizada en la misma localidad clásica el Pico de Arvás y repartida en la Flora Ibérica selecta por Font Quer con el núm. 210.

Por lo que respecta a Galicia, en el año 1945 nos fué remitida esta planta de Peña Trevinca por el entusiasta deportista de Barco de Valdeorras Dr. Gurriarán. Queda pues aclarado que esta especie se encuentra no sólo en la Sierra de Jerez, sino en Trevinca y Arvas, siendo pues, planta del macizo Galaico-Dauriense y del extremo Occidental de la cordillera Cantábrica. Su afin, la *Silene malandrioides* Lange es más frecuente por ser el tipo de grado montano, mientras que la *macrorrhiza* Gay la apreciamos como un ecotipo altitudinal.

Sólo conocemos para Galicia nuestra cita de Peña Trevinca, con la planta recogida por Gurriarán.

*Ranunculus bupleuroides* Brot. Phyt. Lusit, T. I p. 194 tab. 79. Este bello ranunculo ha sido citado como nuevo para Galicia, sin duda por error, por el Dr. Vieitez Cortizo (Anal. Edafol. y Fisiol. Veg. T. IX, núm. 4, pág. 431) que tan buenos servicios ha prestado al conocimiento de la flora gallega con sus herborizaciones. Ya el P. Merino lo citó en Galicia, en la provincia de Orense, en la Sierra de Pitós (Merino Flor. Gal. T. III, pág. 502).

*Tuberaria variabilis a vulgaris Linnei* Wk. Prodr. III, p. 721.— Recogida en Sela (provincia de Pontevedra) el día 2 de junio de 1950 (Bellot y Casaseca). No sabemos citada en Galicia esta variedad. Coinciden nuestras muestras con la lámina de Willkomm, publicada en la obra *Cistinearum orbis veteris*, Tab. 112, figs. 3 y 4.

*Saxifraga carpetana* B. et R. ssp. *atlantica* (B. et R.) Engler et Irmscher = *S. atlantica* B. et Reuter Pugillus Plant. Nov., p. 48.

Recogida en la cumbre del Monte Faro en la Sierra del Faro, límite de las provincias de Pontevedra y Lugo, el día 7 de mayo de 1950, por Bellot y Casaseca.

Es curiosa esta cita que creemos nueva para Galicia. En el estudio que estamos haciendo sobre la vegetación de Pontevedra daremos el área de esta planta. Por ahora nos limitamos a consignar su presencia en nuestra región.

Agradecemos al Dr. Rivas Goday la comparación de nuestras

muestras con los tipos de los herbarios del Instituto Cavanilles y de la Facultad de Farmacia de Madrid.

*Orobus tuberosus* L.—El Padre Merino indica, además del tipo, dos variedades: *Pyrenaicus* y *major*. En la provincia de Pontevedra sólo indica la variedad *major* cerca de Puente Ulla. El tipo se halla en las cercanías de Albarellos en un brezal degradado con *Erica umbellata* *E. arborea*, *Pterospartum tridentatum*, *Calluna vulgaris* y *Brachytropis microphylla*. Recogida el 7 de mayo de 1950 por Bellot y Casaseca.

*Genista Lusitanica* L.—Ya el Padre Merino indicó esta especie en el Sureste de Galicia, en la aldea de Prado Ramisquedo, en el límite con Zamora. Nosotros la hemos hallado en el alto de ventas de Erosa, en las cercanías de la Gudiña y también en el límite con Zamora, en la parte gallega de la Portilla de la Canda el día 7 de abril de 1951.

*Conopodium Bourgaei* Coss. Not. Plant. crit. p. 110. Recogido en las cercanías de Puente Ulla (provincia de Pontevedra) el día 2 de mayo de 1950 por Bellot y Casaseca. No sabemos haya sido citado en esta provincia.

*Erica australis* L. var. *aragonensis* Sampaio (Flor. Port., 2.ª ed., p. 452), forma extensos brezales con *E. arborea*, *Cytissus lusitanicus* *Pterospartum tridentatum* y *Genista lusitanica* en el S. E. de la provincia de Orense en la extensa zona montuosa que se extiende desde los Altos de Fumaces, Ventas de Erosa, Altos de El Cañizo a la Portilla de la Canda en el límite ya con Zamora, donde penetra abundantemente esta formación. Recogida el 7 de abril de 1951 por Bellot y Penas.

*Meiampyrum pratense* L.—Recogida en el monte de San Sebastián, entre Bandeira y La Estrada (provincia de Pontevedra) el día 2 de mayo de 1951. No sabemos esté citada en la provincia. Se hallaba en un microclima sombrío y húmedo en un fragmento de asociación *Quercetum Roboris Gallaecicum*.

*Odontites rubra* Pers. = *O. verna* Reich. Recogida en Prado Lalin (provincia de Pontevedra) por el Dr. Vieitez Cortizo el día 15 de julio de 1947. No la sabemos citada en la provincia.

*Scrophularia Herminii* H. et Linj ssp. *Bourgaeana* (Lange) P. Cout. Fl. Port., 2.<sup>a</sup> ed., p. 658. Por un error tipográfico en Mantissa Stirpium Gallaeciae (Anal. J. Bot. Fac. Farmacia Santiago, núm. 1, 1950) aparece esta especie como *Scr. Herminii* H. et Link solamente, cuando en realidad se trata de la variedad *Bourgaeana*. Hemos de añadir a lo allí dicho que no es rara en el valle del Miño, donde, además de en Tuy, la hemos recogido entre Sela y las Nieves, también en la provincia de Pontevedra, el día 2 de junio de 1950.

*Veronica montana* L.—En el valle del Ulla, cerca de Puente Ulla, en la provincia de Pontevedra. Recogida el día 2 de mayo de 1950 por Bellot y Casaseca. No la sabemos citada en la provincia de Pontevedra.

*Solanum pseudocapsicum* L. DC. Prodr. T. XIII, pars. 1.<sup>a</sup>, p. 152. En las márgenes del río Miño cerca de Tuy, 15-IV-1949. Recogida por Bellot y Casaseca. Seguramente escapada de cultivo. No la sabemos citada en Galicia.

*Utricularia neglecta* Lehm.—Recogida entre Sela y Las Nieves en la provincia de Pontevedra en una charca en las trincheras del ferrocarril. En la asociación *Juncetum conglomerati cum Galium uliginosum*, 2 de junio de 1950.

*Phelipaea nana* (De Nqe) Rchb. = *Orobanche ramosa* L. *nana* Per. Cout. = *Kopsia ramosa* Dum raza *nana* Sampaio. Sobre raíces de *Trifolium repens* en el camino del Sanatorio de la Lanzada en la Península de El Grove (provincia de Pontevedra). Recogida el 3 de mayo de 1947 por E. Vieitez. Determinada por Bellot. No la sabemos citada en Galicia.

*Asperula cynanchica* L. ssp. *aristata* (L. fil.) Beguinot = *Asperula aristata* L. fil. Entre Sela y Las Nieves en la asociación de *Salix Salviaefolia* en los cascajares del río Miño. No la sabemos citada en Galicia.

*Senecio lividus* L.—El P. Merino cita dos formas para esta especie en Galicia: una  $\alpha$  *minor* y otra  $\beta$  *ramosa*. Además, existe el tipo, encontrado por nosotros a orillas del Ulla, cerca de Puente Ulla, en la provincia de Pontevedra, el día 2 de mayo de 1950.

*Allium Moly* L. raza *Stramineum* (B. et R.) Sampaio = *A. stramineum* B. et R. En Puente Ulla (provincia de Pontevedra), recogida por Bellot y Casaseca el día 2 de mayo de 1951.

El Padre Merino, en sus primeras publicaciones sobre Galicia, dió esta planta como *A. Stramineum*; después en la Flora rectificó y lo consideró como *A. Moly*.

Las plantas recogidas por nosotros corresponden al *A. Stramineum* por las hojas lineales estrechas no lanceoladas. Pero habiendo hallado formas intermedias entre el *A. Stramineum* típico y el *Moly* aceptamos plenamente la opinión de Sampaio (Fl. Port., 2.ª ed., p. 113), considerando subordinada la especie de Boissier y Reuter a la de Linneo. Ha sido citada en la Sierra de Castro Laboreiro en el límite de Portugal y España.

♂ *Orchis incarnata* L.—Recogida en una sempervirentiprata artificial, cerca de Puente Vea (provincia de Pontevedra), el 14 de mayo de 1950. No sabemos haya sido citada en la provincia.

*Tradescantia Fluminensis* Well. (Fournier: Les Quatre Flores de la France, p. 155). En los setos del río Miño, cerca de Tuy. Escapada, sin duda de cultivo, forma céspedes extensos. 15 de abril de 1949. No la sabemos citada en Galicia.

*Carex Davalliana* Sm.—En un brezal de *Erica Tetralix* con *Schoenus nigricans* en la Braña de Fiol, parroquia de Rus, a unos seis kilómetros de Carballo (provincia de Coruña). Recogida el día 26 de mayo de 1950 por Bellot y Casaseca. No indicada que sepamos en Galicia ni creemos que en Portugal. Es la cita más occidental de la Península.

*Instituto de Botánica Antonio José Cavanilles.  
Sección de Santiago.*