

Acerca de la *Trisetaria scabriuscula* (Lag.)

por

ELENA PAUNERO

En la descripción de *Trisetaria scabriuscula* (Lag.) que hicimos en nuestra nota sobre las *Trisetarias* españolas (Ann. Jard. Bot. de Madrid, T. IX, pág. 520) indicamos que la gluma superior está provista de cuatro nervios, mientras en la inferior éstos oscilan entre dos y tres. Un examen más detenido y nuevas aportaciones de material nos ha permitido comprobar que aquella afirmación no es exacta, sino que el expresado número de nervios es también variable, incluso en ejemplares de la misma procedencia, en la gluma superior, pudiendo ser tres o cuatro. Hemos tenido ocasión de observar asimismo que algunas veces las glumas son apiculadas.

Dado que el carácter de nerviación a que hemos aludido fué utilizado en la clave dicotómica de especies, debe ésta (l. c., pág. 507) ser modificada, a partir del apartado 12, en la siguiente forma:

12. — Espiguillas grandes, sedas de la lemma 0,5 mm., plantas vellosas *Dufourei*
Espiguillas pequeñas, sedas de la lemma 0,5 mm., plantas no vellosas 13
13. — Glumas subiguales, obtusas; panoja floja, ramos poco ramificados con corto número de espiguillas (5—10) *scabriuscula*
Glumas agudas, francamente desiguales, especialmente en latitud; panoja densa, ramos muy ramificados, con numerosas espiguillas..... *panicea*