

Fontqueria. Volumen XXXIX... (1994)

Índice

- 1. 13
- 2. 14
- 3. 15
- 4. 16

LAMIACEÆ GUINEÆ ÆQUATORIALIS NONNULLÆ, II

Ramón MORALES
Real Jardín Botánico, E-28014 Madrid

MORALES, R. (1994) Lamiaceæ Guineæ Æquatorialis nonnullæ, II. *Fontqueria* 39: 13-16.

Keywords: *Lamiaceæ*, Chorology, Equatorial Guinea, Bioco (Fernando Poo).

Abstract. This paper presents identifications for 15 collections of *Lamiaceæ* from Bioco Island (formerly named Fernando Poo) in Equatorial Guinea. 11 species are determined, 10 distributional maps are added.

Résumé. On étudie une collection de 15 lamiacées provenant de l'île de Bioco, anciennement connue comme Fernando Poo, appartenant à la Guinée Equatoriale. 11 espèces sont identifiées. Les cartes de distribution dans l'île des dix espèces sont représentées.

Zusammenfassung. Es werden 11 Arten der *Lamiaceæ* aus insgesamt 15 Sammlungen, bestimmt. Alle Pflanzen sind aus Äquatorialguinea: Biocoinsel (früher Fernando Poo). Die Verbreitungskarten von 10 Arten sind eingeschlossen.

Resumen. Determinaciones de 15 lamiáceas procedentes de Bioco (antiguamente Fernando Poo), en Guinea Ecuatorial. Se reconocen 11 especies. Se acompañan mapas de distribución en la isla de 10 especies.

Continúa la lista de lamiáceas colectadas recientemente en la isla de Bioco (conocida en otro tiempo como Fernando Poo), de Guinea Ecuatorial. En *Fontqueria* 33: 33-34 (1992) se dan detalles sobre el origen de las colecciones.

En los mapas de distribución cada punto representa un cuadrado de 1 km de lado. Se han representado las coordenadas UTM que figuran en este artículo, más las del previo, cf. MORALES (1993).

Achyrosperrum oblongifolium Baker

BIOCO: Belebú Balachá, 32NMJ5375, 920 m, bosque denso, *Fernández Casas* 12143, 28-II-1989. Flores blancas.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 287).

Calamintha simensis Benth

BIOCO: cumbre del pico Basilé, 32NMJ7396, 2950 m, pradera-matorral con brezos, *Fernández Casas* 10172, 3-VII-1986. 30 cm. Flores azules.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 287).

Homalocheilos ramosissimus (Hooker fil.) J. K. Morton

BIOCO: entre el cruce y Moca, 32NMJ6271, 1580 m, lindes de prados, *Fernández Casas* 11476, 10-II-1989. Herbácea, 1 m. Flores blancas. BIOCO: Moca, 32NMJ6369, 1270 m, pradera, *Fernández Casas* 11704, 18-II-1989. 2 m.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 287-288).

Hoslundia opposita Vahl


BIOCO: Musola, cerca de Bombe, a 5 km del cruce, 32NMJ6182, 540 m, bosque secundario, *Carvalho* 2327, 15-VIII-1986. Bejuco, 2-3 m. Flores blancas o cremas. Forma pequeñas marañas.


Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 288).

Leucas deflexa Hooker fil.

BIOCO: Moca, camino de Ureca, 32NMJ6268, 1250 m, bosquetes, *Fernández Casas* 11716, 18-II-1989. 1½ m. Flores blancas.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 288).





Platostoma africanum P. Beauv.

BIOCO: carretera del pico Basilé, km 8, 32NMK8104, 1200 m, bosque primario, lugar sombrío, *Carvalho* 2362, 21-VIII-1986. Herbácea, postrada. Flores entre verdes y blancas.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 289).

Plectranthus decurrens (Gürke) J. K. Morton

BIOCO: carretera del pico Basilé, km 16-17, 32NMJ7799, 1750 m, bosque ralo con pradera, *Carvalho* 4477, 10-IX-1990. Subarbusto, 2,3 m. Flores amarillas, muy vistosas. Ramas florales afilas. BIOCO: Moca, camino de Ureca, 32NMJ6267, 1080 m, claros de bosque denso con helechos arborescentes, *Fernández Casas* 11790, 19-II-1989. 1½ m. Flores azules.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 289).

Plectranthus glandulosus Hooker fil.

BIOCO: carretera del pico Basilé, km 4-5, 32NMK8406, 920 m, bosque primario, *Carvalho* 2359, 21-VIII-1986. Herbácea, 60-80 cm. Flores violetas.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 289).

Solenostemon decumbens (Hooker fil.) Baker

BIOCO: Moca, camino de Ureca, al final de las praderas, 32NMJ6268, 1260 m, pradera con rodales de bosque, *Fernández Casas* 11745, 19-II-1989.

Poco citada de la isla, cf. MORALES (1993: 290).

Solenostemon monostachyus (P. Beauv.) Briquet subsp. **monostachyus**

BIOCO: Luba - Riaba, a 4-5 km del cruce de Moca, 32NMJ6379, 760 m, comunidad natural de gramíneas con helechos y ortigas, *Carvalho* 4445, 5-VIII-1990. Herbácea, 40-80 cm. Flores azuladas. BIOCO: Luba - Veiga y Avendaño, en el límite entre Batete y Luba, 32NMJ4783, 5 m, márgenes de la carretera, *Fernández Casas* 12019, 26-II-1989.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 290).

Solenostemon repens (Gürke) J. K. Morton

BIOCO: carretera del pico Basilé, km 3-4, 32NMK8205, 1000 m, bosque primario, junto a un regato, *Carvalho* 2157, 30-VII-1986. Postrada, forma pequeños tapices sobre el tronco de árboles caídos. Flores violetas. BIOCO: cerca de Basilé, finca Eloy Estrada, 32NMK7707, 550 m, bosque primario, sobre una piedra, en lugar húmedo y sombrío, *Carvalho* 2470, 17-IX-1986. Herbácea, postrada. Flores de color blanco vinoso.

Ya se ha señalado en la isla en varias ocasiones, cf. MORALES (1993: 290).

Referencias bibliográficas

MORALES, R. (1993) Lamiaceæ Guineæ Æquatorialis nonnullæ. *Fontqueria* 36: 287-291.